

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,383	584.43	423.60*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	832	707.34	551.10*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	551	462.96	309.21	0.93	100.0
	十大主要死因	1,120	473.29	340.67	0.97	81.0		十大主要死因	689	585.76	451.91	0.97	82.8		十大主要死因	438	368.01	245.16	0.99	79.5
1	惡性腫瘤	429	181.29	133.47	0.99	31.0	1	惡性腫瘤	267	226.99	176.56	0.95	32.1	1	惡性腫瘤	162	136.11	95.00	1.07	29.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	199	84.09	58.07	1.03	14.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	114	96.92	73.84	1.11	13.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	85	71.42	43.70	0.99	15.4
3	肺炎	81	34.23	22.91	1.00	5.9	3	慢性下呼吸道疾病	62	52.71	36.94	1.11	7.5	3	糖尿病	43	36.13	22.60	0.89	7.8
4	腦血管疾病	77	32.54	23.48*-	0.79*	5.6	4	肺炎	52	44.21	32.34	1.00	6.3	4	肺炎	29	24.37	14.80	0.95	5.3
5	糖尿病	74	31.27	21.90	0.82	5.4	5	腦血管疾病	49	41.66	32.65	0.88	5.9	5	腦血管疾病	28	23.53	15.50*-	0.69*	5.1
6	慢性下呼吸道疾病	74	31.27	20.29	1.10	5.4	6	事故傷害	45	38.26	32.75*-	0.73*	5.4	6	事故傷害	21	17.64	15.01	0.99	3.8
7	事故傷害	66	27.89	23.37*-	0.78*	4.8	7	糖尿病	31	26.36	21.00	0.78	3.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	17.64	11.87	1.11	3.8
8	蓄意自我傷害(自殺)	44	18.59	15.22	1.19	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	28	23.80	20.31	1.17	3.4	8	敗血症	20	16.80	10.02	1.57	3.6
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	18.17	12.79	1.07	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	18.70	14.15	1.03	2.6	9	蓄意自我傷害(自殺)	16	13.44	10.51	1.28	2.9
10	敗血症	33	13.95	9.17	1.12	2.4	10	高血壓性疾病	19	16.15	11.36	1.09	2.3	10	高血壓性疾病	13	10.92	6.16*-	0.63	2.4
	其他非十大死因	263	111.14	82.92*-	0.74*	19.0		其他非十大死因	143	121.57	99.19*-	0.73*	17.2		其他非十大死因	113	94.94	64.05*-	0.77*	20.5
11	高血壓性疾病	32	13.52	8.61	0.82	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	18	15.30	12.09*-	0.48*	2.2	11	慢性下呼吸道疾病	12	10.08	6.24	0.82	2.2
12	慢性肝病及肝硬化	27	11.41	8.44*-	0.52*	2.0	12	敗血症	13	11.05	7.86	0.79	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	9	7.56	4.94	0.75	1.6
13	帕金森病	9	3.80	2.77	1.19	0.7	13	帕金森病	4	3.40	2.70	0.87	0.5	13	帕金森病	5	4.20	2.82	1.68	0.9
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	3.38	2.26	0.65	0.6	14	結核病	4	3.40	2.64	0.78	0.5	14	胃及十二指腸潰瘍	5	4.20	2.75	2.12	0.9
15	胃及十二指腸潰瘍	7	2.96	2.05	1.36	0.5	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	3.40	2.59	0.70	0.5	15	源於周產期的特定病況	4	3.36	6.52	2.08	0.7

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計236,641人 男性117,624人 女性119,018人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	489	570.81	396.60*-	0.88*	100.0		所有死亡原因	316	721.10	575.80	0.96	100.0		所有死亡原因	173	413.43	233.54*-	0.76*	100.0
	十大主要死因	384	448.25	310.36*-	0.90*	78.5		十大主要死因	250	570.49	455.10	0.98	79.1		十大主要死因	135	322.62	181.38*-	0.79*	78.0
1	惡性腫瘤	149	173.93	127.13	0.94	30.5	1	惡性腫瘤	110	251.02	203.18	1.07	34.8	1	惡性腫瘤	39	93.20	58.13*-	0.71*	22.5
2	衰老/老邁	54	63.03	38.50*+	6.04*	11.0	2	衰老/老邁	29	66.18	50.97*+	7.28*	9.2	2	衰老/老邁	25	59.74	30.41*+	5.03*	14.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	46.69	31.63*-	0.56*	8.2	3	事故傷害	21	47.92	40.19	0.92	6.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	52.57	27.85*-	0.64*	12.7
4	肺炎	30	35.02	22.07	0.99	6.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	41.08	32.31*-	0.49*	5.7	4	肺炎	13	31.07	16.05	1.05	7.5
5	事故傷害	26	30.35	24.53	0.85	5.3	5	肺炎	17	38.79	30.58	0.96	5.4	5	腦血管疾病	11	26.29	13.81*-	0.69	6.4
6	腦血管疾病	22	25.68	16.36*-	0.61*	4.5	6	慢性下呼吸道疾病	14	31.95	24.66	0.73	4.4	6	糖尿病	7	16.73	8.63*-	0.37*	4.0
7	慢性下呼吸道疾病	18	21.01	13.45	0.71	3.7	7	慢性肝病及肝硬化	12	27.38	21.36	0.85	3.8	7	事故傷害	5	11.95	9.25	0.65	2.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	19.84	13.17	1.13	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	27.38	20.54	1.58	3.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	11.95	7.40	0.68	2.9
9	慢性肝病及肝硬化	15	17.51	13.20	0.80	3.1	9	腦血管疾病	11	25.10	19.72*-	0.55*	3.5	9	慢性下呼吸道疾病	4	9.56	4.97	0.67	2.3
10	糖尿病	13	15.18	10.33*-	0.39*	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.69	11.59	0.67	1.9	10	高血壓性疾病	4	9.56	4.87*-	0.47	2.3
	其他非十大死因	105	122.57	86.25*-	0.82*	21.5		其他非十大死因	66	150.61	120.70	0.90	20.9		其他非十大死因	38	90.81	52.16*-	0.67*	22.0
11	高血壓性疾病	9	10.51	6.49	0.62	1.8	11	糖尿病	6	13.69	11.36*-	0.41*	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	3	7.17	4.47	0.67	1.7
12	蓄意自我傷害(自殺)	8	9.34	7.51*-	0.60	1.6	12	敗血症	5	11.41	8.58	0.86	1.6	12	胃及十二指腸潰瘍	3	7.17	3.29	3.21	1.7
13	敗血症	7	8.17	5.24	0.64	1.4	13	高血壓性疾病	5	11.41	8.03	0.81	1.6	13	結核病	3	7.17	3.15	2.61	1.7
14	胃及十二指腸潰瘍	4	4.67	2.72	2.10	0.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.85	5.46	1.47	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	4.78	3.16*-	0.45	1.2
15	結核病	4	4.67	2.72	1.39	0.8	15	主動脈瘤及剝離	3	6.85	4.94	2.36	0.9	15	敗血症	2	4.78	2.24*-	0.38	1.2

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,667人 男性43,822人 女性41,845人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	508	562.97	439.71	0.95	100.0		所有死亡原因	300	649.69	573.67	0.94	100.0		所有死亡原因	208	472.08	319.48	0.97	100.0
	十大主要死因	400	443.28	343.64	0.96	78.7		十大主要死因	251	543.57	476.65	0.97	83.7		十大主要死因	159	360.87	237.84	0.99	76.4
1	惡性腫瘤	139	154.04	120.50	0.89	27.4	1	惡性腫瘤	90	194.91	167.67	0.89	30.0	1	惡性腫瘤	49	111.21	78.55	0.91	23.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	57	63.17	48.21	0.85	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	71.47	62.39	0.92	11.0	2	糖尿病	25	56.74	36.90	1.42	12.0
3	糖尿病	39	43.22	32.93	1.24	7.7	3	肺炎	25	54.14	49.09	1.54	8.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	54.47	34.79	0.76	11.5
4	肺炎	36	39.90	29.13	1.31	7.1	4	事故傷害	25	54.14	48.18	1.06	8.3	4	腦血管疾病	13	29.51	19.10	0.88	6.3
5	腦血管疾病	33	36.57	29.18	0.97	6.5	5	腦血管疾病	20	43.31	40.20	1.05	6.7	5	肺炎	11	24.97	14.27	0.99	5.3
6	事故傷害	30	33.25	27.88	0.96	5.9	6	慢性下呼吸道疾病	16	34.65	30.32	0.92	5.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	22.70	14.39	1.46	4.8
7	蓄意自我傷害(自殺)	18	19.95	16.35	1.29	3.5	7	糖尿病	14	30.32	27.57	1.01	4.7	7	高血壓性疾病	8	18.16	10.58	1.05	3.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	19.95	14.62	1.29	3.5	8	蓄意自我傷害(自殺)	11	23.82	20.95	1.19	3.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	7	15.89	11.87	1.52	3.4
9	慢性下呼吸道疾病	17	18.84	13.71	0.74	3.3	9	慢性肝病及肝硬化	9	19.49	16.03	0.61	3.0	9	衰老/老邁	7	15.89	8.63	1.60	3.4
10	慢性肝病及肝硬化	13	14.41	11.13	0.68	2.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	17.33	14.24	1.13	2.7	10	事故傷害	5	11.35	8.76	0.65	2.4
	其他非十大死因	108	119.69	96.06	0.92	21.3		其他非十大死因	49	106.12	97.02	0.82	16.3		其他非十大死因	49	111.21	81.64	0.90	23.6
11	高血壓性疾病	12	13.30	9.78	0.89	2.4	11	高血壓性疾病	4	8.66	7.56	0.69	1.3	11	慢性肝病及肝硬化	4	9.08	5.70	0.94	1.9
12	衰老/老邁	9	9.97	7.05	1.13	1.8	12	帕金森病	3	6.50	6.15	1.96	1.0	12	敗血症	4	9.08	5.09	0.86	1.9
13	敗血症	7	7.76	5.50	0.69	1.4	13	敗血症	3	6.50	5.22	0.55	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.81	5.55	1.25	1.4
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	5.54	4.79	1.15	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	4.33	4.26	1.03	0.7	14	源於周產期的特定病況	2	4.54	7.65	2.45	1.0
15	帕金森病	4	4.43	3.16	1.50	0.8	15	衰老/老邁	2	4.33	3.87	0.56	0.7	15	先天性畸形變形及染色體異常	2	4.54	5.60	2.93	1.0

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,236人 男性46,176人 女性44,060人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	246	738.07	489.74	1.05	100.0		所有死亡原因	143	847.56	624.40	1.04	100.0		所有死亡原因	103	625.87	359.84	1.07	100.0
	十大主要死因	207	621.06	406.22	1.13	84.1		十大主要死因	125	740.87	538.31	1.13	87.4		十大主要死因	84	510.42	291.12	1.20	81.6
1	惡性腫瘤	67	201.02	140.48	1.00	27.2	1	惡性腫瘤	45	266.71	196.55	1.04	31.5	1	惡性腫瘤	22	133.68	86.49	0.94	21.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	90.01	52.86	0.99	12.2	2	糖尿病	16	94.83	67.16*+	2.59*	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	91.15	44.79	1.03	14.6
3	糖尿病	29	87.01	52.64*+	2.04*	11.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	88.90	58.00	0.96	10.5	3	腦血管疾病	13	78.99	49.38	1.93*	12.6
4	腦血管疾病	21	63.01	41.40	1.37	8.5	4	事故傷害	13	77.05	64.10	1.41	9.1	4	糖尿病	13	78.99	41.59	1.62	12.6
5	事故傷害	16	48.00	37.45	1.28	6.5	5	腦血管疾病	8	47.42	33.49	0.94	5.6	5	肺炎	6	36.46	17.43	1.14	5.8
6	肺炎	13	39.00	23.23	1.01	5.3	6	慢性下呼吸道疾病	7	41.49	30.74	0.85	4.9	6	高血壓性疾病	5	30.38	15.99	1.39	4.9
7	高血壓性疾病	10	30.00	16.94	1.61	4.1	7	肺炎	7	41.49	29.81	0.93	4.9	7	事故傷害	3	18.23	12.49	0.93	2.9
8	慢性肝病及肝硬化	8	24.00	17.36	1.03	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	6	35.56	27.13	1.05	4.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.23	10.54	0.95	2.9
9	慢性下呼吸道疾病	8	24.00	14.44	0.74	3.3	9	高血壓性疾病	5	29.63	18.73	1.88	3.5	9	慢性肝病及肝硬化	2	12.15	6.50	1.04	1.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	15.00	9.43	0.78	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.78	12.60	0.83	2.1	10	皮膚及皮下組織疾病	2	12.15	5.92	4.71	1.9
	其他非十大死因	39	117.01	83.53	0.76	15.9		其他非十大死因	18	106.69	86.09	0.67	12.6		其他非十大死因	19	115.45	68.73	0.73	18.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	9.00	6.09	0.56	1.2	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.85	8.32	2.33	1.4	11	先天性畸形變形及染色體異常	1	6.08	12.37	4.36	1.0
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.00	5.65	1.55	1.2	12	敗血症	2	11.85	8.19	0.81	1.4	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.08	2.92	2.19	1.0
13	敗血症	2	6.00	3.98	0.43	0.8	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.85	8.10	0.62	1.4	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.08	2.92	0.94	1.0
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	6.00	3.79	1.32	0.8	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.85	7.79	2.30	1.4	14	慢性下呼吸道疾病	1	6.08	2.92	0.40	1.0
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	6.00	3.26	2.08	0.8	15	源於周產期的特定病況	1	5.93	13.09	4.47	0.7							

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,330人 男性16,872人 女性16,457人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	740	591.33	433.07	0.94	100.0		所有死亡原因	429	682.90	551.15	0.92	100.0		所有死亡原因	311	499.02	327.01	0.99	100.0
	十大主要死因	579	462.67	335.60	0.94	78.2		十大主要死因	345	549.19	440.83	0.91	80.4		十大主要死因	237	380.28	247.98	1.01	76.2
1	惡性腫瘤	197	157.42	115.76*-	0.86*	26.6	1	惡性腫瘤	120	191.02	150.67*-	0.81*	28.0	1	惡性腫瘤	77	123.55	86.12	0.96	24.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	103	82.31	57.91	1.04	13.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	79.59	63.20	0.95	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	53	85.04	51.23	1.16	17.0
3	糖尿病	49	39.16	27.01	1.05	6.6	3	事故傷害	32	50.94	41.33	0.98	7.5	3	糖尿病	28	44.93	26.44	1.09	9.0
4	腦血管疾病	48	38.36	27.57	0.95	6.5	4	腦血管疾病	28	44.57	35.93	0.98	6.5	4	腦血管疾病	20	32.09	19.97	0.92	6.4
5	事故傷害	41	32.76	25.46	0.92	5.5	5	慢性肝病及肝硬化	27	42.98	34.84	1.33	6.3	5	肺炎	12	19.25	13.49	0.74	3.9
6	慢性肝病及肝硬化	35	27.97	21.67	1.27	4.7	6	慢性下呼吸道疾病	24	38.20	30.51	0.90	5.6	6	高血壓性疾病	12	19.25	11.64	1.09	3.9
7	慢性下呼吸道疾病	33	26.37	18.13	0.97	4.5	7	糖尿病	21	33.43	25.94	1.01	4.9	7	事故傷害	9	14.44	10.90	0.81	2.9
8	肺炎	28	22.37	16.50	0.69*	3.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	28.65	24.02	1.69*	4.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	14.44	9.04	0.89	2.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	21.58	15.54	1.30	3.6	9	肺炎	16	25.47	21.77	0.65	3.7	9	慢性下呼吸道疾病	9	14.44	8.00	1.16	2.9
10	高血壓性疾病	18	14.38	10.05	0.91	2.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	9	14.33	12.62	0.71	2.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	8	12.84	11.14	1.24	2.6
	其他非十大死因	161	128.65	97.48	0.94	21.8		其他非十大死因	84	133.72	110.32	0.95	19.6		其他非十大死因	74	118.74	79.03	0.96	23.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	17	13.58	11.76	0.87	2.3	11	敗血症	6	9.55	8.52	0.73	1.4	11	慢性肝病及肝硬化	8	12.84	8.74	1.25	2.6
12	敗血症	9	7.19	5.38	0.60	1.2	12	高血壓性疾病	6	9.55	7.71	0.69	1.4	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	9.63	6.01	1.71	1.9
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	5.59	4.03	1.10	0.9	13	帕金森病	5	7.96	6.13	2.15	1.2	13	敗血症	3	4.81	2.93*-	0.44	1.0
14	帕金森病	6	4.79	3.21	1.53	0.8	14	皮膚及皮下組織疾病	3	4.78	4.08	1.31	0.7	14	血管性及未明示之癱瘓症	3	4.81	2.83	1.76	1.0
15	皮膚及皮下組織疾病	5	4.00	3.04	1.39	0.7	15	疝氣及腸阻塞	3	4.78	3.75	2.28	0.7	15	流行性感冒	2	3.21	2.52	3.03	0.6

附 註：1.彰化縣員林鎮年中人口數 計125,142人 男性62,820人 女性62,322人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	379	677.90	456.13	0.98	100.0		所有死亡原因	209	732.51	573.60	0.96	100.0		所有死亡原因	170	620.96	343.13	1.03	100.0
	十大主要死因	300	536.60	364.98	1.01	79.2		十大主要死因	171	599.33	471.46	0.97	81.8		十大主要死因	131	478.50	261.68	1.06	77.1
1	惡性腫瘤	103	184.23	133.69	0.96	27.2	1	惡性腫瘤	68	238.33	189.31	1.00	32.5	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	135.15	67.59	1.44*	21.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	57	101.95	65.01	1.14	15.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	70.10	57.08	0.81	9.6	2	惡性腫瘤	35	127.84	79.60	0.92	20.6
3	糖尿病	25	44.72	30.46	1.07	6.6	3	事故傷害	15	52.57	44.78	1.00	7.2	3	糖尿病	14	51.14	29.71	1.02	8.2
4	腦血管疾病	24	42.93	26.20	0.95	6.3	4	慢性肝病及肝硬化	13	45.56	34.46	1.42	6.2	4	腦血管疾病	11	40.18	21.87	0.94	6.5
5	事故傷害	22	39.35	30.10	1.08	5.8	5	腦血管疾病	13	45.56	33.04	0.97	6.2	5	慢性下呼吸道疾病	10	36.53	15.63	2.22*	5.9
6	慢性下呼吸道疾病	19	33.98	18.10	1.04	5.0	6	糖尿病	11	38.55	29.63	1.13	5.3	6	事故傷害	7	25.57	13.10	1.33	4.1
7	慢性肝病及肝硬化	15	26.83	19.77	1.21	4.0	7	慢性下呼吸道疾病	9	31.54	22.37	0.69	4.3	7	肺炎	6	21.92	8.98	0.63	3.5
8	肺炎	14	25.04	14.33*-	0.64	3.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	8	28.04	24.74	1.39	3.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	14.61	8.11	0.75	2.4
9	蓄意自我傷害(自殺)	11	19.68	17.46	1.26	2.9	9	肺炎	8	28.04	21.62	0.66	3.8	9	高血壓性疾病	4	14.61	6.40	0.62	2.4
10	高血壓性疾病	10	17.89	9.87	0.95	2.6	10	高血壓性疾病	6	21.03	14.43	1.43	2.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	10.96	10.69	1.03	1.8
	其他非十大死因	79	141.30	91.15	0.90	20.8		其他非十大死因	38	133.18	102.14	0.89	18.2		其他非十大死因	39	142.46	81.46	0.93	22.9
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	8.94	5.43*-	0.48	1.3	11	衰老/老邁	2	7.01	5.41	0.73	1.0	11	衰老/老邁	3	10.96	3.87	0.78	1.8
12	衰老/老邁	5	8.94	4.36	0.76	1.3	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	7.01	5.16	2.45	1.0	12	慢性肝病及肝硬化	2	7.31	4.77	0.64	1.2
13	病毒性肝炎	3	5.37	3.56	4.11	0.8	13	皮膚及皮下組織疾病	2	7.01	4.94	1.79	1.0	13	病毒性肝炎	2	7.31	4.30	6.04	1.2
14	皮膚及皮下組織疾病	3	5.37	3.08	1.59	0.8	14	血管性及未明示之癱瘓症	1	3.50	2.70	2.91	0.5	14	敗血症	2	7.31	2.90	0.51	1.2
15	敗血症	3	5.37	3.08*-	0.38	0.8	15	流行性感冒	1	3.50	2.70	2.89	0.5	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.31	2.58	1.10	1.2

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,908人 男性28,532人 女性27,377人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	402	923.29	471.63	1.06	100.0		所有死亡原因	259	1,146.47	609.54	1.05	100.0		所有死亡原因	143	682.61	324.27	1.04	100.0
	十大主要死因	301	691.32	364.53	1.04	74.9		十大主要死因	199	880.88	478.15	1.02	76.8		十大主要死因	104	496.44	246.10	1.02	72.7
1	惡性腫瘤	93	213.60	120.08	0.92	23.1	1	惡性腫瘤	68	301.00	171.82	0.94	26.3	1	惡性腫瘤	25	119.34	65.14	0.77	17.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	94.17	47.63	0.81	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	119.52	67.12	0.94	10.4	2	糖尿病	19	90.70	40.84	1.63	13.3
3	肺炎	32	73.50	30.18	1.40	8.0	3	慢性下呼吸道疾病	24	106.24	41.89	1.29	9.3	3	腦血管疾病	17	81.15	41.11	1.73*	11.9
4	腦血管疾病	30	68.90	34.40	1.18	7.5	4	肺炎	24	106.24	41.38	1.42	9.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	66.83	27.88*-	0.67	9.8
5	糖尿病	27	62.01	31.82	1.15	6.7	5	腦血管疾病	13	57.55	28.40	0.82	5.0	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	42.96	16.56	1.99	6.3
6	慢性下呼吸道疾病	26	59.72	24.35	1.35	6.5	6	慢性肝病及肝硬化	10	44.27	30.61	1.21	3.9	6	肺炎	8	38.19	18.16	1.05	5.6
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	36.75	15.75	1.50	4.0	7	事故傷害	9	39.84	28.64	0.65	3.5	7	事故傷害	4	19.09	13.71	0.92	2.8
8	事故傷害	13	29.86	21.20	0.73	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	8	35.41	28.61	1.54	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	3	14.32	8.24	1.09	2.1
9	慢性肝病及肝硬化	13	29.86	19.89	1.17	3.2	9	糖尿病	8	35.41	23.87	0.73	3.1	9	高血壓性疾病	3	14.32	6.12	0.57	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	10	22.97	19.23	1.34	2.5	10	敗血症	8	35.41	15.80	1.62	3.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.55	8.36	0.84	1.4
	其他非十大死因	101	231.97	107.10	1.15	25.1		其他非十大死因	60	265.59	131.38	1.15	23.2		其他非十大死因	39	186.17	78.17	1.09	27.3
11	敗血症	9	20.67	9.92	1.12	2.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	30.99	15.40	1.10	2.7	11	主動脈瘤及剝離	2	9.55	5.63	2.35	1.4
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	16.08	9.04	2.81*	1.7	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	22.13	12.94	2.96	1.9	12	慢性下呼吸道疾病	2	9.55	4.80	0.55	1.4
13	皮膚及皮下組織疾病	6	13.78	5.94	3.09*	1.5	13	皮膚及皮下組織疾病	5	22.13	9.87	3.32*	1.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.55	4.37	2.18	1.4
14	高血壓性疾病	6	13.78	5.48*-	0.54	1.5	14	高血壓性疾病	3	13.28	4.59*-	0.55	1.2	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.55	3.47	2.43	1.4
15	主動脈瘤及剝離	3	6.89	5.11	1.67	0.7	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	8.85	6.29	1.85	0.8	15	敗血症	1	4.77	3.23	0.32	0.7

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計43,540人 男性22,591人 女性20,949人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	463	867.45	478.19	1.00	100.0		所有死亡原因	290	1,052.40	681.86	1.12	100.0		所有死亡原因	173	670.05	290.22	0.85*	100.0
	十大主要死因	373	698.83	394.86	1.05	80.6		十大主要死因	244	885.47	573.51*+	1.18*	84.1		十大主要死因	132	511.25	234.54	0.95	76.3
1	惡性腫瘤	144	269.79	159.66	1.14	31.1	1	惡性腫瘤	99	359.27	228.09	1.23	34.1	1	惡性腫瘤	45	174.29	99.42	1.00	26.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	79	148.01	76.13*+	1.28*	17.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	174.19	107.65*+	1.62*	16.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	120.07	48.15	0.96	17.9
3	腦血管疾病	30	56.21	30.36	0.96	6.5	3	腦血管疾病	20	72.58	43.95	1.23	6.9	3	糖尿病	12	46.48	17.49	0.68	6.9
4	肺炎	24	44.96	21.46	0.87	5.2	4	慢性下呼吸道疾病	17	61.69	34.95	1.03	5.9	4	腦血管疾病	10	38.73	17.23	0.68	5.8
5	糖尿病	23	43.09	21.22	0.79	5.0	5	事故傷害	14	50.81	51.49	0.87	4.8	5	肺炎	10	38.73	13.98	0.83	5.8
6	事故傷害	19	35.60	32.10	0.86	4.1	6	肺炎	14	50.81	30.28	0.93	4.8	6	敗血症	7	27.11	8.11	1.41	4.0
7	慢性下呼吸道疾病	19	35.60	16.10	0.82	4.1	7	糖尿病	11	39.92	24.53	0.93	3.8	7	事故傷害	5	19.37	11.80	0.84	2.9
8	敗血症	13	24.36	11.21	1.33	2.8	8	慢性肝病及肝硬化	8	29.03	19.34	0.80	2.8	8	慢性肝病及肝硬化	4	15.49	8.33	1.00	2.3
9	慢性肝病及肝硬化	12	22.48	13.79	0.87	2.6	9	蓄意自我傷害(自殺)	7	25.40	19.55	1.13	2.4	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	15.49	5.22	1.78	2.3
10	蓄意自我傷害(自殺)	10	18.74	12.83	1.08	2.2	10	敗血症	6	21.77	13.68	1.26	2.1	10	膽結石及其他膽囊疾患	4	15.49	4.81	10.19*	2.3
	其他非十大死因	90	168.62	83.33*-	0.82	19.4		其他非十大死因	46	166.93	108.34	0.89	15.9		其他非十大死因	41	158.80	55.68*-	0.63*	23.7
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	14.99	6.16*-	0.61	1.7	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	21.77	12.13	0.95	2.1	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	11.62	5.30	2.23	1.7
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	13.11	5.80	1.79	1.5	12	結核病	5	18.14	10.35	3.51*	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	11.62	5.12	0.97	1.7
13	結核病	5	9.37	4.66	1.95	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	10.89	6.85	1.80	1.0	13	高血壓性疾病	3	11.62	3.13*-	0.36	1.7
14	高血壓性疾病	5	9.37	3.62*-	0.37*	1.1	14	主動脈瘤及剝離	2	7.26	3.85	2.07	0.7	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	7.75	3.02*-	0.30	1.2
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	7.49	4.24	1.31	0.9	15	帕金森病	2	7.26	3.62	1.41	0.7	15	貧血	2	7.75	2.20	5.61	1.2

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計53,375人 男性27,556人 女性25,819人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%
	所有死亡原因	118	693.02	464.89	1.02	100.0		所有死亡原因	65	739.98	566.40	0.93	100.0		所有死亡原因	53	643.05	343.97	1.12	100.0
	十大主要死因	98	575.56	394.67	1.09	83.1		十大主要死因	60	683.06	527.30	1.08	92.3		十大主要死因	40	485.32	265.59	1.24	75.5
1	惡性腫瘤	33	193.81	134.93	1.01	28.0	1	惡性腫瘤	19	216.30	167.11	0.87	29.2	1	惡性腫瘤	14	169.86	98.22	1.25	26.4
2	糖尿病	12	70.48	53.51	1.71	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	102.46	76.47	1.14	13.8	2	糖尿病	5	60.66	42.52	1.27	9.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	64.60	42.03	0.73	9.3	3	事故傷害	7	79.69	64.90	1.47	10.8	3	高血壓性疾病	5	60.66	27.22	2.75	9.4
4	事故傷害	10	58.73	45.13	1.59	8.5	4	糖尿病	7	79.69	61.19	2.25	10.8	4	事故傷害	3	36.40	25.58	1.92	5.7
5	慢性下呼吸道疾病	8	46.98	25.13	1.49	6.8	5	慢性下呼吸道疾病	5	56.92	39.09	1.21	7.7	5	慢性下呼吸道疾病	3	36.40	14.34	2.38	5.7
6	腦血管疾病	7	41.11	25.39	0.93	5.9	6	慢性肝病及肝硬化	4	45.54	36.58	1.35	6.2	6	腦血管疾病	3	36.40	14.34	0.90	5.7
7	高血壓性疾病	6	35.24	19.02	1.92	5.1	7	腦血管疾病	4	45.54	33.37	0.94	6.2	7	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	24.27	10.94*-	0.28*	3.8
8	慢性肝病及肝硬化	5	29.37	23.76	1.31	4.2	8	肺炎	3	34.15	28.69	0.79	4.6	8	敗血症	2	24.27	10.53	1.81	3.8
9	肺炎	4	23.49	15.97	0.62	3.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	1	11.38	10.75	0.54	1.5	9	血管性及未明示之癱瘓症	2	24.27	9.56	7.18	3.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.75	9.80	0.74	1.7	10	衰老/老邁	1	11.38	9.16	1.16	1.5	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.13	12.32	1.92	1.9
	其他非十大死因	20	117.46	70.21*-	0.77	16.9		其他非十大死因	5	56.92	39.10*-	0.35*	7.7		其他非十大死因	13	157.73	78.38	0.86	24.5
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.75	7.20	0.64	1.7	11	帕金森病	1	11.38	8.50	2.80	1.5	11	慢性肝病及肝硬化	1	12.13	10.01	1.10	1.9
12	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.75	6.28	5.19	1.7	12	高血壓性疾病	1	11.38	6.92	0.74	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.13	7.93	1.13	1.9
13	衰老/老邁	2	11.75	6.28	1.04	1.7	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	11.38	6.92	0.62	1.5	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	12.13	7.93	0.65	1.9
14	敗血症	2	11.75	6.28	0.86	1.7							14	主動脈瘤及剝離	1	12.13	6.16	3.42	1.9	
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.87	5.74	1.04	0.8							15	衰老/老邁	1	12.13	5.75	0.93	1.9	

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,027人 男性8,784人 女性8,242人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	236	655.36	483.85	1.06	100.0		所有死亡原因	118	638.63	550.63	0.91	100.0		所有死亡原因	118	672.98	408.97*+	1.28*	100.0
	十大主要死因	182	505.40	375.14	1.10	77.1		十大主要死因	101	546.63	469.67	0.99	85.6		十大主要死因	88	501.88	315.13	1.28*	74.6
1	惡性腫瘤	59	163.84	127.88	0.92	25.0	1	惡性腫瘤	40	216.49	188.53	0.97	33.9	1	惡性腫瘤	19	108.36	75.23	0.85	16.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	61.09	42.81	0.78	9.3	2	事故傷害	15	81.18	69.28	1.59	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	68.44	38.36	0.87	10.2
3	事故傷害	20	55.54	47.90	1.58	8.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	54.12	41.93	0.69	8.5	3	糖尿病	12	68.44	33.27	1.56	10.2
4	糖尿病	18	49.98	34.07	1.35	7.6	4	肺炎	7	37.88	32.16	1.06	5.9	4	腦血管疾病	9	51.33	36.33	1.39	7.6
5	腦血管疾病	16	44.43	31.95	1.11	6.8	5	腦血管疾病	7	37.88	30.23	0.90	5.9	5	肺炎	9	51.33	24.73	1.80	7.6
6	肺炎	16	44.43	30.05	1.35	6.8	6	慢性下呼吸道疾病	6	32.47	30.99	0.83	5.1	6	高血壓性疾病	7	39.92	21.88	2.05	5.9
7	高血壓性疾病	12	33.32	21.88	2.08*	5.1	7	糖尿病	6	32.47	29.61	1.05	5.1	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	34.22	21.66	2.02	5.1
8	蓄意自我傷害(自殺)	7	19.44	15.49	1.26	3.0	8	高血壓性疾病	5	27.06	23.34	2.09	4.2	8	事故傷害	5	28.52	29.12	1.59	4.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	16.66	11.99	1.01	2.5	9	慢性肝病及肝硬化	3	16.24	14.03	0.51	2.5	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	28.52	22.21	2.71	4.2
10	衰老/老邁	6	16.66	11.11	1.73	2.5	10	衰老/老邁	2	10.82	9.58	1.35	1.7	10	衰老/老邁	4	22.81	12.35	2.02	3.4
	其他非十大死因	54	149.95	108.72	0.93	22.9		其他非十大死因	17	92.01	80.96*-	0.63	14.4		其他非十大死因	30	171.10	93.84	1.27	25.4
11	慢性下呼吸道疾病	6	16.66	10.72	0.60	2.5	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.82	8.95	0.54	1.7	11	敗血症	4	22.81	11.23	1.93	3.4
12	慢性肝病及肝硬化	5	13.88	11.13	0.65	2.1	12	敗血症	1	5.41	5.94	0.45	0.8	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	17.11	8.53	7.14*	2.5
13	敗血症	5	13.88	10.23	1.16	2.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.41	5.08	1.26	0.8	13	主動脈瘤及剝離	3	17.11	8.10	5.22*	2.5
14	主動脈瘤及剝離	4	11.11	7.24	3.69	1.7	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.41	4.48	42.56	0.8	14	慢性肝病及肝硬化	2	11.41	6.82	1.10	1.7
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	8.33	5.46	3.41	1.3	15	結核病	1	5.41	4.18	1.56	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.70	5.78	0.97	0.8

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,011人 男性18,477人 女性17,534人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	360	743.74	488.70	1.04	100.0		所有死亡原因	202	799.62	608.89	1.01	100.0		所有死亡原因	158	682.74	366.91	1.09	100.0
	十大主要死因	294	607.39	393.52	1.12	81.7		十大主要死因	169	668.99	507.77	1.06	83.7		十大主要死因	128	553.11	290.59	1.20	81.0
1	惡性腫瘤	107	221.06	154.97	1.12	29.7	1	惡性腫瘤	64	253.34	190.24	1.02	31.7	1	惡性腫瘤	43	185.81	121.71	1.30	27.2
2	衰老/老邁	45	92.97	48.79*+	7.58*	12.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	87.09	66.91	0.97	10.9	2	衰老/老邁	25	108.03	42.89*+	7.28*	15.8
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	86.77	55.75	0.93	11.7	3	衰老/老邁	20	79.17	52.69*+	7.89*	9.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	86.42	40.61	0.88	12.7
4	肺炎	20	41.32	21.81	1.02	5.6	4	肺炎	14	55.42	38.53	1.26	6.9	4	糖尿病	9	38.89	19.68	0.74	5.7
5	糖尿病	19	39.25	24.70	0.91	5.3	5	事故傷害	11	43.54	37.74	0.80	5.4	5	腦血管疾病	7	30.25	13.60	0.68	4.4
6	腦血管疾病	18	37.19	25.25	0.80	5.0	6	腦血管疾病	11	43.54	35.72	0.89	5.4	6	肺炎	6	25.93	11.08	0.71	3.8
7	事故傷害	16	33.06	25.88	0.88	4.4	7	糖尿病	10	39.59	29.70	1.11	5.0	7	事故傷害	5	21.61	12.94	1.10	3.2
8	慢性下呼吸道疾病	11	22.73	13.44	0.67	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	7	27.71	23.99	0.83	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	5	21.61	8.33	1.25	3.2
9	慢性肝病及肝硬化	9	18.59	14.04	0.82	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	6	23.75	19.55	0.50	3.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.28	10.14	0.85	2.5
10	敗血症	7	14.46	8.89	0.99	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	15.83	12.70	0.76	2.0	10	敗血症	4	17.28	9.62	1.14	2.5
	其他非十大死因	66	136.35	95.18	0.80	18.3		其他非十大死因	33	130.63	101.13	0.81	16.3		其他非十大死因	30	129.63	76.32	0.78	19.0
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	12.40	8.02	0.63	1.7	11	帕金森病	4	15.83	10.15	3.84*	2.0	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.96	7.32	3.06	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	10.33	8.82	0.65	1.4	12	敗血症	3	11.88	8.32	0.84	1.5	12	高血壓性疾病	3	12.96	4.80	0.52	1.9
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.26	5.29	1.78	1.1	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	7.92	5.83	0.42	1.0	13	慢性肝病及肝硬化	2	8.64	3.45	0.73	1.3
14	帕金森病	4	8.26	4.64	2.19	1.1	14	胃及十二指腸潰瘍	2	7.92	4.86	3.29	1.0	14	加害(他殺)	1	4.32	8.81	8.73	0.6
15	高血壓性疾病	4	8.26	4.12*-	0.42	1.1	15	皮膚及皮下組織疾病	2	7.92	4.85	1.93	1.0	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	4.32	4.33	0.40	0.6

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計48,404人 男性25,262人 女性23,142人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	270	686.13	478.04	1.05	100.0		所有死亡原因	157	771.69	623.74	1.04	100.0		所有死亡原因	113	594.55	334.47	1.05	100.0
	十大主要死因	212	538.74	376.34	1.05	78.5		十大主要死因	132	648.81	524.34	1.12	84.1		十大主要死因	86	452.49	257.12	1.09	76.1
1	惡性腫瘤	76	193.13	146.34	1.04	28.1	1	惡性腫瘤	52	255.59	213.27	1.09	33.1	1	惡性腫瘤	24	126.28	85.21	0.95	21.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	94.03	62.19	1.11	13.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	103.22	80.57	1.23	13.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	84.18	43.38	0.97	14.2
3	肺炎	20	50.82	31.21	1.40	7.4	3	肺炎	13	63.90	50.97	1.60	8.3	3	高血壓性疾病	8	42.09	18.47	1.94	7.1
4	腦血管疾病	15	38.12	27.34	0.90	5.6	4	腦血管疾病	9	44.24	33.21	0.99	5.7	4	敗血症	7	36.83	20.96	2.80*	6.2
5	高血壓性疾病	13	33.04	19.06	1.88	4.8	5	事故傷害	8	39.32	37.26	0.75	5.1	5	糖尿病	7	36.83	20.74	0.78	6.2
6	事故傷害	11	27.95	23.83	0.78	4.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	34.41	28.07	2.00	4.5	6	肺炎	7	36.83	15.24	1.17	6.2
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	25.41	17.52	1.43	3.7	7	慢性肝病及肝硬化	7	34.41	25.64	1.06	4.5	7	腦血管疾病	6	31.57	22.40	0.80	5.3
8	慢性肝病及肝硬化	10	25.41	17.33	1.17	3.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	24.58	19.42	1.21	3.2	8	慢性下呼吸道疾病	5	26.31	11.50	1.75	4.4
9	糖尿病	10	25.41	17.14	0.64	3.7	9	高血壓性疾病	5	24.58	18.04	1.77	3.2	9	事故傷害	3	15.78	10.39	0.85	2.7
10	慢性下呼吸道疾病	10	25.41	14.38	0.84	3.7	10	慢性下呼吸道疾病	5	24.58	17.91*-	0.57	3.2	10	慢性肝病及肝硬化	3	15.78	8.82	1.47	2.7
	其他非十大死因	58	147.39	101.70	1.01	21.5		其他非十大死因	25	122.88	99.40	0.77	15.9		其他非十大死因	27	142.06	77.35	0.96	23.9
11	敗血症	9	22.87	14.92	1.74	3.3	11	主動脈瘤及剝離	3	14.75	12.19	5.03*	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.78	6.92	0.87	2.7
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	15.25	12.28	0.98	2.2	12	糖尿病	3	14.75	12.16*-	0.45	1.9	12	胃及十二指腸潰瘍	2	10.52	4.29	4.51	1.8
13	主動脈瘤及剝離	4	10.16	7.73	3.21	1.5	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	14.75	11.73	5.51*	1.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.26	5.08	0.50	0.9
14	胃及十二指腸潰瘍	3	7.62	5.76	3.36	1.1	14	敗血症	2	9.83	7.85	0.75	1.3	14	帕金森病	1	5.26	2.39	1.71	0.9
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	7.62	4.24	2.83	1.1	15	胃及十二指腸潰瘍	1	4.92	5.68	2.28	0.6	15	主動脈瘤及剝離	1	5.26	2.39	1.50	0.9

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,351人 男性20,345人 女性19,006人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	296	643.03	458.73	0.99	100.0		所有死亡原因	172	725.92	567.16	0.96	100.0		所有死亡原因	124	555.11	362.84	1.04	100.0
	十大主要死因	225	488.79	349.49	0.98	76.0		十大主要死因	132	557.10	435.78	0.94	76.7		十大主要死因	97	434.24	274.99	1.10	78.2
1	惡性腫瘤	79	171.62	126.63	0.92	26.7	1	惡性腫瘤	49	206.80	161.02	0.86	28.5	1	惡性腫瘤	30	134.30	91.78	1.03	24.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	82.55	57.80	0.99	12.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	84.41	64.79	0.98	11.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	80.58	51.96	1.00	14.5
3	慢性下呼吸道疾病	19	41.28	27.13	1.42	6.4	3	慢性下呼吸道疾病	15	63.31	48.30	1.44	8.7	3	糖尿病	10	44.77	27.90	1.02	8.1
4	腦血管疾病	17	36.93	24.63	0.89	5.7	4	慢性肝病及肝硬化	10	42.20	35.08	1.26	5.8	4	腦血管疾病	10	44.77	27.62	1.20	8.1
5	糖尿病	16	34.76	23.65	0.90	5.4	5	事故傷害	9	37.98	34.89	0.71	5.2	5	肺炎	9	40.29	25.17	1.40	7.3
6	肺炎	16	34.76	23.29	1.00	5.4	6	肺炎	7	29.54	22.74	0.72	4.1	6	高血壓性疾病	5	22.38	12.21	1.13	4.0
7	慢性肝病及肝硬化	12	26.07	21.72	1.17	4.1	7	腦血管疾病	7	29.54	21.94	0.64	4.1	7	慢性下呼吸道疾病	4	17.91	10.74	1.30	3.2
8	事故傷害	12	26.07	21.61	0.72	4.1	8	糖尿病	6	25.32	17.88	0.75	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.91	8.96	1.04	3.2
9	敗血症	9	19.55	12.35	1.54	3.0	9	敗血症	5	21.10	16.17	1.57	2.9	9	敗血症	4	17.91	8.60	1.48	3.2
10	高血壓性疾病	7	15.21	10.68	0.90	2.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	16.88	12.98	3.57	2.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	13.43	10.05	1.27	2.4
	其他非十大死因	71	154.24	109.23	1.05	24.0		其他非十大死因	40	168.82	131.39	1.02	23.3		其他非十大死因	27	120.87	87.85	0.86	21.8
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	15.21	10.18	2.86*	2.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.66	9.80	0.60	1.7	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	13.43	9.67	2.26	2.4
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.03	9.82	0.82	2.0	12	高血壓性疾病	2	8.44	7.60	0.59	1.2	12	事故傷害	3	13.43	8.31	0.73	2.4
13	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	13.03	7.73	0.76	2.0	13	膽結石及其他膽囊疾患	2	8.44	6.49	4.25	1.2	13	動脈粥樣硬化	2	8.95	11.34	10.93*	1.6
14	主動脈瘤及剝離	4	8.69	5.74	2.78	1.4	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.44	6.45	1.80	1.2	14	慢性肝病及肝硬化	2	8.95	7.84	0.86	1.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.52	4.83	1.56	1.0	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	8.44	6.26	0.49	1.2	15	主動脈瘤及剝離	2	8.95	4.96	2.72	1.6

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,032人 男性23,694人 女性22,338人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	252	1,025.89	535.31*+	1.14*	100.0		所有死亡原因	158	1,216.13	721.62*+	1.21*	100.0		所有死亡原因	94	812.38	338.95	1.01	100.0
	十大主要死因	203	826.41	421.03*+	1.18*	80.6		十大主要死因	134	1,031.40	609.29*+	1.28*	84.8		十大主要死因	71	613.60	252.58	1.03	75.5
1	惡性腫瘤	55	223.90	131.65	0.92	21.8	1	惡性腫瘤	39	300.18	184.68	0.97	24.7	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	146.92	52.38	1.14	18.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	150.63	62.39	1.25	14.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	153.94	77.61	1.33	12.7	2	惡性腫瘤	16	138.28	75.08	0.79	17.0
3	糖尿病	23	93.63	46.23	1.67*	9.1	3	糖尿病	14	107.76	63.57*+	2.36*	8.9	3	糖尿病	9	77.78	25.19	1.13	9.6
4	肺炎	16	65.14	27.27	1.20	6.3	4	慢性下呼吸道疾病	13	100.06	51.15	1.49	8.2	4	腦血管疾病	6	51.85	24.61	0.89	6.4
5	慢性下呼吸道疾病	16	65.14	24.82	1.42	6.3	5	事故傷害	11	84.67	62.92	1.39	7.0	5	肺炎	5	43.21	14.46	0.90	5.3
6	事故傷害	15	61.06	42.15	1.45	6.0	6	肺炎	11	84.67	44.03	1.40	7.0	6	高血壓性疾病	5	43.21	13.98	1.31	5.3
7	腦血管疾病	14	56.99	27.94	0.94	5.6	7	慢性肝病及肝硬化	10	76.97	54.77	2.03	6.3	7	事故傷害	4	34.57	18.45	1.50	4.3
8	慢性肝病及肝硬化	11	44.78	31.93	1.70	4.4	8	腦血管疾病	8	61.58	32.45	0.96	5.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	34.57	12.29	1.31	4.3
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	32.57	14.75	1.28	3.2	9	敗血症	4	30.79	22.33	1.64	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	3	25.93	6.82	1.14	3.2
10	高血壓性疾病	8	32.57	11.90	1.23	3.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	30.79	15.78	1.23	2.5	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	17.28	9.32	1.42	2.1
	其他非十大死因	49	199.48	114.29	0.99	19.4		其他非十大死因	24	184.73	112.33	0.91	15.2		其他非十大死因	23	198.77	86.37	0.95	24.5
11	敗血症	5	20.35	13.75	1.06	2.0	11	高血壓性疾病	3	23.09	10.40	1.10	1.9	11	衰老/老邁	2	17.28	4.36	0.87	2.1
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	16.28	11.37	0.92	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	15.39	12.07	0.66	1.3	12	源於周產期的特定病況	1	8.64	15.19	4.87	1.1
13	結核病	2	8.14	5.61	1.60	0.8	13	結核病	2	15.39	11.16	2.71	1.3	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	8.64	4.49	2.27	1.1
14	帕金森病	2	8.14	4.80	1.59	0.8	14	帕金森病	2	15.39	9.89	2.72	1.3	14	慢性肝病及肝硬化	1	8.64	3.44	0.57	1.1
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	8.14	4.38	2.06	0.8	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	7.70	4.27	1.88	0.6	15	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	8.64	2.18	12.18	1.1

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,564人 男性12,992人 女性11,571人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	270	739.71	503.78	1.09	100.0		所有死亡原因	162	852.54	652.83	1.10	100.0		所有死亡原因	108	617.14	362.18	1.07	100.0
	十大主要死因	210	575.33	394.94	1.13	77.8		十大主要死因	129	678.88	520.23	1.13	79.6		十大主要死因	83	474.29	276.95	1.10	76.9
1	惡性腫瘤	85	232.87	162.57	1.20	31.5	1	惡性腫瘤	54	284.18	210.83	1.16	33.3	1	惡性腫瘤	31	177.14	117.82	1.27	28.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	84.93	54.10	0.97	11.5	2	慢性下呼吸道疾病	18	94.73	68.91*+	2.08*	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	85.71	46.04	0.99	13.9
3	慢性下呼吸道疾病	21	57.53	34.68*+	1.85*	7.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	84.20	64.07	0.96	9.9	3	腦血管疾病	8	45.71	25.46	1.13	7.4
4	事故傷害	12	32.88	29.25	0.88	4.4	4	事故傷害	10	52.63	47.13	0.97	6.2	4	糖尿病	7	40.00	18.04	0.82	6.5
5	蓄意自我傷害(自殺)	12	32.88	26.69	2.02*	4.4	5	蓄意自我傷害(自殺)	8	42.10	35.39	1.99	4.9	5	高血壓性疾病	6	34.29	14.88	1.59	5.6
6	腦血管疾病	12	32.88	20.82	0.74	4.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	26.31	24.16	1.47	3.1	6	蓄意自我傷害(自殺)	4	22.86	17.97	2.07	3.7
7	高血壓性疾病	11	30.14	18.30	1.67	4.1	7	高血壓性疾病	5	26.31	19.93	1.77	3.1	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.86	12.95	1.22	3.7
8	糖尿病	11	30.14	18.06	0.73	4.1	8	慢性肝病及肝硬化	5	26.31	19.32	0.78	3.1	8	肺炎	3	17.14	7.65	0.55	2.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	24.66	18.54	1.34	3.3	9	糖尿病	4	21.05	15.62	0.61	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	3	17.14	7.33	1.15	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	6	16.44	11.93	0.72	2.2	10	腦血管疾病	4	21.05	14.88*-	0.44	2.5	10	事故傷害	2	11.43	8.81	0.60	1.9
	其他非十大死因	60	164.38	108.84	0.97	22.2		其他非十大死因	33	173.67	132.60	0.99	20.4		其他非十大死因	25	142.86	85.22	0.99	23.1
11	肺炎	5	13.70	8.09*-	0.37*	1.9	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	15.79	12.08	3.27	1.9	11	結核病	2	11.43	5.46	3.92	1.9
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	10.96	7.06	2.50	1.5	12	肺炎	2	10.53	8.04*-	0.25*	1.2	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.43	5.03	3.43	1.9
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	8.22	4.93	2.99	1.1	13	貧血	2	10.53	7.91	12.57*	1.2	13	源於周產期的特定病況	1	5.71	11.46	3.66	0.9
14	貧血	2	5.48	4.07	5.84	0.7	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	10.53	7.55	3.71	1.2	14	慢性肝病及肝硬化	1	5.71	4.24	0.50	0.9
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	5.48	3.18	2.49	0.7	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.26	6.02	1.09	0.6	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.71	4.07	4.02	0.9

附 註：1.彰化縣大村鄉年中人口數 計36,501人 男性19,002人 女性17,500人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	295	870.28	472.64	1.01	100.0		所有死亡原因	157	883.91	578.03	0.93	100.0		所有死亡原因	138	855.28	359.87	1.09	100.0
	十大主要死因	245	722.78	396.31	1.10	83.1		十大主要死因	135	760.05	490.43	1.02	86.0		十大主要死因	113	700.34	301.59*+	1.27*	81.9
1	惡性腫瘤	84	247.81	153.34	1.07	28.5	1	惡性腫瘤	51	287.13	190.20	0.98	32.5	1	惡性腫瘤	33	204.52	114.78	1.21	23.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	138.66	65.24	1.20	15.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	118.23	71.16	1.09	13.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	161.14	54.97	1.29	18.8
3	腦血管疾病	26	76.70	38.12	1.32	8.8	3	腦血管疾病	16	90.08	56.99	1.51	10.2	3	腦血管疾病	10	61.98	18.85	1.09	7.2
4	糖尿病	16	47.20	24.99	0.88	5.4	4	事故傷害	11	61.93	55.24	1.05	7.0	4	糖尿病	8	49.58	25.51	0.74	5.8
5	事故傷害	15	44.25	41.55	1.07	5.1	5	糖尿病	8	45.04	26.07	1.04	5.1	5	衰老/老邁	8	49.58	13.00	2.55*	5.8
6	敗血症	13	38.35	16.45	2.08*	4.4	6	敗血症	7	39.41	23.34	2.22	4.5	6	肺炎	7	43.38	14.29	0.92	5.1
7	肺炎	13	38.35	15.59	0.73	4.4	7	肺炎	6	33.78	18.02	0.60	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	6	37.19	12.50	1.67	4.3
8	慢性下呼吸道疾病	12	35.40	14.18	0.81	4.1	8	慢性下呼吸道疾病	6	33.78	16.91*-	0.55	3.8	8	敗血症	6	37.19	9.82	1.91	4.3
9	衰老/老邁	12	35.40	12.94	2.20*	4.1	9	慢性肝病及肝硬化	5	28.15	20.40	0.78	3.2	9	阿茲海默病	5	30.99	10.62*+	25.09*	3.6
10	慢性肝病及肝硬化	7	20.65	13.91	0.82	2.4	10	衰老/老邁	4	22.52	12.11	1.72	2.5	10	事故傷害	4	24.79	27.26	1.10	2.9
	其他非十大死因	50	147.51	76.33*-	0.71*	16.9		其他非十大死因	22	123.86	87.60*-	0.62*	14.0		其他非十大死因	25	154.94	58.28*-	0.67*	18.1
11	高血壓性疾病	6	17.70	7.84	0.70	2.0	11	結核病	3	16.89	9.00	3.17	1.9	11	高血壓性疾病	4	24.79	6.35	0.77	2.9
12	阿茲海默病	5	14.75	5.98*+	19.21*	1.7	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.26	7.73	1.83	1.3	12	慢性肝病及肝硬化	2	12.40	6.39	0.84	1.4
13	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	8.85	4.44*-	0.36	1.0	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.26	7.68	0.48	1.3	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.20	5.67	0.72	0.7
14	結核病	3	8.85	3.41	1.81	1.0	14	高血壓性疾病	2	11.26	6.88	0.58	1.3	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	6.20	4.80	4.25	0.7
15	先天性畸形變形及染色體異常	2	5.90	8.06	5.38	0.7	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.63	11.04	7.53	0.6	15	腸道感染症	1	6.20	2.48	5.18	0.7

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,897人 男性17,762人 女性16,135人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	249	706.74	467.58	0.99	100.0		所有死亡原因	142	780.91	588.18	0.96	100.0		所有死亡原因	107	627.64	334.93	1.02	100.0
	十大主要死因	205	581.86	377.70	1.04	82.3		十大主要死因	122	670.92	501.06	1.02	85.9		十大主要死因	85	498.59	263.82	1.11	79.4
1	惡性腫瘤	68	193.01	135.74	0.96	27.3	1	惡性腫瘤	43	236.47	173.56	0.93	30.3	1	惡性腫瘤	25	146.64	94.63	1.03	23.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	90.83	51.33	0.98	12.9	2	腦血管疾病	17	93.49	67.59	1.87*	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	111.45	53.06	1.18	17.8
3	腦血管疾病	24	68.12	42.08	1.46	9.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	71.49	49.19	0.77	9.2	3	高血壓性疾病	12	70.39	29.85*+	2.97*	11.2
4	糖尿病	17	48.25	30.06	1.11	6.8	4	慢性肝病及肝硬化	10	54.99	44.73	1.60	7.0	4	糖尿病	9	52.79	25.10	1.02	8.4
5	高血壓性疾病	16	45.41	24.13*+	2.33*	6.4	5	慢性下呼吸道疾病	9	49.49	39.43	1.01	6.3	5	腦血管疾病	7	41.06	18.36	0.95	6.5
6	慢性肝病及肝硬化	13	36.90	29.09	1.59	5.2	6	事故傷害	9	49.49	39.08	0.89	6.3	6	肺炎	4	23.46	8.84	0.68	3.7
7	事故傷害	11	31.22	24.22	0.82	4.4	7	糖尿病	8	43.99	32.36	1.21	5.6	7	慢性肝病及肝硬化	3	17.60	11.24	1.49	2.8
8	慢性下呼吸道疾病	10	28.38	19.07	0.84	4.0	8	肺炎	6	33.00	24.47	0.73	4.2	8	事故傷害	2	11.73	9.12	0.59	1.9
9	肺炎	10	28.38	16.26	0.71	4.0	9	高血壓性疾病	4	22.00	14.39	1.40	2.8	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.73	8.36	1.73	1.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	11.35	5.73*-	0.58	1.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.50	16.26	0.76	2.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.73	5.24	0.59	1.9
	其他非十大死因	44	124.89	89.88	0.79	17.7		其他非十大死因	20	109.99	87.12	0.69	14.1		其他非十大死因	22	129.05	71.11	0.78	20.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	8.51	8.68	0.51	1.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.00	6.52	0.58	1.4	11	源於周產期的特定病況	1	5.87	10.78	3.44	0.9
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.51	6.26	1.43	1.2	12	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.50	11.88	7.90	0.7	12	慢性下呼吸道疾病	1	5.87	4.09	0.36	0.9
13	敗血症	2	5.68	3.61	0.39	0.8	13	疝氣及腸阻塞	1	5.50	4.29	2.34	0.7	13	敗血症	1	5.87	2.85	0.41	0.9
14	先天性畸形變形及染色體異常	1	2.84	5.65	2.66	0.4	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.50	4.29	1.07	0.7	14	流行性感冒	1	5.87	2.15	4.78	0.9
15	源於周產期的特定病況	1	2.84	5.65	1.87	0.4	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.50	4.01	1.08	0.7	15	結核病	1	5.87	2.15	1.82	0.9

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計35,232人 男性18,184人 女性17,048人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	313	806.45	509.81	1.10	100.0		所有死亡原因	185	917.16	678.31	1.12	100.0		所有死亡原因	128	686.62	349.72	1.08	100.0
	十大主要死因	249	641.55	404.52	1.13	79.6		十大主要死因	150	743.64	546.97	1.13	81.1		十大主要死因	100	536.42	274.40	1.17	78.1
1	惡性腫瘤	96	247.35	160.87	1.21	30.7	1	惡性腫瘤	62	307.37	214.32	1.19	33.5	1	惡性腫瘤	34	182.38	111.06	1.23	26.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	74.72	43.01	0.79	9.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	74.36	53.69	0.80	8.1	2	糖尿病	15	80.46	41.78	1.50	11.7
3	糖尿病	27	69.57	42.88	1.56*	8.6	3	慢性下呼吸道疾病	12	59.49	44.95	1.21	6.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	75.10	30.44	0.76	10.9
4	腦血管疾病	21	54.11	35.37	1.13	6.7	4	糖尿病	12	59.49	43.78	1.62	6.5	4	腦血管疾病	12	64.37	30.26	1.43	9.4
5	肺炎	19	48.95	27.08	1.19	6.1	5	事故傷害	11	54.53	45.51	0.99	5.9	5	肺炎	9	48.28	18.11	1.33	7.0
6	慢性下呼吸道疾病	16	41.22	24.10	1.19	5.1	6	肺炎	10	49.58	35.04	1.10	5.4	6	高血壓性疾病	5	26.82	10.68	1.08	3.9
7	事故傷害	13	33.49	26.00	0.88	4.2	7	腦血管疾病	9	44.62	37.88	0.88	4.9	7	慢性下呼吸道疾病	4	21.46	8.25	1.24	3.1
8	高血壓性疾病	11	28.34	15.20	1.42	3.5	8	慢性肝病及肝硬化	8	39.66	31.18	1.16	4.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.09	6.47	0.78	2.3
9	慢性肝病及肝硬化	9	23.19	18.62	0.99	2.9	9	高血壓性疾病	6	29.75	22.20	1.87	3.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.73	9.99	0.96	1.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	20.61	11.38	1.03	2.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	24.79	18.42	1.29	2.7	10	主動脈瘤及剝離	2	10.73	7.35	2.69	1.6
	其他非十大死因	64	164.90	105.29	1.02	20.4		其他非十大死因	35	173.52	131.34	1.07	18.9		其他非十大死因	28	150.20	75.32	0.84	21.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	15.46	12.31	0.94	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	19.83	14.96	0.93	2.2	11	帕金森病	2	10.73	4.62	3.12	1.6
12	敗血症	3	7.73	5.06	0.52	1.0	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.92	6.97	1.93	1.1	12	事故傷害	2	10.73	4.54*-	0.53	1.6
13	主動脈瘤及剝離	3	7.73	4.88	2.20	1.0	13	源於周產期的特定病況	1	4.96	10.23	3.50	0.5	13	敗血症	2	10.73	4.13	0.71	1.6
14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	5.36	4.64	11.14	0.3	14	敗血症	1	4.96	4.65	0.34	0.5	14	貧血	1	5.36	5.35	4.62	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.15	3.53	1.09	0.6	15	結核病	1	4.96	3.54	1.15	0.5	15	慢性肝病及肝硬化	1	5.36	4.89	0.44	0.8

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,812人 男性20,171人 女性18,642人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	316	713.09	469.98	1.01	100.0		所有死亡原因	185	812.87	595.11	1.00	100.0		所有死亡原因	131	607.72	341.03	1.02	100.0
	十大主要死因	253	570.93	378.58	1.05	80.1		十大主要死因	154	676.66	489.56	1.03	83.2		十大主要死因	103	477.83	280.71	1.07	78.6
1	惡性腫瘤	87	196.33	133.28	0.97	27.5	1	惡性腫瘤	58	254.84	182.77	0.99	31.4	1	惡性腫瘤	29	134.53	85.43	0.94	22.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	83.50	54.33	0.92	11.7	2	慢性下呼吸道疾病	18	79.09	56.59	1.65	9.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	102.06	54.03	1.12	16.8
3	事故傷害	24	54.16	46.33	1.43	7.6	3	事故傷害	17	74.70	57.22	1.35	9.2	3	糖尿病	11	51.03	23.50	1.02	8.4
4	慢性下呼吸道疾病	24	54.16	32.08*+	1.65*	7.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	65.91	46.85	0.71	8.1	4	事故傷害	7	32.47	35.53	1.66	5.3
5	腦血管疾病	19	42.88	26.64	0.93	6.0	5	腦血管疾病	14	61.51	43.33	1.22	7.6	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	32.47	19.75	1.67	5.3
6	糖尿病	18	40.62	23.47	0.94	5.7	6	肺炎	7	30.76	22.98	0.71	3.8	6	高血壓性疾病	7	32.47	14.48	1.44	5.3
7	肺炎	13	29.34	17.28	0.76	4.1	7	慢性肝病及肝硬化	7	30.76	22.90	0.89	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	6	27.83	15.40	1.78	4.6
8	高血壓性疾病	12	27.08	15.43	1.43	3.8	8	糖尿病	7	30.76	22.32	0.84	3.8	8	肺炎	6	27.83	11.26	0.85	4.6
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	22.57	14.21	1.17	3.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	26.36	19.74	1.23	3.2	9	腦血管疾病	5	23.20	10.96*-	0.55	3.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	9	20.31	15.53	1.25	2.8	10	高血壓性疾病	5	21.97	14.86	1.38	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	13.92	10.37	1.27	2.3
	其他非十大死因	63	142.17	91.40	0.88	19.9		其他非十大死因	31	136.21	105.55	0.86	16.8		其他非十大死因	28	129.89	60.32	0.86	21.4
11	慢性肝病及肝硬化	8	18.05	13.06	0.78	2.5	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	13.18	10.00	2.61	1.6	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	13.92	8.45	3.47	2.3
12	敗血症	6	13.54	7.35	0.97	1.9	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.18	8.33	0.69	1.6	12	衰老/老邁	3	13.92	5.65	1.05	2.3
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	9.03	5.38	1.98	1.3	13	敗血症	3	13.18	8.16	0.92	1.6	13	敗血症	3	13.92	5.65	1.02	2.3
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.77	4.51	1.16	0.9	14	源於周產期的特定病況	2	8.79	16.55	5.66	1.1	14	疝氣及腸阻塞	2	9.28	4.20	8.52	1.5
15	衰老/老邁	3	6.77	3.58	0.59	0.9	15	帕金森病	1	4.39	4.44	1.03	0.5	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.64	3.39	7.34	0.8

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計44,314人 男性22,759人 女性21,556人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	189	1,163.86	511.32	1.09	100.0		所有死亡原因	111	1,301.29	667.90	1.08	100.0		所有死亡原因	78	1,011.67	363.95	1.06	100.0
	十大主要死因	151	929.86	419.62	1.13	79.9		十大主要死因	91	1,066.82	555.14	1.12	82.0		十大主要死因	60	778.21	293.37	1.12	76.9
1	惡性腫瘤	46	283.27	155.88	0.99	24.3	1	惡性腫瘤	32	375.15	211.06	1.03	28.8	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	220.49	64.78	1.44	21.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	197.06	77.95	1.36	16.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	175.85	87.67	1.26	13.5	2	惡性腫瘤	14	181.58	105.96	0.88	17.9
3	肺炎	19	117.00	39.38	1.76*	10.1	3	腦血管疾病	10	117.23	62.78	1.51	9.0	3	肺炎	9	116.73	31.92	2.02	11.5
4	腦血管疾病	16	98.53	50.90	1.35	8.5	4	肺炎	10	117.23	48.45	1.54	9.0	4	腦血管疾病	6	77.82	41.05	1.13	7.7
5	慢性下呼吸道疾病	9	55.42	16.20	0.98	4.8	5	慢性下呼吸道疾病	7	82.06	31.89	0.96	6.3	5	糖尿病	5	64.85	15.32	0.79	6.4
6	事故傷害	7	43.11	24.67	0.93	3.7	6	事故傷害	6	70.34	45.12	1.06	5.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	51.88	11.72	1.63	5.1
7	糖尿病	7	43.11	13.02*-	0.63	3.7	7	慢性肝病及肝硬化	4	46.89	34.58	1.13	3.6	7	慢性下呼吸道疾病	2	25.94	5.41	0.94	2.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	36.95	10.81	1.19	3.2	8	敗血症	3	35.17	12.69	1.53	2.7	8	慢性肝病及肝硬化	1	12.97	8.47	0.72	1.3
9	慢性肝病及肝硬化	5	30.79	22.37	1.04	2.6	9	高血壓性疾病	2	23.45	11.83	0.89	1.8	9	敗血症	1	12.97	5.13	0.54	1.3
10	敗血症	4	24.63	8.43	1.06	2.1	10	糖尿病	2	23.45	9.06*-	0.43	1.8	10	事故傷害	1	12.97	3.61*-	0.49	1.3
	其他非十大死因	38	234.00	91.70	0.95	20.1		其他非十大死因	20	234.47	112.76	0.95	18.0		其他非十大死因	18	233.46	70.58	0.91	23.1
11	高血壓性疾病	3	18.47	8.63	0.57	1.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	23.45	7.26	0.76	1.8	11	高血壓性疾病	1	12.97	3.61	0.33	1.3
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.32	3.82	1.35	1.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	11.72	10.76	0.47	0.9	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.97	3.59	1.24	1.3
13	結核病	2	12.32	3.46	1.99	1.1	13	結核病	1	11.72	4.80	1.69	0.9	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	12.97	2.70	2.67	1.3
14	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.16	5.70	0.32	0.5	14	皮膚及皮下組織疾病	1	11.72	4.80	1.66	0.9	14	結核病	1	12.97	2.70	2.44	1.3
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.16	1.73	1.26	0.5	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	11.72	4.53	1.49	0.9	15	帕金森病	1	12.97	2.70	2.43	1.3

附 註：1.彰化縣二水鄉年中人口數 計16,239人 男性8,530人 女性7,710人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	271	960.92	551.97*+	1.15*	100.0		所有死亡原因	172	1,170.94	767.46*+	1.26*	100.0		所有死亡原因	99	732.57	334.47	0.98	100.0
	十大主要死因	209	741.08	418.03*+	1.16*	77.1		十大主要死因	135	919.06	601.53*+	1.24*	78.5		十大主要死因	77	569.78	254.73	1.06	77.8
1	惡性腫瘤	73	258.85	163.10	1.15	26.9	1	惡性腫瘤	53	360.81	246.14	1.26	30.8	1	惡性腫瘤	20	147.99	76.68	0.91	20.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	99.28	51.44	0.89	10.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	108.93	67.83	1.02	9.3	2	腦血管疾病	13	96.20	41.59	1.79	13.1
3	腦血管疾病	23	81.55	44.02	1.46	8.5	3	事故傷害	11	74.89	55.92	1.29	6.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	88.80	33.80	0.75	12.1
4	肺炎	19	67.37	31.27	1.34	7.0	4	肺炎	11	74.89	44.02	1.34	6.4	4	糖尿病	8	59.20	33.25	0.93	8.1
5	事故傷害	13	46.10	33.64	1.15	4.8	5	腦血管疾病	10	68.08	43.68	1.16	5.8	5	肺炎	8	59.20	19.01	1.34	8.1
6	糖尿病	13	46.10	29.43	0.89	4.8	6	慢性下呼吸道疾病	9	61.27	31.45	1.00	5.2	6	慢性下呼吸道疾病	4	29.60	13.51	1.41	4.0
7	慢性下呼吸道疾病	13	46.10	19.72	1.09	4.8	7	慢性肝病及肝硬化	8	54.46	32.52	1.51	4.7	7	衰老/老邁	4	29.60	8.52	1.63	4.0
8	慢性肝病及肝硬化	10	35.46	20.62	1.43	3.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	6	40.85	33.49	1.83	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	22.20	10.95	0.91	3.0
9	衰老/老邁	10	35.46	14.26	2.29*	3.7	9	衰老/老邁	6	40.85	22.03	3.15*	3.5	9	敗血症	3	22.20	8.03	1.21	3.0
10	敗血症	7	24.82	10.52	1.40	2.6	10	糖尿病	5	34.04	24.45	0.81	2.9	10	慢性肝病及肝硬化	2	14.80	9.39	1.06	2.0
	其他非十大死因	62	219.84	133.94	1.09	22.9		其他非十大死因	37	251.89	165.93	1.31	21.5		其他非十大死因	22	162.79	79.74	0.79	22.2
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	21.28	18.06	1.25	2.2	11	敗血症	4	27.23	14.72	1.56	2.3	11	事故傷害	2	14.80	6.81	0.68	2.0
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	21.28	11.25	0.90	2.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	20.42	12.37	0.90	1.7	12	高血壓性疾病	2	14.80	4.96	0.49	2.0
13	結核病	3	10.64	4.66	2.26	1.1	13	結核病	2	13.62	7.73	2.58	1.2	13	加害(他殺)	1	7.40	7.95	15.10	1.0
14	高血壓性疾病	3	10.64	4.30*-	0.44	1.1	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	13.62	7.41	3.63	1.2	14	主動脈瘤及剝離	1	7.40	7.05	1.58	1.0
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	10.64	3.97	2.88	1.1	15	流行性感冒	1	6.81	6.44	4.29	0.6	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.40	5.99	0.90	1.0

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計28,202人 男性14,689人 女性13,514人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	283	899.61	497.45	1.05	100.0		所有死亡原因	166	1,011.82	656.01	1.09	100.0		所有死亡原因	117	777.31	354.53	0.99	100.0
	十大主要死因	235	747.03	413.77*+	1.13	83.0		十大主要死因	145	883.82	564.00*+	1.22*	87.3		十大主要死因	93	617.86	285.33	1.09	79.5
1	惡性腫瘤	83	263.84	152.74	1.13	29.3	1	惡性腫瘤	52	316.96	197.98	1.09	31.3	1	惡性腫瘤	31	205.95	115.44	1.20	26.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	117.62	62.23	1.03	13.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	109.72	71.29	1.03	10.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	126.23	51.15	1.01	16.2
3	腦血管疾病	23	73.11	35.46	1.27	8.1	3	肺炎	14	85.33	50.07	1.58	8.4	3	糖尿病	11	73.08	23.79	1.09	9.4
4	肺炎	20	63.58	27.04	1.24	7.1	4	腦血管疾病	14	85.33	49.26	1.45	8.4	4	腦血管疾病	9	59.79	27.05	1.06	7.7
5	慢性肝病及肝硬化	16	50.86	37.88*+	2.00*	5.7	5	慢性肝病及肝硬化	12	73.14	53.16	2.02*	7.2	5	肺炎	6	39.86	11.33	0.86	5.1
6	慢性下呼吸道疾病	16	50.86	23.24	1.18	5.7	6	慢性下呼吸道疾病	12	73.14	39.25	1.23	7.2	6	慢性肝病及肝硬化	4	26.57	19.98	1.78	3.4
7	事故傷害	13	41.32	34.56	1.01	4.6	7	事故傷害	10	60.95	55.99	1.05	6.0	7	慢性下呼吸道疾病	4	26.57	12.94	1.21	3.4
8	糖尿病	13	41.32	18.68	0.77	4.6	8	高血壓性疾病	5	30.48	14.86	1.61	3.0	8	事故傷害	3	19.93	11.69	0.88	2.6
9	高血壓性疾病	8	25.43	10.01	1.03	2.8	9	敗血症	4	24.38	17.55	1.43	2.4	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	19.93	6.69	2.32	2.6
10	敗血症	6	19.07	11.92	1.06	2.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.38	14.60	1.07	2.4	10	高血壓性疾病	3	19.93	5.26	0.63	2.6
	其他非十大死因	48	152.58	83.68	0.78	17.0		其他非十大死因	21	128.00	92.01*-	0.61*	12.7		其他非十大死因	24	159.45	69.19	0.74	20.5
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	19.07	9.91	0.79	2.1	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	18.29	14.88	0.82	1.8	11	結核病	2	13.29	7.49	3.10	1.7
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	12.72	9.33	0.74	1.4	12	糖尿病	2	12.19	8.73*-	0.29	1.2	12	敗血症	2	13.29	7.33	0.69	1.7
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	12.72	5.21	1.76	1.4	13	胃及十二指腸潰瘍	2	12.19	7.71	4.10	1.2	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.29	6.84	0.52	1.7
14	主動脈瘤及剝離	3	9.54	3.60	2.34	1.1	14	皮膚及皮下組織疾病	2	12.19	6.89	2.40	1.2	14	帕金森病	2	13.29	3.82	2.98	1.7
15	胃及十二指腸潰瘍	2	6.36	3.87	2.04	0.7	15	主動脈瘤及剝離	2	12.19	5.75	3.48	1.2	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.64	2.07*-	0.56	0.9

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,458人 男性16,406人 女性15,052人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	372	1,046.59	488.09	1.01	100.0		所有死亡原因	215	1,143.62	643.66	1.04	100.0		所有死亡原因	157	937.59	313.76	0.95	100.0
	十大主要死因	309	869.35	404.60	1.09	83.1		十大主要死因	184	978.72	546.07	1.12	85.6		十大主要死因	125	746.49	250.28	1.05	79.6
1	惡性腫瘤	104	292.60	144.68	1.07	28.0	1	惡性腫瘤	76	404.26	221.65	1.20	35.3	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	173.19	48.32	1.08	18.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	163.18	70.04	1.16	15.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	154.26	88.29	1.23	13.5	2	惡性腫瘤	28	167.21	66.76	0.82	17.8
3	腦血管疾病	34	95.66	43.49	1.36	9.1	3	腦血管疾病	22	117.02	63.75*+	1.67*	10.2	3	糖尿病	14	83.61	31.25	0.98	8.9
4	肺炎	23	64.71	22.16	0.99	6.2	4	事故傷害	15	79.79	55.94	1.25	7.0	4	肺炎	14	83.61	19.02	1.37	8.9
5	事故傷害	21	59.08	43.15	1.31	5.6	5	慢性肝病及肝硬化	9	47.87	31.76	1.20	4.2	5	腦血管疾病	12	71.66	21.93	1.00	7.6
6	糖尿病	20	56.27	22.95	0.85	5.4	6	肺炎	9	47.87	24.05	0.71	4.2	6	慢性肝病及肝硬化	9	53.75	15.79	2.92*	5.7
7	慢性肝病及肝硬化	18	50.64	26.47	1.78*	4.8	7	慢性下呼吸道疾病	9	47.87	21.98	0.64	4.2	7	事故傷害	6	35.83	25.20	1.37	3.8
8	慢性下呼吸道疾病	12	33.76	11.60*-	0.61	3.2	8	糖尿病	6	31.91	15.59	0.63	2.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35.83	12.32	1.10	3.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	30.95	12.55	1.03	3.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	26.60	13.16	0.96	2.3	9	敗血症	4	23.89	5.93	0.95	2.5
10	敗血症	8	22.51	7.50	0.99	2.2	10	高血壓性疾病	4	21.28	9.90	0.92	1.9	10	慢性下呼吸道疾病	3	17.92	3.74	0.62	1.9
	其他非十大死因	63	177.25	83.49	0.73*	16.9		其他非十大死因	31	164.89	97.59	0.76	14.4		其他非十大死因	32	191.10	63.48	0.71	20.4
11	高血壓性疾病	7	19.69	5.93*-	0.63	1.9	11	敗血症	4	21.28	9.24	1.02	1.9	11	高血壓性疾病	3	17.92	3.42*-	0.43	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	14.07	8.05	0.75	1.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.96	10.33	0.64	1.4	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	11.94	6.54	2.45	1.3
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.44	5.61	0.95	0.8	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.64	7.79	1.47	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.94	6.45	1.87	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.63	3.13	0.81	0.5	14	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.64	4.65	3.32	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.94	5.05	0.92	1.3
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	5.63	2.99	1.18	0.5	15	流行性感胃	1	5.32	3.57	2.77	0.5	15	結核病	2	11.94	2.28	2.13	1.3

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計35,544人 男性18,800人 女性16,745人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	217	1,173.73	536.66	1.08	100.0		所有死亡原因	114	1,135.23	675.24	1.01	100.0		所有死亡原因	103	1,219.51	353.98	1.16	100.0
	十大主要死因	174	941.15	443.96*+	1.18*	80.2		十大主要死因	99	985.86	600.82*+	1.21	86.8		十大主要死因	77	911.67	261.76	1.20	74.8
1	惡性腫瘤	63	340.76	150.87	1.17	29.0	1	惡性腫瘤	37	368.45	195.38	1.04	32.5	1	惡性腫瘤	26	307.84	92.18	1.38	25.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	140.63	55.31	0.97	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	149.37	75.91	1.16	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	130.24	26.64*-	0.76	10.7
3	事故傷害	16	86.54	87.47*+	1.85*	7.4	3	事故傷害	12	119.50	134.46*+	1.83	10.5	3	腦血管疾病	10	118.40	26.83	1.53	9.7
4	腦血管疾病	16	86.54	30.12	1.16	7.4	4	糖尿病	9	89.62	47.88	1.71	7.9	4	肺炎	8	94.72	21.71	1.47	7.8
5	糖尿病	15	81.13	31.19	1.17	6.9	5	腦血管疾病	6	59.75	30.03	0.83	5.3	5	糖尿病	6	71.04	20.18	0.77	5.8
6	肺炎	10	54.09	16.46	0.81	4.6	6	敗血症	5	49.79	26.37	2.36	4.4	6	事故傷害	4	47.36	35.82	1.69	3.9
7	敗血症	8	43.27	17.74	1.85	3.7	7	蓄意自我傷害(自殺)	4	39.83	30.12	1.53	3.5	7	高血壓性疾病	4	47.36	13.78	1.08	3.9
8	慢性肝病及肝硬化	7	37.86	20.35	1.25	3.2	8	慢性肝病及肝硬化	4	39.83	24.62	0.95	3.5	8	敗血症	3	35.52	8.21	1.34	2.9
9	高血壓性疾病	7	37.86	14.06	1.18	3.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	39.83	21.05	1.42	3.5	9	慢性肝病及肝硬化	3	35.52	7.15	1.72	2.9
10	蓄意自我傷害(自殺)	6	32.45	20.39	1.65	2.8	10	高血壓性疾病	3	29.87	15.00	1.28	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	23.68	9.24	1.74	1.9
	其他非十大死因	43	232.58	92.71	0.82	19.8		其他非十大死因	15	149.37	74.41*-	0.48*	13.2		其他非十大死因	26	307.84	92.22	1.05	25.2
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	27.04	11.94	0.86	2.3	11	肺炎	2	19.92	10.76*-	0.30	1.8	11	結核病	2	23.68	4.87	4.05	1.9
12	慢性下呼吸道疾病	4	21.64	6.35*-	0.38*	1.8	12	慢性下呼吸道疾病	2	19.92	10.76*-	0.27*	1.8	12	慢性下呼吸道疾病	2	23.68	4.87	0.78	1.9
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	16.23	4.97	1.76	1.4	13	帕金森病	2	19.92	7.64	3.06	1.8	13	主動脈瘤及剝離	2	23.68	4.55	3.54	1.9
14	帕金森病	2	10.82	3.33	1.70	0.9	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	9.96	5.75	2.98	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	23.68	4.55	2.04	1.9
15	主動脈瘤及剝離	2	10.82	3.20	2.13	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	9.96	3.77	1.36	0.9	15	源於周產期的特定病況	1	11.84	23.68	7.56	1.0

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計18,488人 男性10,042人 女性8,446人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	183	1,123.87	510.20	1.10	100.0		所有死亡原因	105	1,224.63	716.03	1.14	100.0		所有死亡原因	78	1,011.67	296.94	1.05	100.0
	十大主要死因	146	896.64	389.25	1.14	79.8		十大主要死因	84	979.71	553.86	1.14	80.0		十大主要死因	66	856.03	259.69	1.24	84.6
1	惡性腫瘤	50	307.07	146.16	1.11	27.3	1	惡性腫瘤	34	396.55	220.48	1.18	32.4	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	220.49	53.37	1.43	21.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	184.24	71.15	1.35	16.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	151.62	80.38	1.23	12.4	2	惡性腫瘤	16	207.52	74.01	1.00	20.5
3	糖尿病	15	92.12	35.20	1.42	8.2	3	事故傷害	7	81.64	65.27	1.31	6.7	3	糖尿病	9	116.73	30.57	1.37	11.5
4	腦血管疾病	13	79.84	26.93	1.15	7.1	4	腦血管疾病	7	81.64	35.54	1.19	6.7	4	高血壓性疾病	7	90.79	22.98	2.29	9.0
5	事故傷害	10	61.41	43.38	1.37	5.5	5	糖尿病	6	69.98	36.53	1.42	5.7	5	腦血管疾病	6	77.82	20.20	1.10	7.7
6	高血壓性疾病	8	49.13	16.02	1.62	4.4	6	敗血症	4	46.65	28.78	2.37	3.8	6	事故傷害	3	38.91	23.06	1.48	3.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	42.99	15.78	1.46	3.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	46.65	25.31	1.74	3.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	38.91	8.53	1.21	3.8
8	肺炎	5	30.71	14.07	0.50	2.7	8	慢性肝病及肝硬化	3	34.99	26.04	0.88	2.9	8	血管性及未明示之癱瘓症	2	25.94	6.77	4.11	2.6
9	敗血症	4	24.57	12.47	1.14	2.2	9	肺炎	3	34.99	19.71	0.56	2.9	9	肺炎	2	25.94	5.75*-	0.45	2.6
10	慢性下呼吸道疾病	4	24.57	8.10*-	0.46	2.2	10	慢性下呼吸道疾病	3	34.99	15.82	0.50	2.9	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.97	14.44	1.22	1.3
	其他非十大死因	37	227.23	120.95	0.98	20.2		其他非十大死因	21	244.93	162.17	1.15	20.0		其他非十大死因	12	155.64	37.25*-	0.57*	15.4
11	慢性肝病及肝硬化	3	18.42	14.57	0.64	1.6	11	源於周產期的特定病況	2	23.33	37.31	12.84*	1.9	11	慢性下呼吸道疾病	1	12.97	4.72	0.48	1.3
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	18.42	11.97	2.14	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	23.33	16.34	0.96	1.9	12	疝氣及腸阻塞	1	12.97	2.78	6.55	1.3
13	源於周產期的特定病況	2	12.28	21.69	7.18	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	23.33	13.79	3.38	1.9							
14	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.28	8.70	0.67	1.1	14	結核病	2	23.33	13.04	4.01	1.9							
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.28	4.13	3.23	1.1	15	主動脈瘤及剝離	1	11.66	7.60	2.89	1.0							

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計16,283人 男性8,574人 女性7,710人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因

民國101年(2012年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	300	959.88	505.62	1.06	100.0		所有死亡原因	161	979.08	617.60	0.99	100.0		所有死亡原因	139	938.49	377.56	1.14	100.0
	十大主要死因	239	764.70	398.88	1.09	79.7		十大主要死因	129	784.48	493.78	0.99	80.1		十大主要死因	113	762.95	304.61	1.24*	81.3
1	惡性腫瘤	69	220.77	131.25	0.89	23.0	1	惡性腫瘤	41	249.33	160.19	0.81	25.5	1	惡性腫瘤	28	189.05	98.56	1.03	20.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	131.18	61.56	1.09	13.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	91.22	53.85	0.81	9.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	175.55	61.61	1.35	18.7
3	糖尿病	23	73.59	35.97	1.29	7.7	3	糖尿病	14	85.14	51.94	1.88*	8.7	3	腦血管疾病	12	81.02	29.97	1.36	8.6
4	肺炎	22	70.39	28.04	1.31	7.3	4	肺炎	14	85.14	47.92	1.49	8.7	4	高血壓性疾病	9	60.77	18.88	1.83	6.5
5	事故傷害	19	60.79	45.94	1.43	6.3	5	事故傷害	12	72.97	62.13	1.21	7.5	5	糖尿病	9	60.77	17.10	0.85	6.5
6	慢性下呼吸道疾病	18	57.59	22.26	1.27	6.0	6	慢性下呼吸道疾病	12	72.97	36.80	1.16	7.5	6	肺炎	8	54.01	15.59	1.12	5.8
7	腦血管疾病	17	54.39	24.67	0.89	5.7	7	慢性肝病及肝硬化	8	48.65	33.64	1.28	5.0	7	事故傷害	7	47.26	26.94	2.00	5.0
8	高血壓性疾病	12	38.40	16.98	1.47	4.0	8	腦血管疾病	5	30.41	16.24*-	0.49	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	6	40.51	11.25	1.76	4.3
9	慢性肝病及肝硬化	11	35.20	23.28	1.32	3.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	24.32	18.34	1.04	2.5	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	33.76	12.51	1.24	3.6
10	敗血症	7	22.40	8.93	1.18	2.3	10	敗血症	4	24.32	12.73	1.34	2.5	10	慢性肝病及肝硬化	3	20.26	12.22	1.26	2.2
	其他非十大死因	61	195.18	106.74	0.95	20.3		其他非十大死因	32	194.60	123.81	0.99	19.9		其他非十大死因	26	175.55	72.95	0.85	18.7
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	19.20	14.31	1.08	2.0	11	高血壓性疾病	3	18.24	10.77	0.91	1.9	11	敗血症	3	20.26	5.70	1.01	2.2
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	16.00	7.01	0.62	1.7	12	皮膚及皮下組織疾病	3	18.24	9.84	3.38	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.50	9.01	1.10	1.4
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.60	7.15	1.61	1.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.16	9.05	1.91	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	13.50	3.75	2.62	1.4
14	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	3	9.60	3.64	18.71*	1.0	14	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	2	12.16	6.39	32.34*	1.2	14	病毒性肝炎	1	6.75	4.60	4.21	0.7
15	皮膚及皮下組織疾病	3	9.60	3.53	2.04	1.0	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	12.16	5.61	4.32	1.2	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.75	4.57	1.25	0.7

附 註：1.彰化縣溪州鄉年中人口數 計31,254人 男性16,444人 女性14,811人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計