

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,484	631.45	400.88*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	868	745.37	521.83*-	0.89*	100.0		所有死亡原因	616	519.56	297.01	0.97	100.0
	十大主要死因	1,193	507.63	318.79*-	0.95	80.4		十大主要死因	699	600.24	416.10*-	0.91*	80.5		十大主要死因	494	416.66	235.28	1.02	80.2
1	惡性腫瘤	441	187.65	122.51*-	0.93	29.7	1	惡性腫瘤	265	227.56	160.72*-	0.87*	30.5	1	惡性腫瘤	176	148.44	90.11	1.05	28.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	181	77.02	46.69	1.01	12.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	104	89.31	61.71	1.08	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	77	64.94	33.08	0.97	12.5
3	腦血管疾病	106	45.10	26.61	1.01	7.1	3	肺炎	65	55.82	34.38	0.99	7.5	3	糖尿病	55	46.39	24.10	1.04	8.9
4	糖尿病	99	42.12	25.06	0.96	6.7	4	腦血管疾病	52	44.65	29.85	0.87	6.0	4	腦血管疾病	54	45.55	23.80	1.22	8.8
5	肺炎	96	40.85	22.48	0.92	6.5	5	慢性下呼吸道疾病	51	43.79	27.66	0.92	5.9	5	肺炎	31	26.15	13.03	0.77	5.0
6	事故傷害	69	29.36	21.74	0.86	4.6	6	事故傷害	45	38.64	30.32	0.82	5.2	6	事故傷害	24	20.24	14.05	1.00	3.9
7	慢性下呼吸道疾病	68	28.93	16.38	0.98	4.6	7	糖尿病	44	37.78	25.67	0.90	5.1	7	高血壓性疾病	23	19.40	9.79	0.97	3.7
8	高血壓性疾病	49	20.85	11.97	0.97	3.3	8	高血壓性疾病	26	22.33	14.62	0.98	3.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	19	16.03	12.99	1.47	3.1
9	蓄意自我傷害(自殺)	42	17.87	14.78	1.04	2.8	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	20.61	14.42	0.88	2.8	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	15.18	7.11	0.79	2.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	42	17.87	10.58	0.83	2.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	23	19.75	16.76	0.85	2.6	10	慢性下呼吸道疾病	17	14.34	7.24	1.06	2.8
	其他非十大死因	291	123.82	82.08*-	0.82*	19.6		其他非十大死因	169	145.12	105.73*-	0.83*	19.5		其他非十大死因	122	102.90	61.72*-	0.82*	19.8
11	敗血症	30	12.77	8.10	0.99	2.0	11	敗血症	17	14.60	10.45	0.95	2.0	11	敗血症	13	10.96	6.06	1.05	2.1
12	慢性肝病及肝硬化	28	11.91	8.64*-	0.69	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	16	13.74	10.94*-	0.59*	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	12	10.12	6.45	1.02	1.9
13	血管性及未明示之癱瘓症	15	6.38	3.34	1.46	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	6.01	4.58	1.24	0.8	13	血管性及未明示之癱瘓症	8	6.75	3.22	1.44	1.3
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	5.11	3.23	0.95	0.8	14	帕金森病	7	6.01	3.78	1.26	0.8	14	皮膚及皮下組織疾病	5	4.22	2.41	1.48	0.8
15	帕金森病	10	4.26	2.54	1.21	0.7	15	血管性及未明示之癱瘓症	7	6.01	3.49	1.52	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	4.22	2.00	0.74	0.8

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計235,016人 男性116,453人 女性118,563人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	583	675.91	432.76	0.97	100.0		所有死亡原因	354	805.41	591.52	0.99	100.0		所有死亡原因	229	541.37	285.66	0.93	100.0
	十大主要死因	478	554.18	354.81	1.02	82.0		十大主要死因	298	678.00	496.63	1.06	84.2		十大主要死因	182	430.26	225.08	0.97	79.5
1	惡性腫瘤	181	209.85	142.11	1.03	31.0	1	惡性腫瘤	123	279.84	207.87	1.09	34.7	1	惡性腫瘤	58	137.12	82.54	0.94	25.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	67.24	40.39	0.86	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	63.70	46.32	0.80	7.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	70.92	32.87	0.94	13.1
3	糖尿病	51	59.13	36.89	1.32	8.7	3	糖尿病	28	63.70	45.54	1.56*	7.9	3	糖尿病	23	54.37	30.50	1.12	10.0
4	肺炎	43	49.85	27.22	1.08	7.4	4	肺炎	25	56.88	38.80	1.08	7.1	4	肺炎	18	42.55	18.82	1.09	7.9
5	腦血管疾病	37	42.90	26.50	0.93	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	24	54.60	38.66	1.21	6.8	5	腦血管疾病	16	37.83	19.33	0.91	7.0
6	慢性下呼吸道疾病	31	35.94	21.18	1.17	5.3	6	事故傷害	23	52.33	40.43	1.12	6.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	26.00	13.18	1.21	4.8
7	事故傷害	28	32.46	23.98	0.95	4.8	7	腦血管疾病	21	47.78	33.79	0.95	5.9	7	慢性下呼吸道疾病	7	16.55	6.63	1.08	3.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	22	25.51	15.22	1.15	3.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.03	17.36	1.09	3.1	8	衰老/老邁	7	16.55	6.37	1.34	3.1
9	高血壓性疾病	14	16.23	8.97	0.73	2.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	8	18.20	16.55	0.79	2.3	9	高血壓性疾病	7	16.55	6.37	0.73	3.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	13	15.07	12.36	0.88	2.2	10	高血壓性疾病	7	15.93	11.30	0.73	2.0	10	事故傷害	5	11.82	8.46	0.57	2.2
	其他非十大死因	105	121.73	77.95*-	0.78*	18.0		其他非十大死因	56	127.41	94.90*-	0.75*	15.8		其他非十大死因	47	111.11	60.57	0.81	20.5
11	衰老/老邁	11	12.75	6.60	1.35	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	6	13.65	9.99*-	0.59	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.82	7.23	1.09	2.2
12	敗血症	9	10.43	6.23	0.79	1.5	12	敗血症	5	11.38	8.22	0.78	1.4	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	9.46	4.54	1.57	1.7
13	慢性肝病及肝硬化	8	9.27	6.31*-	0.54	1.4	13	衰老/老邁	4	9.10	6.17	1.36	1.1	13	敗血症	4	9.46	4.50	0.81	1.7
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	4.64	2.64	0.86	0.7	14	主動脈瘤及剝離	3	6.83	4.55	1.50	0.8	14	血管性及未明示之癱瘓症	3	7.09	2.59	1.30	1.3
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	4.64	2.19	1.02	0.7	15	人類免疫缺乏之病毒(HIV)疾病	2	4.55	3.59	3.39	0.6	15	帕金森病	2	4.73	2.62	1.85	0.9

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,254人 男性43,953人 女性42,300人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	551	605.98	421.06	0.95	100.0		所有死亡原因	342	736.02	586.06	0.99	100.0		所有死亡原因	209	470.09	272.32	0.90	100.0
	十大主要死因	437	480.61	331.34	0.99	79.3		十大主要死因	284	611.20	484.18	1.04	83.0		十大主要死因	162	364.37	204.44	0.94	77.5
1	惡性腫瘤	176	193.56	137.95	1.03	31.9	1	惡性腫瘤	119	256.10	200.07	1.08	34.8	1	惡性腫瘤	57	128.21	81.90	0.95	27.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	49.49	31.99*-	0.71*	8.2	2	糖尿病	29	62.41	48.47*+	1.68*	8.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	51.73	26.64	0.78	11.0
3	糖尿病	40	43.99	29.28	1.10	7.3	3	事故傷害	26	55.95	47.98	1.23	7.6	3	肺炎	14	31.49	14.06	0.92	6.7
4	肺炎	36	39.59	23.22	0.98	6.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	47.35	36.91*-	0.65*	6.4	4	腦血管疾病	13	29.24	18.32	0.80	6.2
5	腦血管疾病	33	36.29	25.13	0.88	6.0	5	肺炎	22	47.35	35.70	1.03	6.4	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	26.99	15.58	1.43	5.7
6	事故傷害	30	32.99	26.87	1.00	5.4	6	腦血管疾病	20	43.04	34.17	0.95	5.8	6	衰老/老邁	12	26.99	11.48*+	2.52*	5.7
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	27.49	19.15	1.40	4.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	27.98	22.93	1.38	3.8	7	糖尿病	11	24.74	13.96*-	0.58	5.3
8	慢性下呼吸道疾病	21	23.10	14.42	0.86	3.8	8	蓄意自我傷害(自殺)	12	25.83	21.91	1.13	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	9	20.24	9.87	1.51	4.3
9	衰老/老邁	16	17.60	9.61*+	2.16*	2.9	9	慢性下呼吸道疾病	12	25.83	20.47	0.66	3.5	9	高血壓性疾病	6	13.50	7.26	0.68	2.9
10	蓄意自我傷害(自殺)	15	16.50	13.72	0.97	2.7	10	高血壓性疾病	9	19.37	15.56	1.01	2.6	10	敗血症	5	11.25	5.36	1.09	2.4
	其他非十大死因	114	125.38	89.72*-	0.82*	20.7		其他非十大死因	58	124.82	101.89	0.80	17.0		其他非十大死因	47	105.71	67.88	0.79	22.5
11	高血壓性疾病	15	16.50	10.78	0.84	2.7	11	慢性肝病及肝硬化	7	15.06	11.63	0.66	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	4	9.00	5.93	0.94	1.9
12	慢性肝病及肝硬化	11	12.10	9.25	0.73	2.0	12	敗血症	4	8.61	7.39	0.66	1.2	12	帕金森病	4	9.00	5.72	4.03*	1.9
13	敗血症	9	9.90	6.54	0.84	1.6	13	衰老/老邁	4	8.61	6.51	1.52	1.2	13	事故傷害	4	9.00	5.37*-	0.46	1.9
14	帕金森病	5	5.50	3.73	1.73	0.9	14	血管性及未明示之癱瘓症	3	6.46	4.47	2.00	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	3	6.75	5.33	0.63	1.4
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	4.40	2.88	1.11	0.7	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	4.30	3.26	2.20	0.6	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.75	3.25	1.22	1.4

附 註：1.彰化縣和美鎮年中人口數 計90,927人 男性46,466人 女性44,460人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	274	825.00	475.97	1.09	100.0		所有死亡原因	160	954.08	634.48	1.08	100.0		所有死亡原因	114	693.39	336.38	1.10	100.0
	十大主要死因	220	662.41	377.76	1.13	80.3		十大主要死因	136	810.97	531.18	1.16	85.0		十大主要死因	88	535.25	254.13	1.17	77.2
1	惡性腫瘤	83	249.91	150.41	1.13	30.3	1	惡性腫瘤	54	322.00	215.62	1.14	33.8	1	惡性腫瘤	29	176.39	92.07	1.11	25.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	84.31	46.03	1.00	10.2	2	糖尿病	18	107.33	69.00*+	2.38*	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	79.07	35.61	0.97	11.4
3	糖尿病	27	81.30	44.70*+	1.65*	9.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	89.45	58.13	1.03	9.4	3	高血壓性疾病	12	72.99	27.68*+	2.96*	10.5
4	肺炎	18	54.20	25.84	1.07	6.6	4	慢性下呼吸道疾病	9	53.67	30.63	1.07	5.6	4	肺炎	9	54.74	24.63	1.29	7.9
5	高血壓性疾病	17	51.19	23.94	2.11*	6.2	5	肺炎	9	53.67	30.19	0.92	5.6	5	糖尿病	9	54.74	23.91	1.03	7.9
6	腦血管疾病	13	39.14	19.81	0.78	4.7	6	慢性肝病及肝硬化	8	47.70	37.66	1.96	5.0	6	腦血管疾病	5	30.41	14.69	0.68	4.4
7	慢性下呼吸道疾病	11	33.12	15.73	0.98	4.0	7	腦血管疾病	8	47.70	28.84	0.86	5.0	7	蓄意自我傷害(自殺)	3	18.25	10.67	1.62	2.6
8	事故傷害	9	27.10	20.12	0.75	3.3	8	事故傷害	6	35.78	29.30	0.72	3.8	8	事故傷害	3	18.25	10.13	0.83	2.6
9	慢性肝病及肝硬化	8	24.09	19.14	1.33	2.9	9	高血壓性疾病	5	29.82	17.78	1.25	3.1	9	敗血症	3	18.25	6.95	1.45	2.6
10	蓄意自我傷害(自殺)	6	18.07	12.04	1.02	2.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.85	14.04	0.94	2.5	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.16	7.80	3.02	1.8
	其他非十大死因	54	162.59	98.21	0.94	19.7		其他非十大死因	24	143.11	103.29	0.78	15.0		其他非十大死因	26	158.14	82.25	0.91	22.8
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	18.07	10.23	0.74	2.2	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.89	13.03	0.75	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	12.16	7.44	0.52	1.8
12	敗血症	4	12.04	5.53	0.84	1.5	12	源於周產期的特定病況	1	5.96	11.39	3.89	0.6	12	慢性下呼吸道疾病	2	12.16	4.12	0.73	1.8
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.03	5.49	1.88	1.1	13	病毒性肝炎	1	5.96	4.65	3.54	0.6	13	流行性感冒	1	6.08	5.68	3.89	0.9
14	病毒性肝炎	2	6.02	4.90	4.85	0.7	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	5.96	4.01	1.17	0.6	14	病毒性肝炎	1	6.08	5.46	7.64	0.9
15	結核病	2	6.02	3.36	1.67	0.7	15		1	5.96	3.72	2.20	0.6	15	胃及十二指腸潰瘍	1	6.08	4.50	5.00	0.9

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,212人 男性16,770人 女性16,441人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	783	627.50	409.68*-	0.93*	100.0		所有死亡原因	483	775.28	560.00	0.97	100.0		所有死亡原因	300	480.15	281.05	0.89*	100.0
	十大主要死因	630	504.88	326.64	0.96	80.5		十大主要死因	392	629.21	453.52	0.99	81.2		十大主要死因	243	388.92	220.45	0.97	81.0
1	惡性腫瘤	217	173.90	117.51*-	0.86*	27.7	1	惡性腫瘤	142	227.93	164.80	0.88	29.4	1	惡性腫瘤	75	120.04	76.35	0.84	25.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	87	69.72	42.95	0.94	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	53	85.07	60.44	1.08	11.0	2	糖尿病	40	64.02	35.59	1.43*	13.3
3	腦血管疾病	62	49.69	31.25	1.13	7.9	3	肺炎	32	51.36	36.71	1.00	6.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	54.42	27.21	0.80	11.3
4	糖尿病	61	48.89	30.23	1.14	7.8	4	腦血管疾病	32	51.36	36.53	1.03	6.6	4	腦血管疾病	30	48.01	26.45	1.27	10.0
5	肺炎	44	35.26	21.34	0.82	5.6	5	慢性下呼吸道疾病	27	43.34	29.79	0.99	5.6	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	24.01	11.71	1.23	5.0
6	事故傷害	39	31.25	23.28	0.92	5.0	6	事故傷害	26	41.73	32.12	0.89	5.4	6	事故傷害	13	20.81	14.80	1.03	4.3
7	高血壓性疾病	38	30.45	17.99	1.46*	4.9	7	高血壓性疾病	25	40.13	27.95*+	1.89*	5.2	7	高血壓性疾病	13	20.81	9.87	1.02	4.3
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	25.64	15.30	1.21	4.1	8	糖尿病	21	33.71	24.05	0.83	4.3	8	肺炎	12	19.21	9.29*-	0.55*	4.0
9	慢性下呼吸道疾病	31	24.84	14.57	0.87	4.0	9	蓄意自我傷害(自殺)	17	27.29	22.10	1.18	3.5	9	血管性及未明示之癱呆症	7	11.20	5.14	2.31	2.3
10	蓄意自我傷害(自殺)	19	15.23	12.22	0.89	2.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	27.29	19.03	1.21	3.5	10	慢性肝病及肝硬化	4	6.40	4.03	0.64	1.3
	其他非十大死因	153	122.61	83.04*-	0.83*	19.5		其他非十大死因	91	146.07	106.48	0.87	18.8		其他非十大死因	57	91.23	60.60*-	0.67*	19.0
11	慢性肝病及肝硬化	18	14.43	10.00	0.85	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	14	22.47	16.36	0.97	2.9	11	慢性下呼吸道疾病	4	6.40	3.81	0.47	1.3
12	敗血症	15	12.02	7.06	0.96	1.9	12	敗血症	12	19.26	13.21	1.35	2.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	4.80	4.37	0.84	1.0
13	血管性及未明示之癱呆症	9	7.21	3.95	1.73	1.1	13	帕金森病	7	11.24	8.01	2.47	1.4	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	4.80	3.37	1.40	1.0
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.41	5.17	1.21	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.03	6.14	1.68	1.0	14	敗血症	3	4.80	2.39*-	0.45	1.0
15	帕金森病	8	6.41	3.97	1.85	1.0	15	主動脈瘤及剝離	4	6.42	4.56	1.40	0.8	15	蓄意自我傷害(自殺)	2	3.20	2.61*-	0.29	0.7

附 註：1.彰化縣員林市中人口數 計124,781人 男性62,300人 女性62,481人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	424	760.33	468.21	1.04	100.0		所有死亡原因	235	828.25	605.96	1.01	100.0		所有死亡原因	189	689.98	342.93	1.09	100.0
	十大主要死因	323	579.22	353.70	1.02	76.2		十大主要死因	181	637.93	456.08	0.99	77.0		十大主要死因	144	525.70	263.98	1.10	76.2
1	惡性腫瘤	122	218.78	144.64	1.05	28.8	1	惡性腫瘤	78	274.91	199.07	1.06	33.2	1	惡性腫瘤	44	160.63	96.55	1.05	23.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	56	100.42	59.34	1.21	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	95.16	69.91	1.18	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	105.87	48.11	1.25	15.3
3	腦血管疾病	24	43.04	24.07	0.89	5.7	3	腦血管疾病	15	52.87	35.30	1.04	6.4	3	糖尿病	12	43.81	20.01	0.83	6.3
4	事故傷害	19	34.07	24.00	0.99	4.5	4	慢性下呼吸道疾病	12	42.29	27.83	0.92	5.1	4	高血壓性疾病	11	40.16	13.54	1.56	5.8
5	糖尿病	19	34.07	20.61	0.73	4.5	5	肺炎	10	35.24	22.11	0.65	4.3	5	事故傷害	10	36.51	25.41	1.72	5.3
6	慢性下呼吸道疾病	19	34.07	17.86	1.03	4.5	6	事故傷害	9	31.72	22.89	0.68	3.8	6	腦血管疾病	9	32.86	14.10	0.72	4.8
7	高血壓性疾病	19	34.07	17.64	1.42	4.5	7	蓄意自我傷害(自殺)	8	28.20	22.15	1.23	3.4	7	肺炎	8	29.21	11.83	0.65	4.2
8	肺炎	18	32.28	15.30*-	0.64	4.2	8	高血壓性疾病	8	28.20	20.35	1.27	3.4	8	慢性肝病及肝硬化	7	25.55	14.09	2.31	3.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	25.11	13.73	1.07	3.3	9	糖尿病	7	24.67	19.07	0.60	3.0	9	慢性下呼吸道疾病	7	25.55	10.85	1.47	3.7
10	慢性肝病及肝硬化	13	23.31	16.52	1.35	3.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	24.67	17.40	1.07	3.0	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.55	9.50	1.08	3.7
	其他非十大死因	101	181.12	114.51	1.11	23.8		其他非十大死因	54	190.32	149.88	1.11	23.0		其他非十大死因	45	164.28	78.95	1.08	23.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	11	19.73	14.71	1.15	2.6	11	慢性肝病及肝硬化	6	21.15	17.47	0.92	2.6	11	敗血症	4	14.60	5.18	1.12	2.1
12	敗血症	7	12.55	7.05	0.89	1.7	12	敗血症	3	10.57	7.69	0.71	1.3	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	10.95	8.22	1.00	1.6
13	結核病	5	8.97	4.06	2.55	1.2	13	源於周產期的特定病況	2	7.05	13.33	4.55	0.9	13	結核病	3	10.95	4.10	4.41	1.6
14	衰老/老邁	5	8.97	3.63	0.85	1.2	14	先天性畸形變形及染色體異常	2	7.05	13.33	3.54	0.9	14	衰老/老邁	3	10.95	3.25	0.75	1.6
15	源於周產期的特定病況	3	5.38	10.05	4.12	0.7	15	衰老/老邁	2	7.05	4.38	1.03	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.30	3.34	1.14	1.1

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,765人 男性28,373人 女性27,392人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	447	1,048.85	501.76*+	1.13*	100.0		所有死亡原因	295	1,338.05	675.56*+	1.14*	100.0		所有死亡原因	152	738.94	325.83	1.05	100.0
	十大主要死因	343	804.82	388.91*+	1.12*	76.7		十大主要死因	226	1,025.08	527.68	1.11	76.6		十大主要死因	119	578.51	255.99	1.10	78.3
1	惡性腫瘤	88	206.49	113.07	0.81*	19.7	1	惡性腫瘤	58	263.07	148.33	0.76*	19.7	1	惡性腫瘤	30	145.84	76.75	0.84	19.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	56	131.40	62.94	1.22	12.5	2	肺炎	34	154.22	60.05*+	1.67*	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	136.12	56.51	1.45	18.4
3	肺炎	43	100.90	36.03	1.48*	9.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	127.00	69.02	1.06	9.5	3	糖尿病	17	82.64	32.16	1.37	11.2
4	糖尿病	34	79.78	34.55	1.32	7.6	4	慢性下呼吸道疾病	24	108.86	40.60	1.40	8.1	4	腦血管疾病	9	43.75	17.00	0.85	5.9
5	慢性下呼吸道疾病	29	68.05	23.80	1.53*	6.5	5	腦血管疾病	18	81.64	41.27	1.09	6.1	5	肺炎	9	43.75	12.71	0.89	5.9
6	腦血管疾病	27	63.35	29.45	1.01	6.0	6	糖尿病	17	77.11	37.53	1.29	5.8	6	事故傷害	7	34.03	19.96	1.43	4.6
7	事故傷害	22	51.62	39.57	1.32	4.9	7	事故傷害	15	68.04	58.28	1.24	5.1	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	34.03	14.49	1.27	4.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	39.89	17.87	1.30	3.8	8	慢性肝病及肝硬化	11	49.89	30.74	1.87	3.7	8	慢性下呼吸道疾病	5	24.31	7.15	1.26	3.3
9	高血壓性疾病	14	32.85	12.56	1.03	3.1	9	高血壓性疾病	11	49.89	20.67	1.40	3.7	9	敗血症	4	19.45	8.33	1.35	2.6
10	慢性肝病及肝硬化	13	30.50	19.08	1.53	2.9	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	45.36	21.18	1.31	3.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	14.58	10.93	1.24	2.0
	其他非十大死因	104	244.03	112.84	1.19	23.3		其他非十大死因	69	312.97	147.88	1.27	23.4		其他非十大死因	33	160.43	69.83	0.88	21.7
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	21.12	16.33	1.12	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	6	27.21	21.29	1.04	2.0	11	衰老/老邁	3	14.58	4.86	0.93	2.0
12	衰老/老邁	9	21.12	7.93	1.44	2.0	12	衰老/老邁	6	27.21	11.41	2.19	2.0	12	高血壓性疾病	3	14.58	4.37*-	0.51	2.0
13	敗血症	8	18.77	7.87	1.02	1.8	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	18.14	8.81	2.39	1.4	13	慢性肝病及肝硬化	2	9.72	7.28	0.77	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	14.08	6.54	2.42	1.3	14	敗血症	4	18.14	7.14	0.77	1.4	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.72	4.24	2.16	1.3
15	血管性及未明示之癱瘓症	6	14.08	4.76	2.04	1.3	15	血管性及未明示之癱瘓症	4	18.14	6.53	2.68	1.4	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.72	2.98	1.41	1.3

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計42,618人 男性22,047人 女性20,570人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	493	946.15	441.38	0.99	100.0		所有死亡原因	288	1,071.03	601.32	1.04	100.0		所有死亡原因	205	812.98	295.85	0.94	100.0
	十大主要死因	379	727.36	347.82	1.02	76.9		十大主要死因	223	829.30	474.77	1.05	77.4		十大主要死因	160	634.52	235.17	1.00	78.0
1	惡性腫瘤	141	270.60	142.61	1.02	28.6	1	惡性腫瘤	89	330.98	190.68	1.03	30.9	1	惡性腫瘤	52	206.22	100.64	1.04	25.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	57	109.39	48.34	1.00	11.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	115.28	67.82	1.13	10.8	2	腦血管疾病	29	115.01	35.30*+	1.80*	14.1
3	腦血管疾病	47	90.20	37.88	1.40*	9.5	3	肺炎	21	78.10	40.40	1.09	7.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	103.11	27.57	0.87	12.7
4	肺炎	38	72.93	28.65	1.05	7.7	4	慢性下呼吸道疾病	19	70.66	35.45	1.14	6.6	4	肺炎	17	67.42	18.52	1.05	8.3
5	事故傷害	24	46.06	26.94	1.15	4.9	5	腦血管疾病	18	66.94	36.81	1.03	6.3	5	糖尿病	8	31.73	10.84* ⁻	0.43*	3.9
6	慢性下呼吸道疾病	24	46.06	17.80	1.01	4.9	6	事故傷害	17	63.22	41.50	1.19	5.9	6	慢性肝病及肝硬化	7	27.76	13.05	1.88	3.4
7	慢性肝病及肝硬化	15	28.79	16.70	1.42	3.0	7	慢性肝病及肝硬化	8	29.75	19.97	1.13	2.8	7	事故傷害	7	27.76	11.79	1.06	3.4
8	糖尿病	14	26.87	11.02* ⁻	0.43*	2.8	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	26.03	15.85* ⁺	3.97*	2.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	19.83	6.34	0.59	2.4
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	23.03	10.38	0.72	2.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	26.03	14.87	0.87	2.4	9	慢性下呼吸道疾病	5	19.83	5.24	0.80	2.4
10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	13.43	7.51	2.23	1.4	10	糖尿病	6	22.31	11.41* ⁻	0.42*	2.1	10	敗血症	4	15.86	5.88	0.88	2.0
	其他非十大死因	114	218.78	93.55	0.93	23.1		其他非十大死因	65	241.73	126.55	1.03	22.6		其他非十大死因	45	178.46	60.69	0.80	22.0
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	11.51	8.25	0.61	1.2	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	11.16	7.71* ⁻	0.44	1.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	11.90	8.49	0.99	1.5
12	敗血症	6	11.51	5.19	0.61	1.2	12	膽結石及其他膽囊疾患	3	11.16	5.08	3.69	1.0	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	11.90	5.82	1.40	1.5
13	高血壓性疾病	6	11.51	4.12* ⁻	0.35*	1.2	13	高血壓性疾病	3	11.16	5.07* ⁻	0.38	1.0	13	高血壓性疾病	3	11.90	3.60* ⁻	0.33*	1.5
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	7.68	3.51	1.11	0.8	14	敗血症	2	7.44	4.18	0.38	0.7	14	病毒性肝炎	2	7.93	3.38	8.62	1.0
15	膽結石及其他膽囊疾患	3	5.76	1.88	2.17	0.6	15	帕金森病	2	7.44	3.45	1.18	0.7	15	主動脈瘤及剝離	1	3.97	2.46	1.27	0.5

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計52,106人 男性26,890人 女性25,216人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	117	685.01	421.73	0.93	100.0		所有死亡原因	64	723.98	507.21	0.84	100.0		所有死亡原因	53	643.20	337.08	1.06	100.0
	十大主要死因	103	603.04	371.46	1.09	88.0		十大主要死因	59	667.42	472.82	1.07	92.2		十大主要死因	45	546.12	285.96	1.28	84.9
1	惡性腫瘤	37	216.63	140.26	1.03	31.6	1	惡性腫瘤	24	271.49	187.57	1.00	37.5	1	惡性腫瘤	13	157.77	92.25	1.05	24.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	122.95	64.86	1.49	17.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	113.12	67.63	1.32	15.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	133.50	63.60	1.67	20.8
3	腦血管疾病	12	70.26	44.92	1.45	10.3	3	腦血管疾病	8	90.50	74.02	1.68	12.5	3	糖尿病	7	84.95	45.99	1.67	13.2
4	糖尿病	10	58.55	34.42	1.25	8.5	4	蓄意自我傷害(自殺)	3	33.94	29.59	1.43	4.7	4	腦血管疾病	4	48.54	16.83	1.12	7.5
5	事故傷害	4	23.42	22.78	0.67	3.4	5	糖尿病	3	33.94	22.52	0.78	4.7	5	肺炎	3	36.41	12.08	0.87	5.7
6	蓄意自我傷害(自殺)	4	23.42	18.15	1.34	3.4	6	慢性下呼吸道疾病	3	33.94	21.13	0.69	4.7	6	事故傷害	2	24.27	22.35	1.15	3.8
7	慢性下呼吸道疾病	4	23.42	12.13	0.71	3.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	33.94	19.36	1.39	4.7	7	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	24.27	14.05	3.89	3.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.42	11.40	1.00	3.4	8	事故傷害	2	22.62	23.50	0.47	3.1	8	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	12.14	8.19	36.99	1.9
9	肺炎	4	23.42	10.00*-	0.47	3.4	9	敗血症	2	22.62	17.22	1.44	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	12.14	5.86	0.53	1.9
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.56	12.54	3.12	2.6	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	11.31	10.29	2.22	1.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.14	4.75	1.10	1.9
	其他非十大死因	14	81.97	50.27*-	0.45*	12.0		其他非十大死因	5	56.56	34.39*-	0.23*	7.8		其他非十大死因	8	97.09	51.12	0.54	15.1
11	敗血症	3	17.56	11.19	1.26	2.6	11	主動脈瘤及剝離	1	11.31	6.59	2.36	1.6	11	敗血症	1	12.14	4.03	0.99	1.9
12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.85	4.03	19.01	0.9	12	肺炎	1	11.31	6.59*-	0.20	1.6	12	衰老/老邁	1	12.14	4.03	0.90	1.9
13	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.85	2.68	1.18	0.9	13	血管性及未明示之癱瘓症	1	11.31	6.14	2.79	1.6	13	慢性下呼吸道疾病	1	12.14	4.03	0.74	1.9
14	主動脈瘤及剝離	1	5.85	2.50	1.67	0.9							14	高血壓性疾病	1	12.14	4.03	0.50	1.9	
15	衰老/老邁	1	5.85	2.50	0.57	0.9														

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,080人 男性8,840人 女性8,240人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	246	677.26	453.25	1.02	100.0		所有死亡原因	141	758.72	591.93	0.99	100.0		所有死亡原因	105	591.95	314.43	1.08	100.0
	十大主要死因	200	550.62	373.37	1.09	81.3		十大主要死因	121	651.10	507.42	1.09	85.8		十大主要死因	83	467.92	255.84	1.15	79.0
1	惡性腫瘤	71	195.47	133.91	1.01	28.9	1	惡性腫瘤	52	279.81	213.44	1.15	36.9	1	惡性腫瘤	19	107.11	61.17	0.77	18.1
2	糖尿病	26	71.58	44.80*+	1.70*	10.6	2	腦血管疾病	13	69.95	56.18	1.48	9.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	90.20	44.76	1.27	15.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	68.83	42.62	0.94	10.2	3	糖尿病	11	59.19	45.77	1.54	7.8	3	糖尿病	15	84.56	40.44	1.85*	14.3
4	腦血管疾病	23	63.32	42.86	1.47	9.3	4	事故傷害	9	48.43	40.65	1.06	6.4	4	腦血管疾病	10	56.38	27.31	1.45	9.5
5	事故傷害	15	41.30	32.29	1.25	6.1	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	48.43	37.11	0.64	6.4	5	事故傷害	6	33.83	23.98	1.71	5.7
6	肺炎	11	30.28	19.00	0.71	4.5	6	肺炎	7	37.67	29.17	0.78	5.0	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	28.19	14.74	1.38	4.8
7	敗血症	9	24.78	20.60	2.02	3.7	7	敗血症	7	37.67	29.06	2.79*	5.0	7	肺炎	4	22.55	11.65	0.61	3.8
8	高血壓性疾病	9	24.78	16.23	1.19	3.7	8	高血壓性疾病	5	26.90	21.50	1.33	3.5	8	高血壓性疾病	4	22.55	9.60	1.05	3.8
9	慢性下呼吸道疾病	6	16.52	10.46	0.58	2.4	9	慢性下呼吸道疾病	5	26.90	20.77	0.65	3.5	9	敗血症	2	11.28	13.86	1.03	1.9
10	慢性肝病及肝硬化	5	13.77	10.60	0.83	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	3	16.14	13.77	0.70	2.1	10	流行性感冒	2	11.28	8.34	8.07	1.9
	其他非十大死因	46	126.64	79.87*-	0.81	18.7		其他非十大死因	20	107.62	84.51*-	0.64*	14.2		其他非十大死因	22	124.03	58.59	0.86	21.0
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	13.77	8.43	0.66	2.0	11	流行性感冒	2	10.76	8.19	7.82	1.4	11	慢性肝病及肝硬化	2	11.28	6.84	1.13	1.9
12	流行性感冒	4	11.01	8.23	7.96*	1.6	12	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.38	9.82	2.52	0.7	12	腸道感染症	1	5.64	4.10	5.87	1.0
13	蓄意自我傷害(自殺)	2	5.51	3.44*-	0.33	0.8	13	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	5.38	4.00	48.67	0.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.64	3.08	0.99	1.0
14	血管性及未明示之癱瘓症	2	5.51	3.12	1.30	0.8	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.38	4.00	2.67	0.7	14	慢性下呼吸道疾病	1	5.64	3.08	0.39	1.0
15	主動脈瘤及剝離	2	5.51	2.91	1.73	0.8	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.38	3.86*-	0.24	0.7	15	主動脈瘤及剝離	1	5.64	2.51	2.86	1.0

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,323人 男性18,584人 女性17,738人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	352	737.73	433.32	0.96	100.0		所有死亡原因	189	759.74	509.05*-	0.87	100.0		所有死亡原因	163	713.75	358.45	1.08	100.0
	十大主要死因	283	593.12	337.55	1.03	80.4		十大主要死因	151	606.99	400.99	0.94	79.9		十大主要死因	138	604.28	291.12*+	1.21*	84.7
1	惡性腫瘤	106	222.16	138.03	1.02	30.1	1	惡性腫瘤	56	225.11	151.39	0.82	29.6	1	惡性腫瘤	50	218.94	123.35	1.37*	30.7
2	衰老/老邁	45	94.31	41.92*+	8.44*	12.8	2	衰老/老邁	19	76.38	45.70*+	10.20*	10.1	2	衰老/老邁	26	113.85	38.11*+	7.43*	16.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	56.59	29.33*-	0.65*	7.7	3	肺炎	14	56.28	37.13	0.96	7.4	3	糖尿病	13	56.93	26.37	1.02	8.0
4	肺炎	20	41.92	22.62	0.79	5.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	56.28	36.85*-	0.65	7.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	56.93	22.06	0.64	8.0
5	腦血管疾病	18	37.72	19.84	0.74	5.1	5	敗血症	12	48.24	29.93*+	3.00*	6.3	5	腦血管疾病	10	43.79	17.97	0.91	6.1
6	糖尿病	17	35.63	20.33	0.72	4.8	6	慢性下呼吸道疾病	11	44.22	30.00	0.88	5.8	6	蓄意自我傷害(自殺)	6	26.27	21.51	2.36	3.7
7	敗血症	14	29.34	15.45	1.98*	4.0	7	腦血管疾病	8	32.16	20.05*-	0.59	4.2	7	事故傷害	6	26.27	14.44	1.19	3.7
8	慢性下呼吸道疾病	13	27.25	15.86	0.77	3.7	8	慢性肝病及肝硬化	6	24.12	17.52	1.00	3.2	8	肺炎	6	26.27	11.76	0.56	3.7
9	事故傷害	12	25.15	14.89*-	0.70	3.4	9	事故傷害	6	24.12	15.08*-	0.49	3.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.52	8.80	0.70	2.5
10	蓄意自我傷害(自殺)	11	23.05	19.28	1.30	3.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	20.10	17.32	0.84	2.6	10	高血壓性疾病	4	17.52	6.74	0.65	2.5
	其他非十大死因	69	144.61	95.76	0.74*	19.6		其他非十大死因	38	152.75	108.06*-	0.67*	20.1		其他非十大死因	25	109.47	67.32	0.67*	15.3
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	14.67	9.48	0.59	2.0	11	糖尿病	4	16.08	11.15*-	0.36*	2.1	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.14	4.11	1.97	1.8
12	慢性肝病及肝硬化	6	12.57	8.93	0.70	1.7	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	12.06	9.01	0.49	1.6	12	敗血症	2	8.76	4.23	0.65	1.2
13	血管性及未明示之癱瘓症	5	10.48	4.81	1.96	1.4	13	帕金森病	3	12.06	7.75	2.33	1.6	13	主動脈瘤及剝離	2	8.76	3.62	3.73	1.2
14	主動脈瘤及剝離	4	8.38	4.27	2.30	1.1	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	8.04	4.68	1.93	1.1	14	慢性下呼吸道疾病	2	8.76	3.62	0.48	1.2
15	高血壓性疾病	4	8.38	3.84*-	0.33*	1.1	15	主動脈瘤及剝離	2	8.04	4.61	1.67	1.1	15	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.38	8.28	13.04	0.6

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,714人 男性24,877人 女性22,837人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 $\text{標準化死亡比} = \frac{\text{實際死亡數}}{\text{期望死亡數}}$ 。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	271	688.88	439.55	0.98	100.0		所有死亡原因	146	717.73	541.71	0.90	100.0		所有死亡原因	125	658.03	345.32	1.10	100.0
	十大主要死因	217	551.62	338.87	1.01	80.1		十大主要死因	118	580.08	438.36	0.95	80.8		十大主要死因	104	547.48	271.33	1.22	83.2
1	惡性腫瘤	81	205.90	135.55	1.02	29.9	1	惡性腫瘤	46	226.13	168.36	0.89	31.5	1	惡性腫瘤	35	184.25	108.30	1.26	28.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	81.34	45.88	1.04	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	73.74	52.08	0.93	10.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	89.49	37.66	1.13	13.6
3	腦血管疾病	21	53.38	29.56	1.16	7.7	3	肺炎	12	58.99	39.91	1.15	8.2	3	腦血管疾病	11	57.91	29.90	1.35	8.8
4	肺炎	20	50.84	26.24	1.08	7.4	4	腦血管疾病	10	49.16	33.15	1.00	6.8	4	肺炎	8	42.11	14.27	1.01	6.4
5	事故傷害	16	40.67	29.48	1.19	5.9	5	事故傷害	9	44.24	38.76	0.95	6.2	5	事故傷害	7	36.85	19.89	1.78	5.6
6	糖尿病	14	35.59	24.80	0.80	5.2	6	糖尿病	8	39.33	32.53	0.98	5.5	6	糖尿病	6	31.59	14.44	0.64	4.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	30.50	15.22	1.37	4.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	29.50	19.16	1.33	4.1	7	高血壓性疾病	6	31.59	14.07	1.31	4.8
8	高血壓性疾病	8	20.34	10.45	0.90	3.0	8	慢性下呼吸道疾病	5	24.58	18.64	0.56	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31.59	11.45	1.42	4.8
9	慢性肝病及肝硬化	7	17.79	11.54	1.04	2.6	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	24.58	17.29	1.06	3.4	9	慢性肝病及肝硬化	5	26.32	13.83	2.49	4.0
10	慢性下呼吸道疾病	6	15.25	10.14	0.49	2.2	10	源於周產期的特定病況	2	9.83	18.46	6.30	1.4	10	敗血症	3	15.79	7.53	1.31	2.4
	其他非十大死因	54	137.27	100.68	0.88	19.9		其他非十大死因	28	137.65	103.35	0.73	19.2		其他非十大死因	21	110.55	73.99	0.75	16.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	15.25	9.58	0.90	2.2	11	慢性肝病及肝硬化	2	9.83	8.27	0.42	1.4	11	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.53	7.50	7.65	1.6
12	敗血症	5	12.71	7.02	0.96	1.8	12	敗血症	2	9.83	6.58	0.69	1.4	12	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.26	10.21	4.24	0.8
13	源於周產期的特定病況	2	5.08	10.16	4.18	0.7	13	高血壓性疾病	2	9.83	6.52	0.46	1.4	13	慢性下呼吸道疾病	1	5.26	4.15	0.33	0.8
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.08	3.89	0.94	0.7	14	主動脈瘤及剝離	1	4.92	4.39	1.09	0.7	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.26	3.71	0.86	0.8
15	膽結石及其他膽囊疾患	2	5.08	3.67	2.75	0.7	15	加害(他殺)	1	4.92	4.26	8.10	0.7	15	結核病	1	5.26	2.07	2.28	0.8

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,339人 男性20,342人 女性18,996人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	324	705.11	445.27	1.01	100.0		所有死亡原因	198	837.35	588.80	1.02	100.0		所有死亡原因	126	564.92	318.63	1.00	100.0
	十大主要死因	254	552.77	345.98	1.02	78.4		十大主要死因	158	668.19	463.19	1.03	79.8		十大主要死因	96	430.42	246.32	1.00	76.2
1	惡性腫瘤	93	202.39	131.73	0.99	28.7	1	惡性腫瘤	60	253.74	177.05	0.97	30.3	1	惡性腫瘤	33	147.96	88.71	1.02	26.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	71.82	42.93	0.93	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	84.58	59.63	1.04	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	58.29	29.51	0.80	10.3
3	肺炎	25	54.41	30.43	1.20	7.7	3	腦血管疾病	18	76.12	51.35	1.50	9.1	3	肺炎	10	44.84	20.21	1.18	7.9
4	腦血管疾病	24	52.23	30.91	1.15	7.4	4	肺炎	15	63.44	44.10	1.20	7.6	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	40.35	19.16	1.95	7.1
5	慢性下呼吸道疾病	16	34.82	18.42	1.17	4.9	5	慢性下呼吸道疾病	10	42.29	27.17	0.95	5.1	5	腦血管疾病	6	26.90	14.54	0.67	4.8
6	事故傷害	14	30.47	24.57	0.88	4.3	6	事故傷害	9	38.06	30.38	0.79	4.5	6	慢性下呼吸道疾病	6	26.90	12.48	1.82	4.8
7	蓄意自我傷害(自殺)	13	28.29	20.99	1.61	4.0	7	蓄意自我傷害(自殺)	8	33.83	22.81	1.42	4.0	7	蓄意自我傷害(自殺)	5	22.42	19.83	2.00	4.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	28.29	15.87	1.30	4.0	8	高血壓性疾病	7	29.60	20.41	1.36	3.5	8	事故傷害	5	22.42	18.95	1.08	4.0
9	糖尿病	12	26.12	15.72*-	0.59	3.7	9	糖尿病	7	29.60	19.11	0.71	3.5	9	糖尿病	5	22.42	13.29	0.48	4.0
10	高血壓性疾病	11	23.94	14.40	1.10	3.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	16.92	11.19	0.74	2.0	10	高血壓性疾病	4	17.93	9.65	0.82	3.2
	其他非十大死因	70	152.34	99.29	0.99	21.6		其他非十大死因	40	169.16	125.61	0.98	20.2		其他非十大死因	30	134.51	72.31	1.00	23.8
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	10.88	7.89	2.00	1.5	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.69	9.98	2.53	1.5	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	13.45	9.22	2.26	2.4
12	慢性肝病及肝硬化	5	10.88	6.79	0.62	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	3	12.69	8.52	0.52	1.5	12	敗血症	3	13.45	8.06	1.19	2.4
13	敗血症	4	8.71	5.98	0.67	1.2	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.46	6.27	1.72	1.0	13	慢性肝病及肝硬化	2	8.97	4.63	0.87	1.6
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.53	5.01	1.51	0.9	14	胃及十二指腸潰瘍	2	8.46	6.25	3.27	1.0	14	流行性感冒	1	4.48	2.55	3.21	0.8
15	胃及十二指腸潰瘍	2	4.35	2.85	2.38	0.6	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	8.46	5.57	3.79	1.0	15	主動脈瘤及剝離	1	4.48	2.55	2.21	0.8

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,950人 男性23,646人 女性22,304人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	230	955.19	447.34	0.98	100.0		所有死亡原因	140	1,103.93	597.05	1.00	100.0		所有死亡原因	90	789.61	295.07	0.92	100.0
	十大主要死因	185	768.30	348.74	1.02	80.4		十大主要死因	117	922.57	489.25	1.09	83.6		十大主要死因	71	622.92	216.30	0.97	78.9
1	惡性腫瘤	52	215.96	112.26	0.81	22.6	1	惡性腫瘤	38	299.64	161.52	0.88	27.1	1	惡性腫瘤	14	122.83	65.13	0.63	15.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	128.74	54.17	1.14	13.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	134.05	65.99	1.22	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	122.83	42.35	1.03	15.6
3	糖尿病	20	83.06	37.06	1.30	8.7	3	糖尿病	11	86.74	49.24	1.54	7.9	3	高血壓性疾病	10	87.73	24.68	2.39*	11.1
4	高血壓性疾病	19	78.91	29.75*+	2.33*	8.3	4	肺炎	10	78.85	36.25	1.00	7.1	4	糖尿病	9	78.96	23.14	1.08	10.0
5	肺炎	16	66.45	23.98	0.92	7.0	5	慢性下呼吸道疾病	10	78.85	33.49	1.16	7.1	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	52.64	12.91	1.59	6.7
6	慢性下呼吸道疾病	11	45.68	15.58	0.97	4.8	6	高血壓性疾病	9	70.97	33.67	2.24*	6.4	6	肺炎	6	52.64	12.91	0.81	6.7
7	腦血管疾病	10	41.53	19.12	0.63	4.3	7	事故傷害	7	55.20	36.26	0.99	5.0	7	腦血管疾病	5	43.87	12.55	0.69	5.6
8	事故傷害	9	37.38	23.30	0.92	3.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	7	55.20	36.01	2.10	5.0	8	敗血症	3	26.32	6.46	1.46	3.3
9	蓄意自我傷害(自殺)	9	37.38	22.25	1.94	3.9	9	腦血管疾病	5	39.43	23.59	0.56	3.6	9	事故傷害	2	17.55	8.68	0.68	2.2
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	33.22	11.27	1.02	3.5	10	結核病	3	23.66	13.21	3.85	2.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	17.55	7.49	1.44	2.2
	其他非十大死因	45	186.88	98.59	0.86	19.6		其他非十大死因	23	181.36	107.80	0.71	16.4		其他非十大死因	19	166.70	78.77	0.78	21.1
11	慢性肝病及肝硬化	5	20.76	10.20	1.00	2.2	11	慢性肝病及肝硬化	3	23.66	12.48	0.86	2.1	11	慢性肝病及肝硬化	2	17.55	7.28	1.21	2.2
12	敗血症	4	16.61	4.91	0.85	1.7	12	流行性感冒	2	15.77	10.78	9.04*	1.4	12	衰老/老邁	2	17.55	3.51	0.82	2.2
13	衰老/老邁	4	16.61	4.47	1.07	1.7	13	主動脈瘤及剝離	2	15.77	9.87	2.62	1.4	13	源於周產期的特定病況	1	8.77	17.82	9.38	1.1
14	主動脈瘤及剝離	3	12.46	7.94	2.76	1.3	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	15.77	7.48	0.49	1.4	14	主動脈瘤及剝離	1	8.77	6.15	2.90	1.1
15	結核病	3	12.46	6.78	2.57	1.3	15	皮膚及皮下組織疾病	2	15.77	6.16	4.50	1.4	15	皮膚及皮下組織疾病	1	8.77	4.93	1.88	1.1

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24, 079人 男性12, 682人 女性11, 398人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	270	739.85	439.06	1.01	100.0		所有死亡原因	166	877.38	612.94	1.05	100.0		所有死亡原因	104	591.78	269.62	0.96	100.0
	十大主要死因	185	506.93	314.42	0.90	68.5		十大主要死因	125	660.68	467.62	1.01	75.3		十大主要死因	63	358.48	169.90*-	0.79	60.6
1	惡性腫瘤	83	227.43	141.94	1.07	30.7	1	惡性腫瘤	59	311.84	217.32	1.18	35.5	1	惡性腫瘤	24	136.57	68.91	0.88	23.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	54.80	29.42*-	0.67	7.4	2	糖尿病	11	58.14	39.49	1.38	6.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	62.59	21.80*-	0.78	10.6
3	糖尿病	15	41.10	23.99	0.88	5.6	3	慢性下呼吸道疾病	10	52.85	34.99	1.16	6.0	3	肺炎	5	28.45	12.17	0.68	4.8
4	肺炎	14	38.36	22.36	0.80	5.2	4	肺炎	9	47.57	33.62	0.89	5.4	4	腦血管疾病	5	28.45	11.51	0.65	4.8
5	腦血管疾病	12	32.88	20.81	0.68	4.4	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	47.57	33.03*-	0.58	5.4	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.76	12.62	0.99	3.8
6	慢性下呼吸道疾病	11	30.14	16.07	0.94	4.1	6	腦血管疾病	7	37.00	28.99	0.72	4.2	6	糖尿病	4	22.76	10.31*-	0.44	3.8
7	事故傷害	10	27.40	20.90	0.77	3.7	7	事故傷害	7	37.00	28.31	0.76	4.2	7	事故傷害	3	17.07	13.33	0.78	2.9
8	慢性肝病及肝硬化	9	24.66	17.15	1.37	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	6	31.71	24.99	1.28	3.6	8	慢性肝病及肝硬化	3	17.07	6.81	1.54	2.9
9	蓄意自我傷害(自殺)	6	16.44	12.80	0.92	2.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	21.14	17.33	0.88	2.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.38	8.39	1.00	1.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	13.70	8.97	0.59	1.9	10	敗血症	3	15.86	9.56	1.06	1.8	10	敗血症	2	11.38	4.06	0.92	1.9
	其他非十大死因	85	232.91	124.64	1.40*	31.5		其他非十大死因	41	216.70	145.32	1.20	24.7		其他非十大死因	41	233.30	99.72	1.42*	39.4
11	敗血症	5	13.70	6.23	1.00	1.9	11	皮膚及皮下組織疾病	1	5.29	4.42	2.14	0.6	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.69	4.83	0.89	1.0
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.48	4.31	1.20	0.7	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.29	3.99	1.03	0.6	12	貧血	1	5.69	4.49	6.00	1.0
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.48	3.70	0.97	0.7	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	5.29	3.99*-	0.23	0.6	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.69	4.36	1.43	1.0
14	高血壓性疾病	2	5.48	3.07*-	0.24*	0.7	14	高血壓性疾病	1	5.29	3.47*-	0.24	0.6	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	5.69	2.75	3.90	1.0
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	5.48	2.77	2.67	0.7	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	5.29	3.37	2.05	0.6	15	高血壓性疾病	1	5.69	2.75*-	0.23	1.0

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,494人 男性18,920人 女性17,574人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	312	943.48	463.05	1.00	100.0		所有死亡原因	187	1,077.06	623.86	1.04	100.0		所有死亡原因	125	795.87	310.83	0.94	100.0
	十大主要死因	243	734.83	358.97	1.03	77.9		十大主要死因	142	817.88	477.20	1.03	75.9		十大主要死因	104	662.17	249.10	1.07	83.2
1	惡性腫瘤	94	284.25	157.12	1.10	30.1	1	惡性腫瘤	66	380.14	226.85	1.17	35.3	1	惡性腫瘤	28	178.28	92.39	0.93	22.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	90.72	36.01	0.83	9.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	80.64	41.86	0.78	7.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	101.87	30.80	0.87	12.8
3	肺炎	25	75.60	26.06	1.09	8.0	3	腦血管疾病	13	74.88	42.19	1.13	7.0	3	糖尿病	15	95.50	39.05	1.32	12.0
4	糖尿病	19	57.46	26.16	0.93	6.1	4	肺炎	10	57.60	28.31	0.79	5.3	4	肺炎	15	95.50	23.60	1.49	12.0
5	腦血管疾病	18	54.43	27.98	0.85	5.8	5	事故傷害	9	51.84	37.49	0.96	4.8	5	慢性下呼吸道疾病	6	38.20	11.55	1.56	4.8
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	42.34	17.15	1.35	4.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	51.84	26.49	1.70	4.8	6	衰老/老邁	6	38.20	7.70	1.79	4.8
7	慢性下呼吸道疾病	12	36.29	14.06	0.80	3.8	7	慢性肝病及肝硬化	6	34.56	26.11	1.31	3.2	7	慢性肝病及肝硬化	5	31.83	15.44	2.24	4.0
8	事故傷害	11	33.26	24.63	0.84	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	6	34.56	17.05	0.54	3.2	8	腦血管疾病	5	31.83	13.32	0.51	4.0
9	慢性肝病及肝硬化	11	33.26	21.94	1.66	3.5	9	高血壓性疾病	5	28.80	12.60	0.97	2.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	31.83	9.24	0.97	4.0
10	衰老/老邁	9	27.22	7.86	1.82	2.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	23.04	18.27	0.90	2.1	10	敗血症	3	19.10	6.02	1.08	2.4
	其他非十大死因	69	208.65	104.08	0.92	22.1		其他非十大死因	45	259.19	146.66	1.06	24.1		其他非十大死因	21	133.71	61.73	0.59*	16.8
11	敗血症	7	21.17	6.87	1.13	2.2	11	糖尿病	4	23.04	12.34*-	0.43	2.1	11	事故傷害	2	12.73	10.42	0.50	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	15.12	10.93	0.80	1.6	12	敗血症	4	23.04	10.21	1.18	2.1	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.73	5.60	5.70	1.6
13	高血壓性疾病	5	15.12	4.83*-	0.46	1.6	13	阿茲海默病	3	17.28	7.62	29.35*	1.6	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	6.37	11.96	4.92	0.8
14	阿茲海默病	4	12.10	4.58	23.60*	1.3	14	衰老/老邁	3	17.28	7.51	1.79	1.6	14	阿茲海默病	1	6.37	2.44	14.55	0.8
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	9.07	4.10	3.09	1.0	15	結核病	3	17.28	7.37	3.02	1.6	15	帕金森病	1	6.37	2.44	1.75	0.8

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計33,069人 男性17,362人 女性15,706人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	270	774.33	453.86	1.02	100.0		所有死亡原因	161	895.34	600.08	1.03	100.0		所有死亡原因	109	645.43	322.51	1.00	100.0
	十大主要死因	225	645.27	368.70	1.09	83.3		十大主要死因	130	722.95	479.49	1.05	80.7		十大主要死因	95	562.53	278.40	1.17	87.2
1	惡性腫瘤	93	266.71	158.90	1.22	34.4	1	惡性腫瘤	55	305.86	201.14	1.11	34.2	1	惡性腫瘤	38	225.01	123.60	1.42*	34.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	88.90	50.83	1.04	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	105.66	66.70	1.22	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	71.06	38.27	0.83	11.0
3	糖尿病	17	48.75	26.30	1.00	6.3	3	慢性下呼吸道疾病	12	66.73	40.26	1.37	7.5	3	糖尿病	8	47.37	18.23	0.88	7.3
4	慢性下呼吸道疾病	17	48.75	22.36	1.43	6.3	4	糖尿病	9	50.05	33.02	1.13	5.6	4	高血壓性疾病	7	41.45	14.53	1.61	6.4
5	肺炎	16	45.89	22.27	0.89	5.9	5	肺炎	9	50.05	31.50	0.88	5.6	5	肺炎	7	41.45	13.83	0.92	6.4
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	37.28	24.26	1.54	4.8	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	38.93	27.48	1.60	4.3	6	事故傷害	6	35.53	22.11	1.61	5.5
7	事故傷害	11	31.55	21.32	0.88	4.1	7	腦血管疾病	6	33.37	23.23	0.62	3.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35.53	19.24	1.47	5.5
8	腦血管疾病	11	31.55	18.59	0.63	4.1	8	事故傷害	5	27.81	20.67	0.56	3.1	8	腦血管疾病	5	29.61	13.42	0.64	4.6
9	高血壓性疾病	11	31.55	14.61	1.28	4.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	22.24	20.16	0.91	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	5	29.61	10.62	1.69	4.6
10	慢性肝病及肝硬化	5	14.34	9.26	0.79	1.9	10	慢性肝病及肝硬化	4	22.24	15.32	0.89	2.5	10	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.92	4.56	3.83	0.9
	其他非十大死因	45	129.05	85.17	0.77	16.7		其他非十大死因	31	172.39	120.59	0.95	19.3		其他非十大死因	14	82.90	44.11*-	0.50*	12.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	4	11.47	10.51	0.63	1.5	11	高血壓性疾病	4	22.24	13.50	0.94	2.5	11	主動脈瘤及剝離	1	5.92	4.56	2.50	0.9
12	敗血症	4	11.47	5.74	0.79	1.5	12	敗血症	3	16.68	10.54	1.06	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	1	5.92	2.08	0.52	0.9
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.74	4.62	0.98	0.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.12	8.78	2.15	1.2	13	帕金森病	1	5.92	1.83	2.16	0.9
14	主動脈瘤及剝離	2	5.74	4.14	1.58	0.7	14	源於周產期的特定病況	1	5.56	12.16	4.15	0.6	14	敗血症	1	5.92	1.83*-	0.45	0.9
15	源於周產期的特定病況	1	2.87	6.02	2.47	0.4	15	疝氣及腸阻塞	1	5.56	3.79	2.99	0.6							

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,869人 男性17,982人 女性16,888人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	325	853.20	477.05	1.09	100.0		所有死亡原因	193	973.57	649.73	1.10	100.0		所有死亡原因	132	722.57	307.18	1.08	100.0
	十大主要死因	256	672.06	374.69	1.10	78.8		十大主要死因	156	786.92	522.22	1.12	80.8		十大主要死因	103	563.83	243.24	1.18	78.0
1	惡性腫瘤	83	217.89	132.65	0.97	25.5	1	惡性腫瘤	56	282.49	187.12	1.01	29.0	1	惡性腫瘤	27	147.80	83.98	0.90	20.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	99.76	51.08	1.13	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	95.84	61.20	1.10	9.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	104.01	41.95	1.17	14.4
3	糖尿病	32	84.01	44.74*+	1.66*	9.8	3	糖尿病	18	90.80	59.06*+	2.02*	9.3	3	糖尿病	14	76.64	29.22	1.35	10.6
4	高血壓性疾病	20	52.50	24.31*+	2.06*	6.2	4	慢性下呼吸道疾病	12	60.53	38.98	1.20	6.2	4	高血壓性疾病	13	71.16	23.95*+	2.63*	9.8
5	肺炎	19	49.88	22.88	0.94	5.8	5	事故傷害	10	50.44	41.44	1.02	5.2	5	肺炎	10	54.74	18.20	1.17	7.6
6	腦血管疾病	15	39.38	19.61	0.76	4.6	6	慢性肝病及肝硬化	10	50.44	38.63	2.04	5.2	6	腦血管疾病	7	38.32	15.12	0.79	5.3
7	慢性下呼吸道疾病	14	36.75	19.19	1.04	4.3	7	肺炎	9	45.40	27.92	0.78	4.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	27.37	9.80	1.08	3.8
8	事故傷害	12	31.50	23.54	0.86	3.7	8	腦血管疾病	8	40.36	25.13	0.73	4.1	8	敗血症	4	21.90	11.35	1.61	3.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	31.50	15.18	1.25	3.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	35.31	21.44	1.40	3.6	9	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.95	5.57	6.83	1.5
10	慢性肝病及肝硬化	11	28.88	21.50	1.57	3.4	10	高血壓性疾病	7	35.31	21.29	1.46	3.6	10	皮膚及皮下組織疾病	2	10.95	4.09	3.02	1.5
	其他非十大死因	69	181.14	102.36	1.05	21.2		其他非十大死因	37	186.64	127.51	1.01	19.2		其他非十大死因	29	158.75	63.95*-	0.82	22.0
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	15.75	10.50	0.88	1.8	11	蓄意自我傷害(自殺)	6	30.27	22.36	1.25	3.1	11	慢性下呼吸道疾病	2	10.95	4.09	0.60	1.5
12	敗血症	6	15.75	8.30	1.05	1.8	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.09	8.99	1.95	1.0	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.95	3.84	2.56	1.5
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.88	6.30	1.33	0.9	13	主動脈瘤及剝離	2	10.09	6.23	2.03	1.0	13	事故傷害	2	10.95	3.54*-	0.48	1.5
14	皮膚及皮下組織疾病	3	7.88	4.26	2.52	0.9	14	敗血症	2	10.09	5.62	0.63	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.47	3.51	0.80	0.8
15	膽結石及其他膽囊疾患	2	5.25	2.99	2.51	0.6	15	胃及十二指腸潰瘍	2	10.09	5.20	3.56	1.0	15	病毒性肝炎	1	5.47	2.47	6.74	0.8

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計38,092人 男性19,824人 女性18,268人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	357	818.84	475.01	1.06	100.0		所有死亡原因	211	941.54	630.99	1.06	100.0		所有死亡原因	146	689.07	333.27	1.06	100.0
	十大主要死因	282	646.82	370.75	1.10	79.0		十大主要死因	168	749.67	501.53	1.06	79.6		十大主要死因	119	561.64	261.82	1.13	81.5
1	惡性腫瘤	102	233.96	144.76	1.05	28.6	1	惡性腫瘤	65	290.05	193.88	1.02	30.8	1	惡性腫瘤	37	174.63	94.67	1.09	25.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	98.63	55.39	1.14	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	107.10	73.95	1.22	11.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	89.67	37.81	1.04	13.0
3	腦血管疾病	26	59.64	30.42	1.16	7.3	3	慢性下呼吸道疾病	17	75.86	43.08	1.51	8.1	3	糖尿病	14	66.08	27.26	1.20	9.6
4	慢性下呼吸道疾病	24	55.05	25.33	1.59*	6.7	4	腦血管疾病	15	66.93	42.37	1.19	7.1	4	腦血管疾病	11	51.92	21.52	1.11	7.5
5	糖尿病	23	52.75	26.72	1.06	6.4	5	事故傷害	11	49.09	39.15	0.98	5.2	5	肺炎	8	37.76	14.42	0.83	5.5
6	肺炎	19	43.58	23.17	0.84	5.3	6	肺炎	11	49.09	32.88	0.85	5.2	6	衰老/老邁	8	37.76	12.22	2.59*	5.5
7	事故傷害	17	38.99	29.71	1.07	4.8	7	糖尿病	9	40.16	24.21	0.88	4.3	7	慢性下呼吸道疾病	7	33.04	12.19	1.88	4.8
8	衰老/老邁	10	22.94	9.82	2.15*	2.8	8	慢性肝病及肝硬化	8	35.70	27.52	1.43	3.8	8	事故傷害	6	28.32	20.33	1.27	4.1
9	慢性肝病及肝硬化	9	20.64	14.81	1.13	2.5	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.85	12.99	0.73	1.9	9	高血壓性疾病	5	23.60	11.51	0.90	3.4
10	高血壓性疾病	9	20.64	10.62	0.83	2.5	10	高血壓性疾病	4	17.85	11.49	0.74	1.9	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	18.88	9.88	0.77	2.7
	其他非十大死因	75	172.03	104.26	0.93	21.0		其他非十大死因	43	191.88	129.46	1.03	20.4		其他非十大死因	27	127.43	71.46	0.84	18.5
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	16.06	8.60	0.65	2.0	11	敗血症	4	17.85	10.76	1.10	1.9	11	敗血症	3	14.16	6.70	1.08	2.1
12	敗血症	7	16.06	7.47	1.09	2.0	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.39	7.76	0.53	1.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.44	8.72	0.84	1.4
13	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.76	10.28	0.77	1.7	13	帕金森病	2	8.92	6.20	1.68	0.9	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.44	6.50	1.42	1.4
14	帕金森病	4	9.17	5.19	2.24	1.1	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	8.92	5.74	3.29	0.9	14	帕金森病	2	9.44	4.98	3.30	1.4
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.88	4.34	1.17	0.8	15	衰老/老邁	2	8.92	5.42	1.22	0.9	15	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.72	9.73	15.37	0.7

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,598人 男性22,410人 女性21,188人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	179	1,137.95	455.95	0.98	100.0		所有死亡原因	117	1,419.56	652.19	1.09	100.0		所有死亡原因	62	827.99	254.46	0.82	100.0
	十大主要死因	144	915.45	374.37	1.04	80.4		十大主要死因	98	1,189.03	555.39	1.21	83.8		十大主要死因	50	667.74	211.89	0.87	80.6
1	惡性腫瘤	45	286.08	133.41	0.90	25.1	1	惡性腫瘤	32	388.26	206.86	0.97	27.4	1	惡性腫瘤	13	173.61	54.88	0.74	21.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	209.79	75.61*+	1.56*	18.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	242.66	102.25	1.85*	17.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	173.61	49.16	1.24	21.0
3	肺炎	15	95.36	28.05	1.11	8.4	3	事故傷害	11	133.46	66.67	2.19*	9.4	3	肺炎	6	80.13	18.31	1.08	9.7
4	事故傷害	13	82.64	39.56	1.81	7.3	4	肺炎	9	109.20	39.85	1.11	7.7	4	糖尿病	5	66.77	20.31	0.75	8.1
5	腦血管疾病	10	63.57	28.24	0.79	5.6	5	腦血管疾病	7	84.93	38.90	1.00	6.0	5	腦血管疾病	3	40.06	17.25	0.53	4.8
6	蓄意自我傷害(自殺)	7	44.50	21.97	2.14	3.9	6	蓄意自我傷害(自殺)	6	72.80	36.01	2.58	5.1	6	慢性下呼吸道疾病	3	40.06	8.42	1.37	4.8
7	慢性下呼吸道疾病	7	44.50	13.34	0.77	3.9	7	慢性下呼吸道疾病	4	48.53	17.77	0.57	3.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	26.71	17.48	0.67	3.2
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	38.14	15.82	0.96	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	48.53	17.60	1.23	3.4	8	事故傷害	2	26.71	10.13	0.88	3.2
9	糖尿病	5	31.79	10.84*-	0.41*	2.8	9	敗血症	3	36.40	15.74	1.42	2.6	9	高血壓性疾病	2	26.71	8.28	0.62	3.2
10	敗血症	3	19.07	7.53	0.82	1.7	10	慢性肝病及肝硬化	2	24.27	13.74	0.82	1.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	1	13.35	7.67	1.02	1.6
	其他非十大死因	35	222.50	81.58	0.81	19.6		其他非十大死因	19	230.53	96.80	0.71	16.2		其他非十大死因	12	160.26	42.57*-	0.66	19.4
11	慢性肝病及肝硬化	2	12.71	7.27	0.55	1.1	11	主動脈瘤及剝離	2	24.27	9.64	3.43	1.7	11	結核病	1	13.35	2.45	3.16	1.6
12	主動脈瘤及剝離	2	12.71	4.56	2.30	1.1	12	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	12.13	7.40	8.53	0.9							
13	高血壓性疾病	2	12.71	4.50*-	0.31	1.1	13	動脈粥樣硬化	1	12.13	4.46	26.30	0.9							
14	結核病	2	12.71	3.47	2.18	1.1	14	疝氣及腸阻塞	1	12.13	4.46	3.85	0.9							
15	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	6.36	4.06	9.19	0.6	15	結核病	1	12.13	4.46	1.63	0.9							

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,730人 男性8,242人 女性7,488人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	301	1,086.64	527.86*+	1.22*	100.0		所有死亡原因	158	1,100.59	639.42	1.09	100.0		所有死亡原因	143	1,071.64	414.19*+	1.38*	100.0
	十大主要死因	239	862.82	421.80*+	1.24*	79.4		十大主要死因	134	933.41	539.91	1.23*	84.8		十大主要死因	106	794.36	321.83*+	1.34*	74.1
1	惡性腫瘤	89	321.30	174.55*+	1.29*	29.6	1	惡性腫瘤	57	397.05	238.93	1.26	36.1	1	惡性腫瘤	32	239.81	114.52	1.33	22.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	97.47	38.97	0.95	9.0	2	慢性下呼吸道疾病	15	104.49	47.62	1.71	9.5	2	肺炎	15	112.41	33.24	1.98*	10.5
3	肺炎	27	97.47	38.24	1.52	9.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	90.55	47.12	0.90	8.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	104.92	30.13	0.99	9.8
4	慢性下呼吸道疾病	22	79.42	29.82	1.87*	7.3	4	肺炎	12	83.59	42.16	1.18	7.6	4	糖尿病	11	82.43	39.74	1.24	7.7
5	糖尿病	15	54.15	27.74	0.93	5.0	5	事故傷害	10	69.66	55.34	1.32	6.3	5	腦血管疾病	9	67.45	25.29	1.18	6.3
6	事故傷害	14	50.54	38.57	1.31	4.7	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	48.76	22.27	1.66	4.4	6	慢性下呼吸道疾病	7	52.46	18.61	2.37	4.9
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	46.93	17.98	1.59	4.3	7	慢性肝病及肝硬化	6	41.79	29.37	1.60	3.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	44.96	16.25	1.50	4.2
8	腦血管疾病	12	43.32	18.48	0.71	4.0	8	高血壓性疾病	6	41.79	20.24	1.46	3.8	8	高血壓性疾病	5	37.47	15.06	1.15	3.5
9	高血壓性疾病	11	39.71	16.74	1.30	3.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	27.86	21.74	1.11	2.5	9	事故傷害	4	29.98	19.71	1.22	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	9	32.49	20.72	1.65	3.0	10	糖尿病	4	27.86	15.13	0.54	2.5	10	慢性肝病及肝硬化	3	22.48	9.29	1.69	2.1
	其他非十大死因	62	223.83	106.05	1.13	20.6		其他非十大死因	24	167.18	99.52*-	0.67*	15.2		其他非十大死因	37	277.28	92.36	1.49*	25.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	21.66	16.42	1.17	2.0	11	腦血管疾病	3	20.90	10.64*-	0.33*	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	14.99	10.88	1.30	1.4
12	衰老/老邁	4	14.44	4.96	1.05	1.3	12	衰老/老邁	2	13.93	6.57	1.50	1.3	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	14.99	6.65	1.85	1.4
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	10.83	3.93	1.91	1.0	13	主動脈瘤及剝離	1	6.97	5.40	1.26	0.6	13	敗血症	2	14.99	4.64	0.93	1.4
14	主動脈瘤及剝離	2	7.22	3.95	1.73	0.7	14	胃及十二指腸潰瘍	1	6.97	4.45	2.09	0.6	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	14.99	3.88	3.04	1.4
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	7.22	3.48	1.11	0.7	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	6.97	3.46	3.79	0.6	15	衰老/老邁	2	14.99	3.55	0.80	1.4

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,700人 男性14,356人 女性13,344人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	300	969.09	455.29	1.04	100.0		所有死亡原因	168	1,043.87	590.88	1.02	100.0		所有死亡原因	132	888.05	323.06	1.06	100.0
	十大主要死因	236	762.35	368.85	1.05	78.7		十大主要死因	134	832.61	483.22	1.03	79.8		十大主要死因	104	699.68	259.16	1.13	78.8
1	惡性腫瘤	75	242.27	133.14	0.94	25.0	1	惡性腫瘤	47	292.03	172.97	0.91	28.0	1	惡性腫瘤	28	188.37	95.08	0.98	21.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	125.98	54.21	1.16	13.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	130.48	73.28	1.27	12.5	2	肺炎	18	121.10	31.82	1.91*	13.6
3	肺炎	27	87.22	29.97	1.27	9.0	3	腦血管疾病	15	93.20	51.63	1.43	8.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	121.10	31.56	1.04	13.6
4	腦血管疾病	24	77.53	36.16	1.22	8.0	4	慢性下呼吸道疾病	13	80.78	40.07	1.30	7.7	4	糖尿病	12	80.73	32.28	1.12	9.1
5	糖尿病	20	64.61	31.97	1.05	6.7	5	事故傷害	9	55.92	43.65	1.06	5.4	5	腦血管疾病	9	60.55	22.96	0.98	6.8
6	慢性下呼吸道疾病	13	41.99	16.84	0.93	4.3	6	肺炎	9	55.92	26.21	0.77	5.4	6	高血壓性疾病	7	47.09	17.41	1.31	5.3
7	事故傷害	11	35.53	24.37	0.90	3.7	7	糖尿病	8	49.71	30.81	0.94	4.8	7	慢性肝病及肝硬化	4	26.91	12.51	1.89	3.0
8	高血壓性疾病	11	35.53	16.44	1.10	3.7	8	慢性肝病及肝硬化	4	24.85	15.05	0.96	2.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.91	7.77	0.83	3.0
9	慢性肝病及肝硬化	8	25.84	13.52	1.30	2.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.85	14.99	0.83	2.4	9	事故傷害	2	13.46	3.88*-	0.53	1.5
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	25.84	12.24	0.83	2.7	10	高血壓性疾病	4	24.85	14.55	0.85	2.4	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.46	3.88	2.61	1.5
	其他非十大死因	64	206.74	86.44	1.00	21.3		其他非十大死因	34	211.26	107.66	0.99	20.2		其他非十大死因	28	188.37	63.90	0.85	21.2
11	敗血症	5	16.15	6.82	0.87	1.7	11	敗血症	4	24.85	12.78	1.28	2.4	11	血管性及未明示之癱瘓症	2	13.46	2.75	1.48	1.5
12	帕金森病	5	16.15	6.46	3.17*	1.7	12	帕金森病	4	24.85	12.42	3.94*	2.4	12	皮膚及皮下組織疾病	1	6.73	4.75	1.49	0.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.69	5.79	1.43	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.43	6.98	2.22	1.2	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.73	4.75	0.82	0.8
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.69	3.63	1.64	1.0	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.21	4.24	1.81	0.6	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.73	3.93	3.61	0.8
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	9.69	2.95	1.39	1.0	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.21	3.13	0.96	0.6	15	主動脈瘤及剝離	1	6.73	3.77	2.28	0.8

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,957人 男性16,094人 女性14,864人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	392	1,134.65	465.67	1.01	100.0		所有死亡原因	231	1,263.12	627.89	1.03	100.0		所有死亡原因	161	990.16	298.69	0.96	100.0
	十大主要死因	312	903.09	366.16	1.03	79.6		十大主要死因	186	1,017.06	516.27	1.06	80.5		十大主要死因	129	793.36	233.79	1.00	80.1
1	惡性腫瘤	122	353.13	162.82	1.16	31.1	1	惡性腫瘤	85	464.79	237.00	1.24	36.8	1	惡性腫瘤	37	227.55	88.57	0.99	23.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	118.68	42.35	0.90	10.5	2	腦血管疾病	23	125.77	56.05	1.59*	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	141.45	31.55	0.97	14.3
3	腦血管疾病	29	83.94	30.97	1.08	7.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	98.43	48.22	0.80	7.8	3	肺炎	16	98.40	19.60	1.24	9.9
4	肺炎	27	78.15	21.83	0.91	6.9	4	肺炎	11	60.15	24.72	0.66	4.8	4	衰老/老邁	15	92.25	16.55*+	3.47*	9.3
5	衰老/老邁	21	60.78	14.54*+	3.24*	5.4	5	事故傷害	10	54.68	46.31	0.93	4.3	5	糖尿病	11	67.65	20.04	0.75	6.8
6	糖尿病	20	57.89	22.10	0.77	5.1	6	慢性下呼吸道疾病	10	54.68	21.44	0.70	4.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	43.05	16.04	1.05	4.3
7	事故傷害	15	43.42	35.53	0.98	3.8	7	糖尿病	9	49.21	22.97	0.78	3.9	7	腦血管疾病	6	36.90	8.77*-	0.48	3.7
8	慢性下呼吸道疾病	15	43.42	13.26	0.77	3.8	8	蓄意自我傷害(自殺)	8	43.74	27.16	1.59	3.5	8	事故傷害	5	30.75	22.09	1.05	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	37.63	14.58	0.98	3.3	9	慢性肝病及肝硬化	6	32.81	17.58	1.12	2.6	9	慢性下呼吸道疾病	5	30.75	6.20	1.01	3.1
10	高血壓性疾病	9	26.05	8.17	0.65	2.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	32.81	14.83	0.90	2.6	10	高血壓性疾病	4	24.60	4.39*-	0.55	2.5
	其他非十大死因	80	231.56	99.52	0.92	20.4		其他非十大死因	45	246.06	111.62	0.94	19.5		其他非十大死因	32	196.80	64.91	0.83	19.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	8	23.16	14.12	1.15	2.0	11	衰老/老邁	6	32.81	11.16	2.71	2.6	11	敗血症	3	18.45	3.80	0.85	1.9
12	慢性肝病及肝硬化	8	23.16	10.47	1.02	2.0	12	高血壓性疾病	5	27.34	11.79	0.76	2.2	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.30	8.41	1.95	1.2
13	敗血症	7	20.26	5.68	0.89	1.8	13	主動脈瘤及剝離	4	21.87	9.70	3.29	1.7	13	慢性肝病及肝硬化	2	12.30	2.78	0.72	1.2
14	主動脈瘤及剝離	5	14.47	5.82	2.79	1.3	14	敗血症	4	21.87	8.28	0.92	1.7	14	皮膚及皮下組織疾病	2	12.30	2.40	2.21	1.2
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	11.58	5.37	1.61	1.0	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	10.94	4.56	2.55	0.9	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.30	2.40	1.08	1.2

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計34,548人 男性18,288人 女性16,260人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	221	1,251.7 0	549.44*+	1.04	100.0		所有死亡原因	130	1,357.5 6	696.17	1.06	100.0		所有死亡原因	91	1,126.24	339.80	0.99	100.0
	十大主要死因	182	1,030.8 1	445.96*+	1.12	82.4		十大主要死因	114	1,190.4 8	610.13*+	1.17	87.7		十大主要死因	73	903.47	279.93	1.16	80.2
1	惡性腫瘤	71	402.13	185.15*+	1.21	32.1	1	惡性腫瘤	52	543.02	264.74*+	1.35*	40.0	1	惡性腫瘤	19	235.15	91.96	0.92	20.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	192.57	65.31	1.38	15.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	156.64	77.26	1.24	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	235.15	46.90	1.48	20.9
3	事故傷害	16	90.62	64.40*+	1.94*	7.2	3	事故傷害	12	125.31	91.17	2.04*	9.2	3	肺炎	9	111.39	18.86	1.30	9.9
4	腦血管疾病	13	73.63	26.13	0.89	5.9	4	腦血管疾病	9	93.98	41.88	1.14	6.9	4	糖尿病	5	61.88	13.98	0.62	5.5
5	肺炎	12	67.97	21.81	0.76	5.4	5	糖尿病	6	62.66	37.62	0.95	4.6	5	敗血症	5	61.88	10.77	2.59	5.5
6	糖尿病	11	62.30	30.20	0.77	5.0	6	慢性肝病及肝硬化	6	62.66	35.21	2.02	4.6	6	事故傷害	4	49.50	30.80	1.55	4.4
7	慢性肝病及肝硬化	7	39.65	23.53	1.64	3.2	7	慢性下呼吸道疾病	5	52.21	18.55	0.66	3.8	7	腦血管疾病	4	49.50	10.50	0.58	4.4
8	慢性下呼吸道疾病	7	39.65	10.83	0.66	3.2	8	肺炎	3	31.33	17.37	0.35	2.3	8	蓄意自我傷害(自殺)	3	37.13	35.01	2.81	3.3
9	敗血症	6	33.98	8.37	1.42	2.7	9	高血壓性疾病	3	31.33	14.83	0.86	2.3	9	血管性及未明示之癱呆症	3	37.13	6.33	3.01	3.3
10	高血壓性疾病	5	28.32	10.24	0.67	2.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	31.33	11.51	0.81	2.3	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	24.75	14.82	2.26	2.2
	其他非十大死因	39	220.89	103.47	0.79	17.6		其他非十大死因	16	167.08	86.04	0.64	12.3		其他非十大死因	18	222.77	59.87	0.63*	19.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.99	15.24	0.81	1.4	11	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	20.89	7.44	5.02	1.5	11	高血壓性疾病	2	24.75	6.12	0.51	2.2
12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	16.99	4.49	4.59	1.4	12	主動脈瘤及剝離	1	10.44	6.76	1.48	0.8	12	慢性下呼吸道疾病	2	24.75	4.93	0.74	2.2
13	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.99	4.19*-	0.41	1.4	13	塵肺症	1	10.44	6.20	26.93	0.8	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.38	4.22	1.77	1.1
14	血管性及未明示之癱呆症	3	16.99	4.03	1.91	1.4	14	敗血症	1	10.44	3.37*-	0.43	0.8	14	慢性肝病及肝硬化	1	12.38	4.22	0.64	1.1
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.33	7.64	1.34	0.9								15	胃及十二指腸潰瘍	1	12.38	3.03	5.21	1.1

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計17,656人 男性9,576人 女性8,080人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	182	1,155.56	475.35	1.02	100.0		所有死亡原因	106	1,275.42	626.00	1.07	100.0		所有死亡原因	76	1,021.51	324.65	0.97	100.0
	十大主要死因	140	888.89	380.18	1.07	76.9		十大主要死因	84	1,010.71	507.80	1.09	79.2		十大主要死因	61	819.89	250.88	1.09	80.3
1	惡性腫瘤	56	355.56	150.58	1.15	30.8	1	惡性腫瘤	35	421.13	204.80	1.13	33.0	1	惡性腫瘤	21	282.26	101.38	1.19	27.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	120.63	40.12	0.92	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	120.32	57.15	1.01	9.4	2	腦血管疾病	9	120.97	30.78	1.51	11.8
3	腦血管疾病	16	101.59	41.63	1.30	8.8	3	腦血管疾病	7	84.23	44.78	1.10	6.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	120.97	20.45*-	0.81	11.8
4	肺炎	12	76.19	25.11	0.91	6.6	4	慢性下呼吸道疾病	7	84.23	35.07	1.14	6.6	4	肺炎	6	80.65	22.82	1.01	7.9
5	糖尿病	8	50.79	23.72	0.67	4.4	5	肺炎	6	72.19	29.64	0.85	5.7	5	糖尿病	5	67.20	24.45	0.72	6.6
6	慢性下呼吸道疾病	8	50.79	16.79	0.90	4.4	6	慢性肝病及肝硬化	5	60.16	45.08	2.12	4.7	6	高血壓性疾病	3	40.32	18.38	0.88	3.9
7	慢性肝病及肝硬化	7	44.44	32.07	1.98	3.8	7	事故傷害	5	60.16	34.89	1.04	4.7	7	慢性肝病及肝硬化	2	26.88	15.21	1.50	2.6
8	事故傷害	6	38.10	21.00	0.86	3.3	8	蓄意自我傷害(自殺)	3	36.10	21.87	1.34	2.8	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	26.88	8.03	2.64	2.6
9	蓄意自我傷害(自殺)	4	25.40	17.48	1.27	2.2	9	糖尿病	3	36.10	21.19	0.59	2.8	9	血管性及未明示之癱瘓症	2	26.88	4.83	2.34	2.6
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	25.40	11.68	3.20	2.2	10	敗血症	3	36.10	13.34	1.59	2.8	10	衰老/老邁	2	26.88	4.55	1.02	2.6
	其他非十大死因	42	266.67	95.17	0.90	23.1		其他非十大死因	22	264.71	118.19	1.00	20.8		其他非十大死因	15	201.61	73.78	0.66	19.7
11	高血壓性疾病	4	25.40	10.37	0.64	2.2	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	24.06	14.42	3.83	1.9	11	先天性畸形變形及染色體異常	1	13.44	14.17	13.28	1.3
12	敗血症	3	19.05	5.74	0.84	1.6	12	結核病	2	24.06	8.75	3.66	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	13.44	13.85	1.06	1.3
13	血管性及未明示之癱瘓症	3	19.05	4.65	2.24	1.6	13	帕金森病	2	24.06	8.75	3.15	1.9	13	事故傷害	1	13.44	3.80*-	0.45	1.3
14	結核病	2	12.70	3.66	2.23	1.1	14	胃及十二指腸潰瘍	1	12.03	4.69	3.06	0.9	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	13.44	2.56*-	0.32	1.3
15	帕金森病	2	12.70	3.66	1.96	1.1	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	12.03	4.69	2.03	0.9	15	慢性下呼吸道疾病	1	13.44	2.27*-	0.43	1.3

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,750人 男性8,311人 女性7,440人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因

民國104年(2015年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	331	1,080.08	504.16*+	1.13*	100.0		所有死亡原因	190	1,182.92	666.61	1.12	100.0		所有死亡原因	141	966.81	337.94	1.14	100.0
	十大主要死因	255	832.08	389.76	1.14*	77.0		十大主要死因	151	940.11	536.38	1.13	79.5		十大主要死因	108	740.54	251.13	1.23*	76.6
1	惡性腫瘤	73	238.20	123.52	0.88	22.1	1	惡性腫瘤	50	311.29	181.16	0.93	26.3	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	164.56	57.47	1.42	17.0
2	肺炎	39	127.26	49.64*+	1.90*	11.8	2	肺炎	25	155.65	77.39*+	2.16*	13.2	2	惡性腫瘤	23	157.71	64.61	0.78	16.3
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	120.73	55.79	1.11	11.2	3	事故傷害	18	112.07	66.76	2.04*	9.5	3	肺炎	14	96.00	30.68	1.60	9.9
4	腦血管疾病	23	75.05	30.88	1.15	6.9	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	80.94	46.44	0.77	6.8	4	糖尿病	12	82.28	27.57	1.11	8.5
5	事故傷害	20	65.26	38.34	1.60	6.0	5	腦血管疾病	12	74.71	41.69	1.11	6.3	5	腦血管疾病	11	75.43	20.35	1.19	7.8
6	糖尿病	18	58.74	24.02	0.93	5.4	6	慢性下呼吸道疾病	9	56.03	29.81	0.89	4.7	6	高血壓性疾病	8	54.85	15.57	1.57	5.7
7	高血壓性疾病	14	45.68	18.72	1.43	4.2	7	蓄意自我傷害(自殺)	6	37.36	28.38	1.43	3.2	7	敗血症	5	34.28	9.89	1.96	3.5
8	慢性下呼吸道疾病	13	42.42	17.49	0.94	3.9	8	慢性肝病及肝硬化	6	37.36	25.42	1.38	3.2	8	皮膚及皮下組織疾病	4	27.43	10.01	5.85*	2.8
9	敗血症	10	32.63	11.07	1.75	3.0	9	高血壓性疾病	6	37.36	20.47	1.27	3.2	9	慢性下呼吸道疾病	4	27.43	8.27	1.14	2.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	8	26.10	20.29	1.35	2.4	10	糖尿病	6	37.36	18.86	0.68	3.2	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	20.57	6.71	2.42	2.1
	其他非十大死因	76	247.99	114.39	1.11	23.0		其他非十大死因	39	242.81	130.23	1.09	20.5		其他非十大死因	33	226.28	86.81	0.92	23.4
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	26.10	9.13	0.82	2.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	37.36	16.82	1.20	3.2	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.71	10.56	1.12	1.4
12	慢性肝病及肝硬化	7	22.84	14.32	1.11	2.1	12	敗血症	5	31.13	14.27	1.58	2.6	12	事故傷害	2	13.71	8.35	0.52	1.4
13	皮膚及皮下組織疾病	5	16.32	7.41	4.12*	1.5	13	結核病	2	12.45	7.07	2.18	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.71	3.86	2.49	1.4
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	13.05	5.74	1.87	1.2	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.45	7.07	3.74	1.1	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.71	3.23*-	0.41	1.4
15	結核病	3	9.79	4.17	2.09	0.9	15	主動脈瘤及剝離	2	12.45	6.35	2.09	1.1	15	帕金森病	1	6.86	4.22	1.77	0.7

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計30,646人 男性16,062人 女性14,584人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計