

# 彰化縣彰化市主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%
	所有死亡原因	1,607	689.19	386.91*-	0.93*	100.0		所有死亡原因	927	805.23	516.12*-	0.93*	100.0		所有死亡原因	680	576.03	274.37*-	0.96	100.0
	十大主要死因	1,261	540.80	300.70*-	0.95	78.5		十大主要死因	740	642.80	408.04*-	0.93	79.8		十大主要死因	524	443.88	212.44	0.97	77.1
1	惡性腫瘤	407	174.55	105.99*-	0.83*	25.3	1	惡性腫瘤	250	217.16	145.57*-	0.82*	27.0	1	惡性腫瘤	157	132.99	71.26*-	0.87	23.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	175	75.05	41.32*-	0.84*	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	101	87.73	55.53	0.91	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	74	62.69	28.84*-	0.79*	10.9
3	肺炎	162	69.48	33.86*+	1.24*	10.1	3	肺炎	95	82.52	46.98	1.21	10.2	3	肺炎	67	56.76	24.00	1.27	9.9
4	腦血管疾病	112	48.03	25.00	1.15	7.0	4	慢性下呼吸道疾病	60	52.12	28.35	0.95	6.5	4	腦血管疾病	58	49.13	22.45	1.38*	8.5
5	慢性下呼吸道疾病	94	40.31	19.07	1.06	5.8	5	事故傷害	56	48.64	37.25	0.97	6.0	5	糖尿病	45	38.12	17.93	0.95	6.6
6	糖尿病	88	37.74	20.32	0.98	5.5	6	腦血管疾病	54	46.91	28.05	0.98	5.8	6	慢性下呼吸道疾病	34	28.80	11.99	1.29	5.0
7	事故傷害	73	31.31	21.99	0.88	4.5	7	糖尿病	43	37.35	23.09	1.04	4.6	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	32	27.11	12.65	1.09	4.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	63	27.02	14.30	1.08	3.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	31	26.93	16.27	1.07	3.3	8	高血壓性疾病	26	22.02	9.99	1.03	3.8
9	高血壓性疾病	45	19.30	9.79	0.90	2.8	9	敗血症	28	24.32	13.37	1.51*	3.0	9	事故傷害	17	14.40	7.67*-	0.71	2.5
10	敗血症	42	18.01	9.06	1.20	2.6	10	慢性肝病及肝硬化	22	19.11	13.58*-	0.62*	2.4	10	敗血症	14	11.86	5.67	0.85	2.1
	其他非十大死因	346	148.39	86.20*-	0.88*	21.5		其他非十大死因	187	162.44	108.08	0.90	20.2		其他非十大死因	156	132.15	61.94*-	0.93	22.9
11	慢性肝病及肝硬化	28	12.01	7.77*-	0.57*	1.7	11	高血壓性疾病	19	16.50	9.44	0.78	2.0	11	血管性及未明示之癱瘓症	11	9.32	3.25	1.40	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	23	9.86	7.90*-	0.64*	1.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	14	12.16	10.23	0.62	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	9	7.62	5.55	0.71	1.3
13	血管性及未明示之癱瘓症	16	6.86	2.83	1.25	1.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	8.69	6.16	1.47	1.1	13	慢性肝病及肝硬化	6	5.08	2.58*-	0.51	0.9
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	5.58	3.75	1.28	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	7.82	5.36	1.64	1.0	14	皮膚及皮下組織疾病	6	5.08	2.30	1.43	0.9
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	13	5.58	3.56	1.02	0.8	15	主動脈瘤及剝離	8	6.95	3.93	1.46	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	3.39	2.42	0.85	0.6

附 註：1.彰化縣彰化市年中人口數 計233,171人 男性115,122人 女性118,050人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	589	678.51	387.02*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	343	777.55	515.70	0.93	100.0		所有死亡原因	246	576.17	268.83	0.92	100.0
	十大主要死因	450	518.39	287.53	0.96	76.4		十大主要死因	268	607.53	398.37	0.95	78.1		十大主要死因	190	445.01	204.15	0.94	77.2
1	惡性腫瘤	165	190.07	112.60	0.92	28.0	1	惡性腫瘤	101	228.96	148.62	0.89	29.4	1	惡性腫瘤	64	149.90	82.33	0.99	26.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	66.81	38.32*-	0.75*	9.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	90.68	61.64	0.98	11.7	2	糖尿病	21	49.18	22.11	1.16	8.5
3	糖尿病	45	51.84	27.73	1.35	7.6	3	糖尿病	24	54.41	34.51	1.58*	7.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	42.16	16.35*-	0.49*	7.3
4	肺炎	36	41.47	18.75*-	0.72	6.1	4	慢性下呼吸道疾病	20	45.34	27.61	0.87	5.8	4	肺炎	18	42.16	15.55	0.86	7.3
5	慢性下呼吸道疾病	29	33.41	15.98	0.87	4.9	5	肺炎	18	40.80	23.86*-	0.63*	5.2	5	衰老/老邁	17	39.82	13.81*+	4.00*	6.9
6	腦血管疾病	27	31.10	16.78	0.74	4.6	6	蓄意自我傷害(自殺)	15	34.00	27.92	1.75	4.4	6	腦血管疾病	15	35.13	15.61	0.93	6.1
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	28.80	14.26	1.15	4.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	31.74	19.00	1.33	4.1	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.76	10.84	0.97	4.5
8	衰老/老邁	25	28.80	12.81*+	3.53*	4.2	8	高血壓性疾病	13	29.47	20.27	1.44	3.8	8	慢性下呼吸道疾病	9	21.08	7.44	0.87	3.7
9	高血壓性疾病	22	25.34	13.97	1.16	3.7	9	腦血管疾病	12	27.20	17.36*-	0.59	3.5	9	高血壓性疾病	9	21.08	7.26	0.90	3.7
10	蓄意自我傷害(自殺)	18	20.74	16.33	1.36	3.1	10	慢性肝病及肝硬化	11	24.94	17.57	0.82	3.2	10	事故傷害	8	18.74	12.85	0.92	3.3
	其他非十大死因	139	160.12	99.49*-	0.82*	23.6		其他非十大死因	75	170.02	117.33	0.85	21.9		其他非十大死因	56	131.16	64.68	0.84	22.8
11	事故傷害	18	20.74	15.49*-	0.59*	3.1	11	事故傷害	10	22.67	17.85*-	0.46*	2.9	11	敗血症	8	18.74	7.98	1.26	3.3
12	慢性肝病及肝硬化	17	19.58	13.13	0.95	2.9	12	敗血症	9	20.40	12.92	1.32	2.6	12	慢性肝病及肝硬化	6	14.05	8.56	1.41	2.4
13	敗血症	17	19.58	10.73	1.29	2.9	13	衰老/老邁	8	18.14	10.58	2.81*	2.3	13	蓄意自我傷害(自殺)	3	7.03	4.32	0.66	1.2
14	帕金森病	5	5.76	2.75	1.30	0.8	14	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	2	4.53	3.66	3.29	0.6	14	帕金森病	3	7.03	2.14	2.01	1.2
15	胃及十二指腸潰瘍	3	3.46	2.01	2.36	0.5	15	病毒性肝炎	2	4.53	3.44	2.13	0.6	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	4.68	3.37	7.66	0.8

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,808人 男性44,113人 女性42,696人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣和美鎮主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	569	626.07	395.43	0.92*	100.0		所有死亡原因	327	707.49	504.06*-	0.90	100.0		所有死亡原因	242	541.82	301.49	0.95	100.0
	十大主要死因	444	488.53	307.78	0.92	78.0		十大主要死因	260	562.53	397.70	0.89	79.5		十大主要死因	191	427.64	237.59	1.02	78.9
1	惡性腫瘤	170	187.05	126.24	0.96	29.9	1	惡性腫瘤	93	201.21	142.94*-	0.82	28.4	1	惡性腫瘤	77	172.40	111.61	1.21	31.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	55.02	32.66*-	0.67*	8.8	2	肺炎	27	58.42	38.16	1.01	8.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	53.73	26.42	0.70	9.9
3	肺炎	42	46.21	23.06	0.90	7.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	56.25	39.45*-	0.65*	8.0	3	糖尿病	21	47.02	23.55	1.23	8.7
4	糖尿病	41	45.11	26.93	1.28	7.2	4	慢性下呼吸道疾病	25	54.09	37.35	1.17	7.6	4	肺炎	15	33.58	12.86	0.76	6.2
5	事故傷害	34	37.41	29.33	1.10	6.0	5	事故傷害	24	51.93	41.45	1.08	7.3	5	腦血管疾病	14	31.35	15.31	0.91	5.8
6	腦血管疾病	33	36.31	21.33	0.94	5.8	6	糖尿病	20	43.27	29.49	1.35	6.1	6	事故傷害	10	22.39	17.46	1.16	4.1
7	慢性下呼吸道疾病	31	34.11	18.91	1.00	5.4	7	腦血管疾病	19	41.11	28.28	0.96	5.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	22.39	10.95	0.95	4.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	18.71	10.89	0.82	3.0	8	慢性肝病及肝硬化	11	23.80	17.06	0.78	3.4	8	敗血症	9	20.15	9.10	1.52	3.7
9	慢性肝病及肝硬化	13	14.30	9.88	0.71	2.3	9	高血壓性疾病	8	17.31	12.62	0.92	2.4	9	慢性下呼吸道疾病	6	13.43	5.43	0.62	2.5
10	高血壓性疾病	13	14.30	8.55	0.72	2.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	15.14	10.90	0.69	2.1	10	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.19	4.91	1.69	2.1
	其他非十大死因	125	137.54	87.66	0.91	22.0		其他非十大死因	67	144.96	106.36	0.92	20.5		其他非十大死因	51	114.19	63.90	0.75*	21.1
11	敗血症	11	12.10	6.24	0.88	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	6	12.98	9.23	0.66	1.8	11	高血壓性疾病	5	11.19	4.90	0.54	2.1
12	衰老/老邁	9	9.90	4.45	1.38	1.6	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.65	5.42	1.61	1.2	12	衰老/老邁	5	11.19	3.79	1.27	2.1
13	蓄意自我傷害(自殺)	8	8.80	6.38*-	0.58	1.4	13	衰老/老邁	4	8.65	5.38	1.54	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.96	6.02	1.90	1.7
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	8.80	5.33	1.75	1.4	14	帕金森病	3	6.49	4.13	1.39	0.9	14	帕金森病	3	6.72	3.92	2.12	1.2
15	帕金森病	6	6.60	3.91	1.68	1.1	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.49	4.01	1.51	0.9	15	源於周產期的特定病況	2	4.48	8.10	3.09	0.8

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,884人 男性46,220人 女性44,664人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣北斗鎮主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	261	782.89	406.89	0.98	100.0		所有死亡原因	142	845.64	518.56	0.92	100.0		所有死亡原因	119	719.21	305.63	1.06	100.0
	十大主要死因	204	611.91	306.67	0.98	78.2		十大主要死因	112	666.98	393.12	0.91	78.9		十大主要死因	95	574.16	239.23	1.11	79.8
1	惡性腫瘤	68	203.97	112.90	0.91	26.1	1	惡性腫瘤	45	267.98	162.40	0.95	31.7	1	惡性腫瘤	23	139.01	68.93	0.85	19.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	77.99	35.30*-	0.80	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	83.37	45.16	0.82	9.9	2	糖尿病	14	84.61	35.39	1.83*	11.8
3	糖尿病	19	56.99	26.77	1.35	7.3	3	慢性下呼吸道疾病	11	65.51	35.37	1.12	7.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	72.53	27.49	0.78	10.1
4	慢性下呼吸道疾病	17	50.99	22.20	1.20	6.5	4	高血壓性疾病	8	47.64	25.23	2.12	5.6	4	肺炎	8	48.35	17.17	0.91	6.7
5	高血壓性疾病	16	47.99	19.56	2.01*	6.1	5	肺炎	7	41.69	22.81	0.58	4.9	5	高血壓性疾病	8	48.35	15.19	1.92	6.7
6	肺炎	15	44.99	19.32	0.72	5.7	6	慢性肝病及肝硬化	6	35.73	23.88	1.11	4.2	6	腦血管疾病	7	42.31	18.02	1.03	5.9
7	腦血管疾病	13	38.99	20.79	0.85	5.0	7	腦血管疾病	6	35.73	23.06	0.71	4.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	42.31	15.04	1.47	5.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	38.99	17.90	1.41	5.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35.73	20.32	1.35	4.2	8	事故傷害	6	36.26	18.11	1.66	5.0
9	事故傷害	10	30.00	18.57	0.81	3.8	9	糖尿病	5	29.78	16.31	0.78	3.5	9	慢性下呼吸道疾病	6	36.26	12.46	1.37	5.0
10	慢性肝病及肝硬化	7	21.00	13.37	0.97	2.7	10	事故傷害	4	23.82	18.57*-	0.46	2.8	10	敗血症	4	24.18	11.44	1.50	3.4
	其他非十大死因	57	170.98	100.23	0.97	21.8		其他非十大死因	30	178.66	125.44	0.97	21.1		其他非十大死因	24	145.05	66.40	0.89	20.2
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	15.00	10.11	0.95	1.9	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.87	12.61	3.59	2.1	11	主動脈瘤及剝離	3	18.13	9.71	7.23*	2.5
12	敗血症	5	15.00	7.45	0.90	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.87	12.06	0.88	2.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.09	8.11	1.11	1.7
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	12.00	7.55	2.57	1.5	13	皮膚及皮下組織疾病	2	11.91	14.43	3.99	1.4	13	流行性感冒	1	6.04	3.29	3.28	0.8
14	主動脈瘤及剝離	4	12.00	6.20	3.14	1.5	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.96	11.01	4.61	0.7	14	病毒性肝炎	1	6.04	2.71	5.50	0.8
15	皮膚及皮下組織疾病	2	6.00	7.18	1.67	0.8	15	結核病	1	5.96	3.42	1.14	0.7	15	慢性肝病及肝硬化	1	6.04	2.71	0.56	0.8

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,338人 男性16,792人 女性16,546人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣員林市主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	873	699.74	409.45	0.97	100.0		所有死亡原因	487	785.71	517.66	0.93	100.0		所有死亡原因	386	614.85	311.92	1.04	100.0
	十大主要死因	702	562.68	327.57	1.01	80.4		十大主要死因	408	658.26	433.54	0.98	83.8		十大主要死因	306	487.42	240.89	1.09	79.3
1	惡性腫瘤	245	196.38	121.01	0.95	28.1	1	惡性腫瘤	151	243.62	160.96	0.93	31.0	1	惡性腫瘤	94	149.73	86.45	1.00	24.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	138	110.61	61.26*+	1.28*	15.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	67	108.10	70.26	1.16	13.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	71	113.09	50.45*+	1.44*	18.4
3	腦血管疾病	59	47.29	26.57	1.16	6.8	3	腦血管疾病	35	56.47	36.30	1.23	7.2	3	高血壓性疾病	25	39.82	16.71*+	1.89*	6.5
4	肺炎	51	40.88	21.34*-	0.76*	5.8	4	肺炎	31	50.01	31.10	0.79	6.4	4	腦血管疾病	24	38.23	18.06	1.09	6.2
5	慢性下呼吸道疾病	46	36.87	18.92	1.01	5.3	5	慢性下呼吸道疾病	27	43.56	26.86	0.85	5.5	5	糖尿病	22	35.04	14.38	0.88	5.7
6	糖尿病	41	32.86	16.74	0.87	4.7	6	慢性肝病及肝硬化	25	40.33	29.65	1.30	5.1	6	肺炎	20	31.86	14.18	0.72	5.2
7	高血壓性疾病	40	32.06	16.55*+	1.54*	4.6	7	事故傷害	21	33.88	23.83*-	0.68	4.3	7	慢性下呼吸道疾病	19	30.26	12.83	1.37	4.9
8	事故傷害	31	24.85	16.45*-	0.71	3.6	8	糖尿病	19	30.65	18.85	0.87	3.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	22.30	10.50	0.91	3.6
9	慢性肝病及肝硬化	27	21.64	15.02	1.04	3.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	17	27.43	20.29	1.39	3.5	9	事故傷害	10	15.93	9.71	0.79	2.6
10	蓄意自我傷害(自殺)	24	19.24	13.70	1.26	2.7	10	高血壓性疾病	15	24.20	15.44	1.19	3.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	7	11.15	7.62	1.05	1.8
	其他非十大死因	171	137.06	81.88*-	0.82*	19.6		其他非十大死因	79	127.46	84.12*-	0.74*	16.2		其他非十大死因	80	127.43	71.03	0.88	20.7
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	19.24	10.66	0.79	2.7	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	16.13	10.30	0.67	2.1	11	血管性及未明示之癱瘓症	5	7.96	3.07	1.21	1.3
12	敗血症	11	8.82	5.29	0.61	1.3	12	敗血症	9	14.52	9.67	0.95	1.8	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	6.37	4.36	1.30	1.0
13	血管性及未明示之癱瘓症	7	5.61	2.68	1.07	0.8	13	皮膚及皮下組織疾病	4	6.45	3.93	2.40	0.8	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	6.37	2.39	2.33	1.0
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	4.81	3.15	0.90	0.7	14	主動脈瘤及剝離	3	4.84	2.93	1.03	0.6	14	源於周產期的特定病況	3	4.78	10.28	3.92	0.8
15	皮膚及皮下組織疾病	6	4.81	2.63	1.55	0.7	15	病毒性肝炎	2	3.23	2.79	1.49	0.4	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	4.78	3.94	1.23	0.8

附 註：1.彰化縣員林市中人口數 計124,761人 男性61,982人 女性62,780人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	419	754.60	446.13	1.00	100.0		所有死亡原因	249	885.65	612.62	1.06	100.0		所有死亡原因	170	620.21	300.77	0.92	100.0
	十大主要死因	332	597.92	359.08	1.02	79.2		十大主要死因	205	729.15	503.13	1.09	82.3		十大主要死因	131	477.93	235.15	0.95	77.1
1	惡性腫瘤	124	223.32	137.13	1.07	29.6	1	惡性腫瘤	81	288.10	191.55	1.13	32.5	1	惡性腫瘤	43	156.88	91.08	1.01	25.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	104.46	60.49	1.13	13.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	96.03	68.46	1.04	10.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	113.10	50.58	1.22	18.2
3	腦血管疾病	28	50.43	31.76	1.17	6.7	3	腦血管疾病	17	60.47	41.98	1.33	6.8	3	腦血管疾病	11	40.13	22.82	0.99	6.5
4	事故傷害	21	37.82	28.85	1.07	5.0	4	肺炎	15	53.35	35.51	0.83	6.0	4	糖尿病	9	32.83	13.45	0.72	5.3
5	肺炎	21	37.82	19.47	0.63*	5.0	5	慢性下呼吸道疾病	15	53.35	31.60	1.04	6.0	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	29.19	15.10	1.03	4.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	36.02	24.42	1.38	4.8	6	事故傷害	14	49.80	41.17	1.02	5.6	6	事故傷害	7	25.54	16.14	1.22	4.1
7	慢性下呼吸道疾病	19	34.22	15.27	0.85	4.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	42.68	34.80	1.80	4.8	7	高血壓性疾病	7	25.54	9.53	0.99	4.1
8	糖尿病	15	27.01	13.52*-	0.68	3.6	8	慢性肝病及肝硬化	11	39.13	28.59	1.29	4.4	8	肺炎	6	21.89	6.06*-	0.40*	3.5
9	高血壓性疾病	14	25.21	12.60	1.10	3.3	9	高血壓性疾病	7	24.90	16.05	1.23	2.8	9	衰老/老邁	5	18.24	6.19	1.60	2.9
10	慢性肝病及肝硬化	12	21.61	15.56	1.05	2.9	10	糖尿病	6	21.34	13.42	0.62	2.4	10	慢性下呼吸道疾病	4	14.59	4.20*-	0.55	2.4
	其他非十大死因	87	156.68	87.06	0.93	20.8		其他非十大死因	44	156.50	109.49	0.93	17.7		其他非十大死因	39	142.28	65.62	0.84	22.9
11	衰老/老邁	10	18.01	8.52	2.05	2.4	11	衰老/老邁	5	17.78	11.95	2.81	2.0	11	敗血症	3	10.94	5.08	0.68	1.8
12	敗血症	7	12.61	5.84	0.80	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.23	9.27	0.73	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	7.30	7.21	0.69	1.2
13	蓄意自我傷害(自殺)	6	10.81	8.09	0.71	1.4	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	14.23	8.09	2.48	1.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.30	5.22	1.74	1.2
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	10.81	5.45	1.90	1.4	14	敗血症	4	14.23	8.02	0.93	1.6	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	7.30	4.28	1.30	1.2
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	5.40	3.31	1.23	0.7	15	主動脈瘤及剝離	2	7.11	4.70	1.56	0.8	15	帕金森病	2	7.30	3.41	1.93	1.2

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,526人 男性28,115人 女性27,410人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田中鎮主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	447	1,071.53	487.17*+	1.12*	100.0		所有死亡原因	279	1,298.22	665.75*+	1.12	100.0		所有死亡原因	168	830.70	305.54	1.07	100.0
	十大主要死因	370	886.95	399.05*+	1.20*	82.8		十大主要死因	232	1,079.52	545.69*+	1.18*	83.2		十大主要死因	144	712.03	264.71	1.21*	85.7
1	惡性腫瘤	109	261.29	127.93	1.03	24.4	1	惡性腫瘤	76	353.64	185.65	1.06	27.2	1	惡性腫瘤	33	163.17	69.99	0.90	19.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52	124.65	53.14	1.05	11.6	2	肺炎	30	139.59	54.12	1.34	10.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	113.73	35.83	1.06	13.7
3	慢性下呼吸道疾病	41	98.28	39.37*+	1.82*	9.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	134.94	69.40	1.05	10.4	3	糖尿病	17	84.06	31.40	1.58	10.1
4	肺炎	41	98.28	35.09	1.22	9.2	4	慢性下呼吸道疾病	26	120.98	52.01*+	1.45	9.3	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	74.17	29.05*+	2.24*	8.9
5	糖尿病	31	74.31	34.16*+	1.45	6.9	5	慢性肝病及肝硬化	16	74.45	48.95*+	2.12*	5.7	5	慢性下呼吸道疾病	15	74.17	28.01*+	2.40*	8.9
6	腦血管疾病	24	57.53	24.85	1.04	5.4	6	事故傷害	15	69.80	40.37	1.19	5.4	6	肺炎	11	54.39	17.68	0.87	6.5
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	50.34	19.42	1.48	4.7	7	糖尿病	14	65.14	36.17	1.37	5.0	7	腦血管疾病	10	49.45	19.98	1.06	6.0
8	事故傷害	20	47.94	26.25	1.17	4.5	8	腦血管疾病	14	65.14	30.00	1.00	5.0	8	高血壓性疾病	9	44.50	12.54	1.51	5.4
9	慢性肝病及肝硬化	18	43.15	27.66	1.82*	4.0	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	27.92	19.54	1.27	2.2	9	敗血症	6	29.67	8.80	1.59	3.6
10	高血壓性疾病	13	31.16	11.17	1.04	2.9	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	27.92	9.48	0.78	2.2	10	事故傷害	5	24.72	11.43	1.04	3.0
	其他非十大死因	77	184.58	88.12	0.86	17.2		其他非十大死因	47	218.70	120.06	0.90	16.8		其他非十大死因	24	118.67	40.83*-	0.64*	14.3
11	敗血症	9	21.57	8.11	1.05	2.0	11	帕金森病	5	23.27	12.08	3.00	1.8	11	衰老/老邁	4	19.78	5.02	1.53	2.4
12	蓄意自我傷害(自殺)	7	16.78	11.38	1.01	1.6	12	高血壓性疾病	4	18.61	9.39	0.62	1.4	12	慢性肝病及肝硬化	2	9.89	5.44	0.82	1.2
13	衰老/老邁	6	14.38	4.14	1.19	1.3	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	18.61	7.68	2.29	1.4	13	流行性感冒	1	4.94	2.62	2.38	0.6
14	帕金森病	5	11.99	5.88	2.01	1.1	14	敗血症	3	13.96	7.06	0.60	1.1	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	4.94	2.62*-	0.44	0.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	9.59	3.80	1.32	0.9	15	主動脈瘤及剝離	2	9.31	4.72	1.52	0.7	15	阿茲海默病	1	4.94	1.13	4.64	0.6

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計41,716人 男性21,491人 女性20,224人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二林鎮主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	518	1,020.53	436.99	1.02	100.0		所有死亡原因	306	1,172.05	618.15	1.09	100.0		所有死亡原因	212	860.04	259.59	0.93	100.0
	十大主要死因	407	801.84	355.70	1.03	78.6		十大主要死因	252	965.22	516.72*+	1.12	82.4		十大主要死因	162	657.20	203.22	1.00	76.4
1	惡性腫瘤	166	327.04	159.49*+	1.24*	32.0	1	惡性腫瘤	114	436.65	232.18*+	1.35*	37.3	1	惡性腫瘤	52	210.95	87.60	1.04	24.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	72	141.85	55.58	1.14	13.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	149.38	78.84	1.25	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	133.87	32.17	1.01	15.6
3	肺炎	43	84.72	24.73	0.99	8.3	3	肺炎	24	91.93	37.19	1.02	7.8	3	肺炎	19	77.08	16.02	0.98	9.0
4	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	41.37	15.55	1.15	4.1	4	事故傷害	17	65.11	54.93	1.14	5.6	4	糖尿病	12	48.68	14.66	0.76	5.7
5	腦血管疾病	20	39.40	15.93	0.68	3.9	5	慢性肝病及肝硬化	13	49.79	33.39	1.42	4.2	5	腦血管疾病	12	48.68	14.26	0.87	5.7
6	糖尿病	19	37.43	13.77*-	0.69	3.7	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	42.13	19.15	1.32	3.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	40.57	12.54	1.01	4.7
7	事故傷害	18	35.46	29.22	0.84	3.5	7	高血壓性疾病	10	38.30	18.44	1.41	3.3	7	高血壓性疾病	8	32.45	6.04	0.88	3.8
8	高血壓性疾病	18	35.46	12.21	1.12	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	9	34.47	13.84*-	0.47*	2.9	8	敗血症	7	28.40	6.42	1.24	3.3
9	慢性肝病及肝硬化	17	33.49	21.87	1.37	3.3	9	腦血管疾病	8	30.64	16.42*-	0.51	2.6	9	血管性及未明示之癱呆症	5	20.28	4.28	1.68	2.4
10	慢性下呼吸道疾病	13	25.61	7.36*-	0.44*	2.5	10	糖尿病	7	26.81	12.34*-	0.60	2.3	10	慢性肝病及肝硬化	4	16.23	9.23	1.17	1.9
	其他非十大死因	111	218.68	81.29	0.97	21.4		其他非十大死因	54	206.83	101.43	0.95	17.6		其他非十大死因	50	202.84	56.37*-	0.77	23.6
11	敗血症	10	19.70	5.96	0.90	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	11.49	8.98	0.53	1.0	11	慢性下呼吸道疾病	4	16.23	2.86*-	0.42	1.9
12	血管性及未明示之癱呆症	8	15.76	4.24	1.81	1.5	12	敗血症	3	11.49	4.85	0.55	1.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.17	5.15	1.06	1.4
13	蓄意自我傷害(自殺)	6	11.82	7.26	0.71	1.2	13	血管性及未明示之癱呆症	3	11.49	4.34	2.04	1.0	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.11	1.43	1.44	0.9
14	皮膚及皮下組織疾病	4	7.88	3.71	1.64	0.8	14	病毒性肝炎	2	7.66	5.65	3.05	0.7	14	皮膚及皮下組織疾病	2	8.11	1.43	1.32	0.9
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	7.88	2.34	1.02	0.8	15	皮膚及皮下組織疾病	2	7.66	5.57	2.13	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.11	1.43	1.03	0.9

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計50,758人 男性26,108人 女性24,650人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣線西鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	139	822.78	440.73	1.06	100.0		所有死亡原因	83	957.77	570.16	1.05	100.0		所有死亡原因	56	680.60	310.80	1.05	100.0
	十大主要死因	117	692.55	370.68	1.21	84.2		十大主要死因	69	796.22	477.56	1.18	83.1		十大主要死因	50	607.68	285.69	1.45*	89.3
1	惡性腫瘤	45	266.37	160.91	1.24	32.4	1	惡性腫瘤	29	334.64	209.85	1.21	34.9	1	惡性腫瘤	16	194.46	113.06	1.26	28.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	147.98	68.03	1.56*	18.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	138.47	80.51	1.37	14.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	158.00	50.77	1.78	23.2
3	腦血管疾病	8	47.35	25.74	1.06	5.8	3	肺炎	7	80.78	44.61	1.10	8.4	3	糖尿病	5	60.77	21.80	1.39	8.9
4	糖尿病	8	47.35	22.97	1.17	5.8	4	腦血管疾病	4	46.16	28.70	0.92	4.8	4	腦血管疾病	4	48.61	21.92	1.24	7.1
5	肺炎	7	41.43	21.32	0.67	5.0	5	高血壓性疾病	4	46.16	25.76	2.03	4.8	5	高血壓性疾病	3	36.46	15.88	1.50	5.4
6	高血壓性疾病	7	41.43	20.51	1.77	5.0	6	糖尿病	3	34.62	21.21	0.92	3.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	36.46	11.29	1.35	5.4
7	事故傷害	5	29.60	13.72	0.82	3.6	7	事故傷害	3	34.62	20.80	0.67	3.6	7	慢性肝病及肝硬化	2	24.31	7.78	2.42	3.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	29.60	12.60	1.11	3.6	8	敗血症	3	34.62	18.81	2.01	3.6	8	事故傷害	2	24.31	7.02	1.18	3.6
9	敗血症	4	23.68	12.32	1.47	2.9	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	23.08	14.26	1.12	2.4	9	先天性畸形變形及染色體異常	1	12.15	24.82	12.10	1.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.76	12.56	1.13	2.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	23.08	13.07	0.87	2.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.15	11.35	1.13	1.8
	其他非十大死因	22	130.22	70.06*-	0.64*	15.8		其他非十大死因	14	161.55	92.60*-	0.68	16.9		其他非十大死因	6	72.92	25.11*-	0.32*	10.7
11	慢性肝病及肝硬化	3	17.76	9.80	0.84	2.2	11	慢性下呼吸道疾病	2	23.08	12.22*-	0.39	2.4	11	敗血症	1	12.15	7.57	0.79	1.8
12	慢性下呼吸道疾病	2	11.84	5.97*-	0.29	1.4	12	慢性肝病及肝硬化	1	11.54	10.53	0.36	1.2	12	膽結石及其他膽囊疾患	1	12.15	3.51	8.23	1.8
13	衰老/老邁	2	11.84	4.21	1.33	1.4	13	主動脈瘤及剝離	1	11.54	6.94	2.37	1.2	13	衰老/老邁	1	12.15	3.51	1.17	1.8
14	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.92	11.59	5.16	0.7	14	胃及十二指腸潰瘍	1	11.54	5.26	6.20	1.2							
15	主動脈瘤及剝離	1	5.92	3.32	1.66	0.7	15	病毒性肝炎	1	11.54	5.26	5.20	1.2							

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,894人 男性8,666人 女性8,228人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣伸港鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	266	718.16	440.30	1.04	100.0		所有死亡原因	155	819.85	577.91	1.03	100.0		所有死亡原因	111	612.11	320.21	1.06	100.0
	十大主要死因	222	599.37	368.12	1.13	83.5		十大主要死因	132	698.19	485.59	1.11	85.2		十大主要死因	92	507.33	274.46	1.21	82.9
1	惡性腫瘤	79	213.29	139.20	1.10	29.7	1	惡性腫瘤	47	248.60	173.29	1.02	30.3	1	惡性腫瘤	32	176.46	110.99	1.24	28.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	94.49	58.35	1.13	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	105.79	72.26	1.20	12.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	82.72	46.50	1.06	13.5
3	腦血管疾病	19	51.30	31.49	1.31	7.1	3	慢性下呼吸道疾病	13	68.76	44.48	1.43	8.4	3	腦血管疾病	8	44.12	20.32	1.27	7.2
4	肺炎	19	51.30	26.54	0.97	7.1	4	腦血管疾病	11	58.18	42.70	1.35	7.1	4	糖尿病	8	44.12	20.15	1.13	7.2
5	慢性下呼吸道疾病	16	43.20	24.42	1.22	6.0	5	肺炎	11	58.18	40.68	0.97	7.1	5	肺炎	8	44.12	15.42	0.98	7.2
6	糖尿病	14	37.80	20.70	1.06	5.3	6	事故傷害	7	37.03	26.98	0.77	4.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	38.60	13.52	1.61	6.3
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	37.80	19.29	1.63	5.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	37.03	24.36	1.66	4.5	7	事故傷害	5	27.57	21.49	1.42	4.5
8	事故傷害	12	32.40	23.98	0.96	4.5	8	敗血症	6	31.74	22.58	2.21	3.9	8	慢性下呼吸道疾病	3	16.54	9.91	0.75	2.7
9	慢性肝病及肝硬化	7	18.90	12.88	0.95	2.6	9	糖尿病	6	31.74	21.19	0.98	3.9	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	16.54	8.41	3.42	2.7
10	敗血症	7	18.90	11.27	1.35	2.6	10	慢性肝病及肝硬化	4	21.16	17.07	0.71	2.6	10	慢性肝病及肝硬化	3	16.54	7.74	1.78	2.7
	其他非十大死因	44	118.79	72.18*-	0.74	16.5		其他非十大死因	23	121.65	92.32	0.74	14.8		其他非十大死因	19	104.78	45.74*-	0.65	17.1
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	16.20	10.28	1.07	2.3	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	21.16	14.95	1.09	2.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.03	6.06	1.03	1.8
12	高血壓性疾病	5	13.50	7.09	0.67	1.9	12	高血壓性疾病	3	15.87	10.67	0.83	1.9	12	帕金森病	2	11.03	3.79	3.44	1.8
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	8.10	4.60	1.57	1.1	13	源於周產期的特定病況	1	5.29	9.55	3.89	0.6	13	衰老/老邁	2	11.03	3.79	1.24	1.8
14	衰老/老邁	3	8.10	3.51	1.09	1.1	14	流行性感胃	1	5.29	4.64	2.69	0.6	14	高血壓性疾病	2	11.03	3.79	0.52	1.8
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.40	3.69	1.33	0.8	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.29	3.35	6.27	0.6	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.51	4.51	1.43	0.9

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,039人 男性18,906人 女性18,134人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣福興鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	356	754.30	398.71	0.92	100.0		所有死亡原因	203	825.54	505.40	0.91	100.0		所有死亡原因	153	676.84	298.41	0.94	100.0
	十大主要死因	276	584.80	307.14	0.95	77.5		十大主要死因	161	654.74	394.10	0.93	79.3		十大主要死因	120	530.86	243.45	1.04	78.4
1	惡性腫瘤	100	211.88	123.89	0.96	28.1	1	惡性腫瘤	60	244.00	150.78	0.89	29.6	1	惡性腫瘤	40	176.95	100.84	1.07	26.1
2	衰老/老邁	32	67.80	25.75*+	6.99*	9.0	2	事故傷害	18	73.20	51.88	1.42	8.9	2	衰老/老邁	19	84.05	26.66*+	6.86*	12.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	61.45	30.03*-	0.61*	8.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	61.00	37.78*-	0.61	7.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	61.93	20.50*-	0.61	9.2
4	事故傷害	27	57.21	39.11	1.54*	7.6	4	肺炎	13	52.87	26.24	0.73	6.4	4	肺炎	10	44.24	12.91	0.74	6.5
5	肺炎	23	48.73	18.32*-	0.73	6.5	5	衰老/老邁	13	52.87	25.51*+	7.18*	6.4	5	事故傷害	9	39.81	26.07	1.81	5.9
6	糖尿病	18	38.14	21.60	0.89	5.1	6	慢性下呼吸道疾病	10	40.67	22.58	0.70	4.9	6	糖尿病	9	39.81	17.73	0.81	5.9
7	腦血管疾病	17	36.02	15.38	0.77	4.8	7	腦血管疾病	10	40.67	21.79	0.81	4.9	7	腦血管疾病	7	30.97	11.12	0.71	4.6
8	慢性下呼吸道疾病	14	29.66	14.17	0.67	3.9	8	糖尿病	9	36.60	24.02	0.98	4.4	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.70	12.60	1.62	2.6
9	高血壓性疾病	9	19.07	8.76	0.76	2.5	9	慢性肝病及肝硬化	7	28.47	19.51	0.89	3.4	9	慢性下呼吸道疾病	4	17.70	7.81	0.61	2.6
10	慢性肝病及肝硬化	7	14.83	10.13	0.69	2.0	10	高血壓性疾病	6	24.40	14.02	1.09	3.0	10	敗血症	4	17.70	7.21	1.02	2.6
	其他非十大死因	80	169.51	91.58	0.84	22.5		其他非十大死因	42	170.80	111.30	0.84	20.7		其他非十大死因	33	145.99	54.96*-	0.69*	21.6
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	14.83	7.23*-	0.52	2.0	11	主動脈瘤及剝離	3	12.20	8.16	2.50	1.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.70	6.79	0.58	2.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	12.71	10.12	0.80	1.7	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	12.20	7.47	0.47	1.5	12	高血壓性疾病	3	13.27	3.96*-	0.48	2.0
13	敗血症	6	12.71	5.41	0.74	1.7	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	8.13	7.75	0.40	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.27	3.57	1.47	2.0
14	主動脈瘤及剝離	4	8.48	4.77	2.26	1.1	14	帕金森病	2	8.13	5.38	1.40	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	4.42	2.81	0.98	0.7
15	帕金森病	3	6.36	3.22	1.27	0.8	15	胃及十二指腸潰瘍	2	8.13	4.90	4.44	1.0	15	主動脈瘤及剝離	1	4.42	1.45	1.72	0.7

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,196人 男性24,590人 女性22,605人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。 $\text{標準化死亡比} = \frac{\text{實際死亡數}}{\text{期望死亡數}}$ 。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣秀水鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	281	714.58	409.31	0.98	100.0		所有死亡原因	157	773.70	528.27	0.93	100.0		所有死亡原因	124	651.53	293.96	1.03	100.0
	十大主要死因	226	574.71	327.10	1.02	80.4		十大主要死因	129	635.72	424.25	1.01	82.2		十大主要死因	98	514.92	238.98	1.11	79.0
1	惡性腫瘤	78	198.35	118.02	0.97	27.8	1	惡性腫瘤	53	261.19	171.12	1.02	33.8	1	惡性腫瘤	25	131.36	68.39	0.87	20.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	104.26	56.28	1.18	14.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	88.70	62.41	0.97	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	120.85	44.53	1.40	18.5
3	肺炎	28	71.20	33.95	1.25	10.0	3	肺炎	14	68.99	41.03	1.10	8.9	3	肺炎	14	73.56	28.16	1.46	11.3
4	慢性下呼吸道疾病	17	43.23	22.03	1.13	6.0	4	腦血管疾病	11	54.21	41.26	1.20	7.0	4	事故傷害	9	47.29	34.18	2.34*	7.3
5	事故傷害	16	40.69	28.79	1.16	5.7	5	慢性下呼吸道疾病	11	54.21	35.10	1.08	7.0	5	敗血症	6	31.53	15.50	2.11	4.8
6	腦血管疾病	15	38.14	24.84	0.91	5.3	6	事故傷害	7	34.50	23.40	0.71	4.5	6	慢性下呼吸道疾病	6	31.53	11.59	1.28	4.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	25.43	12.46	1.03	3.6	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	29.57	18.18	1.27	3.8	7	慢性肝病及肝硬化	4	21.02	11.78	2.15	3.2
8	敗血症	9	22.89	12.82	1.52	3.2	8	慢性肝病及肝硬化	4	19.71	14.79	0.64	2.5	8	腦血管疾病	4	21.02	9.99	0.55	3.2
9	慢性肝病及肝硬化	8	20.34	13.16	0.99	2.8	9	敗血症	3	14.78	10.15	0.97	1.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	21.02	8.62	0.80	3.2
10	糖尿病	4	10.17	4.75*-	0.27*	1.4	10	帕金森病	2	9.86	6.80	1.90	1.3	10	糖尿病	3	15.76	6.26*-	0.37	2.4
	其他非十大死因	55	139.86	82.21	0.83	19.6		其他非十大死因	28	137.99	104.02	0.69*	17.8		其他非十大死因	26	136.61	54.98	0.82	21.0
11	高血壓性疾病	4	10.17	4.55*-	0.47	1.4	11	皮膚及皮下組織疾病	2	9.86	5.97	3.71	1.3	11	高血壓性疾病	3	15.76	5.84	0.66	2.4
12	蓄意自我傷害(自殺)	2	5.09	4.44*-	0.33	0.7	12	源於周產期的特定病況	1	4.93	9.89	4.02	0.6	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.51	3.06	2.00	1.6
13	帕金森病	2	5.09	3.26	1.17	0.7	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.93	4.86	4.02	0.6	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.25	5.65	0.50	0.8
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.09	3.25	1.18	0.7	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	4.93	4.44	1.93	0.6	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.25	3.53	1.32	0.8
15	膽結石及其他膽囊疾患	2	5.09	2.73	4.27	0.7	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	4.93	3.57*-	0.25	0.6	15	流行性感冒	1	5.25	3.26	3.05	0.8

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,324人 男性20,292人 女性19,032人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣花壇鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	334	727.86	421.84	0.99	100.0		所有死亡原因	186	790.48	526.75	0.92	100.0		所有死亡原因	148	661.96	316.60	1.08	100.0
	十大主要死因	260	566.60	329.41	1.01	77.8		十大主要死因	153	650.23	433.49	0.96	82.3		十大主要死因	111	496.47	233.61	1.10	75.0
1	惡性腫瘤	87	189.59	119.01	0.91	26.0	1	惡性腫瘤	53	225.24	155.38	0.86	28.5	1	惡性腫瘤	34	152.07	83.67	1.00	23.0
2	肺炎	40	87.17	42.20*+	1.55*	12.0	2	肺炎	22	93.50	55.47	1.43	11.8	2	肺炎	18	80.51	30.92	1.70*	12.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	54.48	30.17*-	0.61*	7.5	3	事故傷害	17	72.25	49.87	1.43	9.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	53.67	25.71	0.65	8.1
4	糖尿病	23	50.12	30.17	1.31	6.9	4	慢性下呼吸道疾病	13	55.25	35.90	1.06	7.0	4	糖尿病	12	53.67	24.15	1.30	8.1
5	事故傷害	20	43.58	28.55	1.22	6.0	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	55.25	35.14*-	0.58*	7.0	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	35.78	18.58	1.41	5.4
6	慢性下呼吸道疾病	19	41.41	22.63	1.10	5.7	6	糖尿病	11	46.75	33.49	1.33	5.9	6	腦血管疾病	7	31.31	13.30	0.85	4.7
7	腦血管疾病	18	39.23	20.68	0.94	5.4	7	腦血管疾病	11	46.75	28.98	1.00	5.9	7	慢性下呼吸道疾病	6	26.84	11.58	1.16	4.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	23.97	13.47	0.97	3.3	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	21.25	16.61	1.04	2.7	8	敗血症	6	26.84	11.29	1.88	4.1
9	敗血症	10	21.79	11.32	1.46	3.0	9	慢性肝病及肝硬化	4	17.00	11.67	0.53	2.2	9	高血壓性疾病	4	17.89	8.27	0.80	2.7
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	15.25	11.22	0.97	2.1	10	敗血症	4	17.00	10.98	1.09	2.2	10	血管性及未明示之癱瘓症	4	17.89	6.13	2.51	2.7
	其他非十大死因	74	161.26	92.43	0.93	22.2		其他非十大死因	33	140.25	93.26	0.77	17.7		其他非十大死因	37	165.49	82.99	1.03	25.0
11	高血壓性疾病	7	15.25	7.30	0.71	2.1	11	病毒性肝炎	3	12.75	9.19	5.66*	1.6	11	事故傷害	3	13.42	8.30	0.65	2.0
12	慢性肝病及肝硬化	6	13.08	8.39	0.62	1.8	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	12.75	7.41	0.52	1.6	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	13.42	5.27	4.54	2.0
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	8.72	4.39	3.17	1.2	13	高血壓性疾病	3	12.75	7.03	0.61	1.6	13	衰老/老邁	3	13.42	4.20	1.41	2.0
14	血管性及未明示之癱瘓症	4	8.72	3.68	1.57	1.2	14	帕金森病	2	8.50	5.38	1.64	1.1	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	8.95	6.21	0.82	1.4
15	病毒性肝炎	3	6.54	4.59	4.06	0.9	15	主動脈瘤及剝離	2	8.50	5.31	1.81	1.1	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.95	5.80	1.77	1.4

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,888人 男性23,530人 女性22,358人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芬園鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	266	1,123.83	486.59	1.11	100.0		所有死亡原因	162	1,302.04	642.38	1.15	100.0		所有死亡原因	104	926.26	330.08	1.01	100.0
	十大主要死因	209	883.01	391.40*+	1.15*	78.6		十大主要死因	133	1,068.96	535.44	1.20*	82.1		十大主要死因	80	712.50	239.04	1.10	76.9
1	惡性腫瘤	69	291.52	154.57	1.11	25.9	1	惡性腫瘤	47	377.75	215.32	1.13	29.0	1	惡性腫瘤	22	195.94	88.40	1.00	21.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	147.87	53.15	1.17	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	152.71	66.09	1.23	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	142.50	40.44	1.09	15.4
3	肺炎	20	84.50	28.11	0.96	7.5	3	肺炎	12	96.45	40.27	0.99	7.4	3	糖尿病	9	80.16	17.25	1.27	8.7
4	糖尿病	17	71.82	22.45	1.32	6.4	4	事故傷害	11	88.41	44.08	1.51	6.8	4	肺炎	8	71.25	17.21	0.90	7.7
5	事故傷害	15	63.37	35.09	1.50	5.6	5	高血壓性疾病	9	72.34	29.01	2.50*	5.6	5	慢性下呼吸道疾病	5	44.53	12.55	1.16	4.8
6	高血壓性疾病	14	59.15	18.90	1.81	5.3	6	慢性下呼吸道疾病	9	72.34	25.19	0.92	5.6	6	高血壓性疾病	5	44.53	9.35	1.20	4.8
7	慢性下呼吸道疾病	14	59.15	16.98	1.01	5.3	7	糖尿病	8	64.30	26.49	1.37	4.9	7	事故傷害	4	35.63	26.15	1.38	3.8
8	腦血管疾病	10	42.25	16.79	0.72	3.8	8	慢性肝病及肝硬化	7	56.26	35.75	1.56	4.3	8	腦血管疾病	4	35.63	11.01	0.64	3.8
9	慢性肝病及肝硬化	8	33.80	20.57	1.38	3.0	9	腦血管疾病	6	48.22	23.09	0.76	3.7	9	血管性及未明示之癱瘓症	4	35.63	10.25	2.85	3.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	29.57	24.78	1.75	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	40.19	30.14	1.80	3.1	10	皮膚及皮下組織疾病	3	26.72	6.43	4.32	2.9
	其他非十大死因	57	240.82	95.19	0.97	21.4		其他非十大死因	29	233.08	106.94	0.97	17.9		其他非十大死因	24	213.75	91.04	0.80	23.1
11	血管性及未明示之癱瘓症	6	25.35	7.84	2.77*	2.3	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	40.19	14.39	1.18	3.1	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	17.81	18.52	1.54	1.9
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	25.35	6.93*-	0.69	2.3	12	敗血症	3	24.11	13.97	1.09	1.9	12	敗血症	2	17.81	8.96	0.79	1.9
13	敗血症	5	21.12	11.66	0.95	1.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	16.07	6.13	2.01	1.2	13	主動脈瘤及剝離	1	8.91	5.46	2.85	1.0
14	皮膚及皮下組織疾病	4	16.90	4.59	3.37	1.5	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	16.07	5.60	2.61	1.2	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	8.91	4.92	13.63	1.0
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	12.67	3.27	2.20	1.1	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	16.07	5.60	2.59	1.2	15	慢性肝病及肝硬化	1	8.91	2.62	0.68	1.0

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,669人 男性12,442人 女性11,228人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大村鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	259	701.54	398.32	0.91	100.0		所有死亡原因	154	807.64	541.07	0.95	100.0		所有死亡原因	105	588.20	267.21	0.87	100.0
	十大主要死因	181	490.26	271.04*-	0.83*	69.9		十大主要死因	108	566.39	372.51	0.87	70.1		十大主要死因	74	414.54	196.05	0.89	70.5
1	惡性腫瘤	67	181.48	106.03	0.85	25.9	1	惡性腫瘤	37	194.04	124.89*-	0.74	24.0	1	惡性腫瘤	30	168.06	88.64	1.06	28.6
2	肺炎	29	78.55	35.98	1.31	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	73.42	48.79	0.78	9.1	2	肺炎	15	84.03	25.98	1.55	14.3
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	65.01	34.72*-	0.70	9.3	3	肺炎	14	73.42	45.50	1.13	9.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	56.02	21.29*-	0.61	9.5
4	事故傷害	12	32.50	22.86	0.90	4.6	4	事故傷害	10	52.44	38.33	1.04	6.5	4	腦血管疾病	5	28.01	7.97*-	0.69	4.8
5	糖尿病	9	24.38	17.93	0.61	3.5	5	慢性肝病及肝硬化	6	31.47	24.03	0.99	3.9	5	慢性下呼吸道疾病	4	22.41	5.94	0.85	3.8
6	腦血管疾病	9	24.38	11.26*-	0.56	3.5	6	糖尿病	6	31.47	23.54	0.90	3.9	6	糖尿病	3	16.81	12.80	0.37	2.9
7	慢性下呼吸道疾病	9	24.38	8.98*-	0.61	3.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31.47	19.09	1.31	3.9	7	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.20	10.70	1.01	1.9
8	敗血症	8	21.67	9.84	1.37	3.1	8	敗血症	6	31.47	17.56	2.03	3.9	8	事故傷害	2	11.20	6.63	0.53	1.9
9	慢性肝病及肝硬化	7	18.96	13.14	0.89	2.7	9	慢性下呼吸道疾病	5	26.22	14.25*-	0.51	3.2	9	敗血症	2	11.20	5.48	0.70	1.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	18.96	10.31	0.73	2.7	10	高血壓性疾病	4	20.98	16.53	1.01	2.6	10	源於周產期的特定病況	1	5.60	10.62	4.04	1.0
	其他非十大死因	78	211.27	127.28	1.19	30.1		其他非十大死因	46	241.24	168.56	1.19	29.9		其他非十大死因	31	173.66	71.17	0.85	29.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	13.54	11.85	0.85	1.9	11	腦血管疾病	4	20.98	14.14*-	0.45	2.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	5.60	4.79	0.20	1.0
12	高血壓性疾病	5	13.54	9.08	0.59	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.73	12.93	0.77	1.9	12	胃及十二指腸潰瘍	1	5.60	4.67	4.20	1.0
13	源於周產期的特定病況	2	5.42	9.46	3.73	0.8	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.49	8.27	2.25	1.3	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.60	2.03	3.66	1.0
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.42	3.96	1.21	0.8	14	結核病	2	10.49	5.88	2.27	1.3	14	帕金森病	1	5.60	1.49	1.48	1.0
15	血管性及未明示之癱瘓症	2	5.42	2.68	0.90	0.8	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	10.49	5.81	4.13	1.3	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.60	1.49	0.68	1.0

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,919人 男性19,068人 女性17,851人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	320	983.89	417.78	1.00	100.0		所有死亡原因	186	1,087.53	550.00	1.01	100.0		所有死亡原因	134	869.00	288.62	0.96	100.0
	十大主要死因	257	790.19	346.52	1.03	80.3		十大主要死因	155	906.27	465.32	1.06	83.3		十大主要死因	105	680.93	234.17	1.04	78.4
1	惡性腫瘤	84	258.27	126.88	1.01	26.3	1	惡性腫瘤	56	327.43	170.82	1.03	30.1	1	惡性腫瘤	28	181.58	84.06	0.93	20.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	129.14	57.06	1.05	13.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	134.48	74.38	1.13	12.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	123.22	37.83	0.95	14.2
3	腦血管疾病	31	95.31	37.84*+	1.67*	9.7	3	慢性下呼吸道疾病	15	87.70	38.74	1.19	8.1	3	腦血管疾病	17	110.25	36.42	2.00*	12.7
4	肺炎	22	67.64	23.54	0.79	6.9	4	腦血管疾病	14	81.86	38.85	1.37	7.5	4	肺炎	9	58.37	15.83	0.74	6.7
5	慢性下呼吸道疾病	17	52.27	19.02	0.92	5.3	5	肺炎	13	76.01	33.24	0.83	7.0	5	高血壓性疾病	8	51.88	10.87	1.41	6.0
6	糖尿病	15	46.12	16.74	0.87	4.7	6	事故傷害	8	46.78	23.42	0.82	4.3	6	糖尿病	7	45.40	11.12	0.72	5.2
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	39.97	14.24	1.13	4.1	7	糖尿病	8	46.78	21.43	1.05	4.3	7	慢性肝病及肝硬化	5	32.43	14.07	2.47	3.7
8	慢性肝病及肝硬化	12	36.90	24.64	1.55	3.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	46.78	20.19	1.46	4.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	32.43	9.55	0.82	3.7
9	事故傷害	11	33.82	16.02	0.81	3.4	9	慢性肝病及肝硬化	7	40.93	33.32	1.17	3.8	9	衰老/老邁	4	25.94	4.42	1.56	3.0
10	高血壓性疾病	10	30.75	10.53	0.98	3.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.54	10.93	0.80	1.6	10	事故傷害	3	19.46	10.00	0.76	2.2
	其他非十大死因	63	193.70	71.26*-	0.87	19.7		其他非十大死因	31	181.25	84.67	0.81	16.7		其他非十大死因	29	188.07	54.45*-	0.74	21.6
11	衰老/老邁	7	21.52	5.08	1.68	2.2	11	敗血症	3	17.54	9.23	0.84	1.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	19.46	8.20	1.59	2.2
12	敗血症	6	18.45	7.38	0.85	1.9	12	衰老/老邁	3	17.54	6.34	1.84	1.6	12	敗血症	3	19.46	5.31	0.87	2.2
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	12.30	6.56	0.74	1.3	13	高血壓性疾病	2	11.69	7.49	0.43	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.97	3.53	1.68	1.5
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.30	4.61	1.62	1.3	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.69	6.01	2.01	1.1	14	慢性下呼吸道疾病	2	12.97	3.53*-	0.34	1.5
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	9.22	4.13	1.06	0.9	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.69	5.58	1.54	1.1	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.49	1.78	3.01	0.7

附 註：1.彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,524人 男性17,103人 女性15,420人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣埔心鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	306	879.56	483.44	1.12	100.0		所有死亡原因	166	926.80	575.99	1.03	100.0		所有死亡原因	140	829.38	393.03*+	1.23*	100.0
	十大主要死因	229	658.24	374.32	1.09	74.8		十大主要死因	138	770.48	480.81	1.15	83.1		十大主要死因	96	568.72	280.55	1.17	68.6
1	惡性腫瘤	77	221.33	130.64	1.01	25.2	1	惡性腫瘤	51	284.74	177.74	1.03	30.7	1	惡性腫瘤	26	154.03	86.85	0.96	18.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	129.35	68.15	1.35	14.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	134.00	85.43	1.35	14.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	124.41	48.79	1.34	15.0
3	事故傷害	21	60.36	39.91	1.63*	6.9	3	事故傷害	14	78.16	54.40	1.50	8.4	3	腦血管疾病	11	65.17	31.29	1.60	7.9
4	肺炎	18	51.74	25.86	0.84	5.9	4	慢性下呼吸道疾病	12	67.00	36.67	1.21	7.2	4	事故傷害	7	41.47	27.46	1.93	5.0
5	慢性下呼吸道疾病	15	43.12	19.49	1.04	4.9	5	肺炎	11	61.41	36.54	0.89	6.6	5	肺炎	7	41.47	16.31	0.76	5.0
6	腦血管疾病	14	40.24	21.52	0.90	4.6	6	慢性肝病及肝硬化	9	50.25	34.34	1.53	5.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	6	35.55	28.95	3.18*	4.3
7	慢性肝病及肝硬化	11	31.62	20.65	1.45	3.6	7	高血壓性疾病	5	27.92	16.70	1.28	3.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35.55	10.00	1.25	4.3
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	28.74	12.20	1.07	3.3	8	糖尿病	4	22.33	14.87	0.60	2.4	8	糖尿病	5	29.62	15.85	0.65	3.6
9	蓄意自我傷害(自殺)	9	25.87	19.96	1.61	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.33	12.63	0.88	2.4	9	高血壓性疾病	4	23.70	7.49	0.93	2.9
10	糖尿病	9	25.87	15.96	0.63	2.9	10	血管性及未明示之癱瘓症	4	22.33	11.49	5.28*	2.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.77	7.56	4.12	2.1
	其他非十大死因	77	221.33	109.11	1.22	25.2		其他非十大死因	28	156.33	95.18*-	0.70	16.9		其他非十大死因	44	260.66	112.48	1.36	31.4
11	高血壓性疾病	9	25.87	11.78	1.10	2.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.75	11.71	0.80	1.8	11	皮膚及皮下組織疾病	3	17.77	6.53	4.13	2.1
12	敗血症	5	14.37	6.67	0.88	1.6	12	腦血管疾病	3	16.75	10.76*-	0.34*	1.8	12	慢性下呼吸道疾病	3	17.77	5.93	0.67	2.1
13	血管性及未明示之癱瘓症	5	14.37	5.29	2.33	1.6	13	敗血症	2	11.17	6.99	0.68	1.2	13	敗血症	3	17.77	5.31	1.11	2.1
14	皮膚及皮下組織疾病	4	11.50	4.67	3.23	1.3	14	結核病	2	11.17	6.51	2.26	1.2	14	慢性肝病及肝硬化	2	11.85	5.98	1.12	1.4
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.62	4.14	1.88	1.0	15	帕金森病	2	11.17	6.04	2.00	1.2	15	加害(他殺)	1	5.92	14.96	9.95	0.7

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,790人 男性17,911人 女性16,880人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣永靖鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	338	909.87	455.22	1.11	100.0		所有死亡原因	180	935.94	551.95	1.01	100.0		所有死亡原因	158	881.89	362.29*+	1.23*	100.0
	十大主要死因	263	707.98	351.86	1.12	77.8		十大主要死因	144	748.75	433.17	1.03	80.0		十大主要死因	124	692.12	290.64*+	1.31*	78.5
1	惡性腫瘤	105	282.65	149.67	1.24*	31.1	1	惡性腫瘤	64	332.78	190.85	1.18	35.6	1	惡性腫瘤	41	228.85	118.94	1.35	25.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	118.45	56.42	1.18	13.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	93.59	55.02	0.92	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	145.12	53.68	1.46	16.5
3	慢性下呼吸道疾病	24	64.61	26.96	1.47	7.1	3	慢性下呼吸道疾病	18	93.59	48.63	1.60	10.0	3	腦血管疾病	12	66.98	30.24	1.55	7.6
4	糖尿病	19	51.15	24.24	1.18	5.6	4	糖尿病	11	57.20	32.41	1.50	6.1	4	肺炎	10	55.82	18.63	0.97	6.3
5	腦血管疾病	18	48.45	23.77	1.03	5.3	5	肺炎	8	41.60	21.06*-	0.57	4.4	5	糖尿病	8	44.65	16.97	0.91	5.1
6	肺炎	18	48.45	19.48	0.74	5.3	6	蓄意自我傷害(自殺)	6	31.20	23.60	1.50	3.3	6	高血壓性疾病	8	44.65	13.41	1.65	5.1
7	高血壓性疾病	12	32.30	13.69	1.30	3.6	7	腦血管疾病	6	31.20	17.46	0.62	3.3	7	慢性下呼吸道疾病	6	33.49	11.79	1.19	3.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	24.23	10.56	0.85	2.7	8	事故傷害	5	26.00	21.56	0.50	2.8	8	敗血症	5	27.91	11.28	1.63	3.2
9	蓄意自我傷害(自殺)	7	18.84	14.10	1.17	2.1	9	高血壓性疾病	4	20.80	11.81	0.92	2.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	27.91	11.01	0.92	3.2
10	事故傷害	7	18.84	12.97*-	0.50	2.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	20.80	10.76	0.78	2.2	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	16.74	4.67	2.81	1.9
	其他非十大死因	75	201.90	103.35	1.07	22.2		其他非十大死因	36	187.19	118.78	0.95	20.0		其他非十大死因	34	189.77	71.65	1.00	21.5
11	敗血症	7	18.84	10.77	1.10	2.1	11	慢性肝病及肝硬化	3	15.60	11.53	0.47	1.7	11	慢性肝病及肝硬化	3	16.74	4.67	1.48	1.9
12	慢性肝病及肝硬化	6	16.15	9.10	0.73	1.8	12	敗血症	2	10.40	8.79	0.60	1.1	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	16.74	4.35	4.74	1.9
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	13.46	6.59	2.17	1.5	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.40	7.36	1.63	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.16	3.22	2.41	1.3
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.08	3.89	1.68	0.9	14	主動脈瘤及剝離	1	5.20	4.40	1.03	0.6	14	衰老/老邁	2	11.16	2.90	0.96	1.3
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	8.08	2.75	2.52	0.9	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.20	3.99	1.04	0.6	15	事故傷害	2	11.16	2.90*-	0.50	1.3

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計37,148人 男性19,232人 女性17,916人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣社頭鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	370	860.21	446.21	1.04	100.0		所有死亡原因	215	972.15	584.99	1.03	100.0		所有死亡原因	155	741.73	309.46	1.04	100.0
	十大主要死因	310	720.71	373.57	1.14*	83.8		十大主要死因	185	836.50	494.94	1.11	86.0		十大主要死因	125	598.17	255.85	1.16	80.6
1	惡性腫瘤	120	278.99	158.61*+	1.22*	32.4	1	惡性腫瘤	75	339.12	208.68	1.18	34.9	1	惡性腫瘤	45	215.34	108.61	1.29	29.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	104.62	49.28	1.04	12.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	99.48	58.87	0.96	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	110.06	38.42	1.12	14.8
3	慢性下呼吸道疾病	30	69.75	31.42*+	1.57*	8.1	3	慢性下呼吸道疾病	21	94.95	49.67	1.58	9.8	3	糖尿病	12	57.42	19.87	1.19	7.7
4	肺炎	28	65.10	27.24	0.99	7.6	4	腦血管疾病	19	85.91	45.85	1.65	8.8	4	肺炎	10	47.85	12.57	0.84	6.5
5	腦血管疾病	25	58.12	25.81	1.23	6.8	5	肺炎	18	81.39	43.35	1.09	8.4	5	慢性下呼吸道疾病	9	43.07	16.94	1.53	5.8
6	事故傷害	16	37.20	23.69	0.98	4.3	6	事故傷害	11	49.74	35.51	0.94	5.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	38.28	16.16	1.27	5.2
7	糖尿病	16	37.20	15.82	0.86	4.3	7	慢性肝病及肝硬化	8	36.17	21.15	1.09	3.7	7	腦血管疾病	6	28.71	8.19*-	0.67	3.9
8	慢性肝病及肝硬化	11	25.57	14.63	1.15	3.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	18.09	13.19	0.87	1.9	8	事故傷害	5	23.93	11.34	1.07	3.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.57	12.70	0.90	3.0	9	糖尿病	4	18.09	10.34*-	0.46	1.9	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	19.14	16.11	1.74	2.6
10	蓄意自我傷害(自殺)	8	18.60	14.37	1.16	2.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.56	8.35	0.50	1.4	10	慢性肝病及肝硬化	3	14.36	7.65	1.31	1.9
	其他非十大死因	60	139.49	72.64*-	0.73*	16.2		其他非十大死因	30	135.65	90.05	0.71	14.0		其他非十大死因	30	143.56	53.61*-	0.74	19.4
11	主動脈瘤及剝離	3	6.97	3.70	1.80	0.8	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.04	5.96	1.76	0.9	11	主動脈瘤及剝離	2	9.57	3.36	3.76	1.3
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.97	3.69	1.45	0.8	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.04	4.89	1.37	0.9	12	皮膚及皮下組織疾病	2	9.57	2.88	2.13	1.3
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.97	3.32	1.12	0.8	13	流行性感胃	2	9.04	4.75	3.85	0.9	13	敗血症	2	9.57	2.88	0.56	1.3
14	敗血症	3	6.97	2.61*-	0.40	0.8	14	源於周產期的特定病況	1	4.52	9.16	3.73	0.5	14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	4.79	4.40	31.18	0.6
15	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	4.79	4.40	31.18	0.3	15	疝氣及腸阻塞	1	4.52	6.32	2.29	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	4.79	2.15	0.81	0.6

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,013人 男性22,116人 女性20,897人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二水鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	202	1,325.55	473.39	1.09	100.0		所有死亡原因	113	1,414.27	598.38	1.04	100.0		所有死亡原因	89	1,227.59	342.70	1.13	100.0
	十大主要死因	159	1,043.38	378.24	1.14	78.7		十大主要死因	94	1,176.47	512.77	1.13	83.2		十大主要死因	68	937.93	253.42	1.22	76.4
1	惡性腫瘤	49	321.54	135.25	1.02	24.3	1	惡性腫瘤	33	413.02	193.29	1.04	29.2	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	248.28	45.25	1.58	20.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	262.48	73.75	1.73*	19.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	275.34	100.00	1.84*	19.5	2	惡性腫瘤	16	220.69	71.81	0.94	18.0
3	肺炎	20	131.24	33.33	1.23	9.9	3	肺炎	13	162.70	47.81	1.34	11.5	3	肺炎	7	96.55	22.54	1.04	7.9
4	糖尿病	12	78.75	32.87	1.20	5.9	4	事故傷害	6	75.09	59.12	1.15	5.3	4	蓄意自我傷害(自殺)	6	82.76	39.46	6.67*	6.7
5	慢性下呼吸道疾病	9	59.06	14.87	0.82	4.5	5	糖尿病	6	75.09	37.32	1.32	5.3	5	糖尿病	6	82.76	27.72	1.09	6.7
6	蓄意自我傷害(自殺)	8	52.50	26.48	2.89*	4.0	6	慢性下呼吸道疾病	5	62.58	17.65	0.64	4.4	6	慢性下呼吸道疾病	4	55.17	13.69	1.21	4.5
7	腦血管疾病	8	52.50	13.28	0.74	4.0	7	腦血管疾病	4	50.06	16.29	0.66	3.5	7	腦血管疾病	4	55.17	9.56	0.83	4.5
8	事故傷害	6	39.37	30.91	0.83	3.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	2	25.03	15.70	1.04	1.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	41.38	8.29	0.87	3.4
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.25	5.90*-	0.59	2.0	9	慢性肝病及肝硬化	2	25.03	10.75	0.62	1.8	9	敗血症	2	27.59	8.91	1.02	2.2
10	慢性肝病及肝硬化	3	19.69	11.60	0.71	1.5	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.52	14.86	1.30	0.9	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	27.59	6.18	3.05	2.2
	其他非十大死因	43	282.17	95.15	0.96	21.3		其他非十大死因	19	237.80	85.60	0.75	16.8		其他非十大死因	21	289.66	89.28	0.92	23.6
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	19.69	11.12	2.10	1.5	11	皮膚及皮下組織疾病	1	12.52	6.02	2.65	0.9	11	慢性肝病及肝硬化	1	13.79	13.22	0.85	1.1
12	敗血症	3	19.69	6.13	0.73	1.5	12	帕金森病	1	12.52	4.37	1.31	0.9	12	帕金森病	1	13.79	6.80	2.18	1.1
13	帕金森病	2	13.12	5.41	1.65	1.0	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	12.52	3.79	7.23	0.9	13	結核病	1	13.79	2.11	8.67	1.1
14	皮膚及皮下組織疾病	2	13.12	4.26	2.22	1.0	14	流行性感冒	1	12.52	3.79	3.87	0.9	14	貧血	1	13.79	2.11	7.90	1.1
15	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.56	1.57	2.97	0.5	15	敗血症	1	12.52	3.79	0.46	0.9	15	皮膚及皮下組織疾病	1	13.79	2.11	1.90	1.1

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,239人 男性7,990人 女性7,250人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田尾鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	296	1,080.33	525.32*+	1.17*	100.0		所有死亡原因	171	1,211.39	666.24	1.18*	100.0		所有死亡原因	125	940.98	388.09*+	1.14	100.0
	十大主要死因	231	843.10	408.20*+	1.24*	78.0		十大主要死因	137	970.53	542.92*+	1.24*	80.1		十大主要死因	96	722.67	294.81*+	1.18	76.8
1	惡性腫瘤	90	328.48	176.40*+	1.35*	30.4	1	惡性腫瘤	58	410.88	238.38*+	1.34*	33.9	1	惡性腫瘤	32	240.89	114.08	1.33	25.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	113.14	56.23	0.99	10.5	2	肺炎	17	120.43	52.73	1.41	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	120.45	52.87	1.03	12.8
3	肺炎	29	105.84	35.56	1.35	9.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	106.26	58.07	0.94	8.8	3	肺炎	12	90.33	23.74	1.28	9.6
4	慢性下呼吸道疾病	18	65.70	24.80	1.25	6.1	4	腦血管疾病	12	85.01	49.61	1.49	7.0	4	慢性肝病及肝硬化	7	52.69	28.70*+	4.36*	5.6
5	腦血管疾病	16	58.40	32.37	1.09	5.4	5	慢性下呼吸道疾病	11	77.93	35.59	1.13	6.4	5	慢性下呼吸道疾病	7	52.69	16.62	1.54	5.6
6	慢性肝病及肝硬化	14	51.10	32.18*+	2.21*	4.7	6	慢性肝病及肝硬化	7	49.59	33.54	1.45	4.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	37.64	15.55	1.06	4.0
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	32.85	17.33	1.00	3.0	7	衰老/老邁	5	35.42	14.36	4.01*	2.9	7	糖尿病	5	37.64	12.77	0.66	4.0
8	糖尿病	9	32.85	14.11	0.67	3.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	28.34	22.03	1.32	2.3	8	腦血管疾病	4	30.11	15.71	0.60	3.2
9	衰老/老邁	8	29.20	9.50	2.49*	2.7	9	事故傷害	4	28.34	20.67	0.51	2.3	9	敗血症	4	30.11	8.17	1.49	3.2
10	敗血症	7	25.55	9.71	1.28	2.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	28.34	17.93	0.93	2.3	10	高血壓性疾病	4	30.11	6.58	0.91	3.2
	其他非十大死因	65	237.23	117.13	0.97	22.0		其他非十大死因	34	240.86	123.32	0.98	19.9		其他非十大死因	29	218.31	93.29	1.02	23.2
11	事故傷害	6	21.90	16.52	0.55	2.0	11	糖尿病	4	28.34	14.46	0.66	2.3	11	衰老/老邁	3	22.58	6.72	1.52	2.4
12	高血壓性疾病	6	21.90	6.00*-	0.75	2.0	12	敗血症	3	21.25	11.12	1.08	1.8	12	事故傷害	2	15.06	11.20	0.63	1.6
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.60	11.52	0.90	1.4	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	14.17	8.24	1.98	1.2	13	胃及十二指腸潰瘍	2	15.06	2.91	8.58	1.6
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	7.30	4.46	1.03	0.7	14	高血壓性疾病	2	14.17	5.35*-	0.55	1.2	14	加害(他殺)	1	7.53	16.36	12.53	0.8
15	結核病	2	7.30	2.24	1.90	0.7	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	7.08	3.10	5.88	0.6	15	帕金森病	1	7.53	3.05	1.59	0.8

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,399人 男性14,116人 女性13,284人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	327	1,069.50	483.87	1.10	100.0		所有死亡原因	201	1,270.70	676.34*+	1.21*	100.0		所有死亡原因	126	853.83	302.51	0.96	100.0
	十大主要死因	234	765.33	344.00	1.04	71.6		十大主要死因	153	967.25	515.13	1.18	76.1		十大主要死因	85	576.00	192.23	0.90	67.5
1	惡性腫瘤	68	222.40	114.50	0.88	20.8	1	惡性腫瘤	47	297.13	168.40	0.95	23.4	1	惡性腫瘤	21	142.31	62.12	0.74	16.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	111.20	47.94	0.92	10.4	2	肺炎	21	132.76	62.97	1.52	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	108.42	36.54	0.85	12.7
3	肺炎	34	111.20	39.71	1.34	10.4	3	慢性下呼吸道疾病	21	132.76	58.00*+	1.88*	10.4	3	肺炎	13	88.09	20.20	1.15	10.3
4	慢性下呼吸道疾病	26	85.04	29.66	1.53	8.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	113.79	59.71	0.98	9.0	4	糖尿病	10	67.76	16.71	1.10	7.9
5	糖尿病	18	58.87	24.20	1.13	5.5	5	事故傷害	10	63.22	42.49	1.13	5.0	5	高血壓性疾病	6	40.66	7.84	1.13	4.8
6	事故傷害	12	39.25	25.82	0.96	3.7	6	慢性肝病及肝硬化	10	63.22	35.03	1.84	5.0	6	慢性下呼吸道疾病	5	33.88	9.68	0.91	4.0
7	慢性肝病及肝硬化	12	39.25	20.71	1.66	3.7	7	腦血管疾病	9	56.90	26.10	0.98	4.5	7	蓄意自我傷害(自殺)	4	27.11	15.84	2.39	3.2
8	腦血管疾病	12	39.25	14.42	0.70	3.7	8	糖尿病	8	50.58	28.91	1.16	4.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	27.11	6.86	0.70	3.2
9	蓄意自我傷害(自殺)	9	29.44	17.72	1.79	2.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	31.61	19.45	1.47	2.5	9	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	20.33	11.34	4.28	2.4
10	高血壓性疾病	9	29.44	9.31	0.96	2.8	10	敗血症	4	25.29	14.10	1.25	2.0	10	腦血管疾病	3	20.33	5.10*-	0.38	2.4
	其他非十大死因	93	304.17	139.87*+	1.29*	28.4		其他非十大死因	48	303.45	161.21	1.34	23.9		其他非十大死因	41	277.83	110.28	1.11	32.5
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	26.17	10.19	0.75	2.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	25.29	12.88	0.81	2.0	11	源於周產期的特定病況	2	13.55	25.53	9.74*	1.6
12	敗血症	6	19.62	9.11	0.93	1.8	12	高血壓性疾病	3	18.97	9.11	0.72	1.5	12	事故傷害	2	13.55	7.93	0.53	1.6
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	13.08	6.51	3.27	1.2	13	疝氣及腸阻塞	2	12.64	6.46	5.45	1.0	13	慢性肝病及肝硬化	2	13.55	6.15	1.05	1.6
14	衰老/老邁	3	9.81	2.35	0.79	0.9	14	結核病	2	12.64	6.35	1.99	1.0	14	敗血症	2	13.55	4.51	0.62	1.6
15	源於周產期的特定病況	2	6.54	12.97	5.10	0.6	15	動脈粥樣硬化	1	6.32	8.65	20.32	0.5	15	皮膚及皮下組織疾病	2	13.55	3.92	2.26	1.6

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,575人 男性15,818人 女性14,757人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	371	1,104.10	441.97	0.93	100.0		所有死亡原因	229	1,290.36	627.70	1.01	100.0		所有死亡原因	142	895.67	231.10*-	0.80*	100.0
	十大主要死因	281	836.26	349.68	0.91	75.7		十大主要死因	181	1,019.89	523.21	1.01	79.0		十大主要死因	100	630.76	165.87*-	0.78*	70.4
1	惡性腫瘤	109	324.39	148.97	1.07	29.4	1	惡性腫瘤	86	484.59	241.41*+	1.31*	37.6	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	182.92	42.92	1.12	20.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	145.82	56.02	0.97	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	112.70	60.90	0.80	8.7	2	惡性腫瘤	23	145.07	45.05*-	0.63*	16.2
3	肺炎	33	98.21	25.76	0.92	8.9	3	肺炎	18	101.43	35.85	0.89	7.9	3	肺炎	15	94.61	18.50	0.95	10.6
4	事故傷害	23	68.45	48.96	1.47	6.2	4	事故傷害	15	84.52	70.11	1.33	6.6	4	事故傷害	8	50.46	20.29	1.69	5.6
5	糖尿病	16	47.62	14.02	0.74	4.3	5	腦血管疾病	9	50.71	27.79	0.71	3.9	5	糖尿病	8	50.46	13.58	0.64	5.6
6	腦血管疾病	14	41.66	17.15	0.60	3.8	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	45.08	16.96	1.16	3.5	6	腦血管疾病	5	31.54	5.60*-	0.46	3.5
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	32.74	11.37	0.75	3.0	7	糖尿病	8	45.08	15.44	0.85	3.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.92	7.39	0.38	2.1
8	慢性肝病及肝硬化	9	26.78	13.87	0.99	2.4	8	慢性肝病及肝硬化	6	33.81	22.28	0.87	2.6	8	高血壓性疾病	3	18.92	4.99	0.41	2.1
9	慢性下呼吸道疾病	9	26.78	5.94*-	0.37*	2.4	9	慢性下呼吸道疾病	6	33.81	10.09*-	0.37*	2.6	9	敗血症	3	18.92	4.54	0.67	2.1
10	高血壓性疾病	8	23.81	7.62	0.61	2.2	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	28.17	22.37	1.20	2.2	10	慢性肝病及肝硬化	3	18.92	3.00	1.16	2.1
	其他非十大死因	90	267.84	92.30	0.99	24.3		其他非十大死因	48	270.47	104.50	1.00	21.0		其他非十大死因	42	264.92	65.24	0.86	29.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	17.86	15.03	1.01	1.6	11	高血壓性疾病	5	28.17	10.33	0.85	2.2	11	慢性下呼吸道疾病	3	18.92	3.00*-	0.39	2.1
12	敗血症	6	17.86	4.89	0.66	1.6	12	敗血症	3	16.90	5.33	0.65	1.3	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.62	2.15	2.08	1.4
13	衰老/老邁	3	8.93	2.00	0.54	0.8	13	衰老/老邁	2	11.27	3.28	0.92	0.9	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.31	5.78	0.52	0.7
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.95	1.57	0.64	0.5	14	結核病	2	11.27	3.20	1.34	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.31	1.95	0.66	0.7
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	5.95	1.28	1.16	0.5	15	貧血	1	5.63	3.23	2.35	0.4	15	動脈粥樣硬化	1	6.31	1.30	23.35	0.7

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計33,602人 男性17,747人 女性15,854人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大城鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	248	1,471.64	562.86*+	1.14*	100.0		所有死亡原因	151	1,660.07	758.49*+	1.25*	100.0		所有死亡原因	97	1,250.64	364.51	0.98	100.0
	十大主要死因	193	1,145.26	442.86*+	1.16	77.8		十大主要死因	122	1,341.25	612.05*+	1.31*	80.8		十大主要死因	74	954.10	290.91	1.09	76.3
1	惡性腫瘤	60	356.04	153.73	1.07	24.2	1	惡性腫瘤	44	483.73	231.09	1.23	29.1	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	283.65	74.19*+	1.51	22.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	46	272.96	95.86*+	1.68*	18.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	263.85	111.77*+	1.80*	15.9	2	惡性腫瘤	16	206.29	76.62	0.78	16.5
3	肺炎	18	106.81	35.61	0.93	7.3	3	腦血管疾病	12	131.93	59.95	1.79	7.9	3	肺炎	9	116.04	24.30	1.03	9.3
4	事故傷害	16	94.94	52.46	1.90*	6.5	4	事故傷害	10	109.94	61.63	1.67	6.6	4	事故傷害	6	77.36	39.39	2.28	6.2
5	腦血管疾病	15	89.01	33.90	1.18	6.0	5	肺炎	9	98.94	47.29	0.87	6.0	5	糖尿病	6	77.36	18.19	0.86	6.2
6	糖尿病	11	65.27	21.68	0.92	4.4	6	慢性下呼吸道疾病	7	76.96	25.60	0.82	4.6	6	敗血症	5	64.47	10.83	1.98	5.2
7	敗血症	8	47.47	13.11	1.63	3.2	7	糖尿病	5	54.97	21.68	0.97	3.3	7	腦血管疾病	3	38.68	13.88	0.50	3.1
8	慢性下呼吸道疾病	8	47.47	12.18	0.61	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	43.98	22.64	1.81	2.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	38.68	7.77	0.67	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	35.60	10.65	0.74	2.4	9	帕金森病	4	43.98	15.09	4.52*	2.6	9	病毒性肝炎	2	25.79	15.46	12.79*	2.1
10	慢性肝病及肝硬化	5	29.67	13.69	1.02	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	3	32.98	15.31	0.80	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	2	25.79	10.29	1.39	2.1
	其他非十大死因	55	326.37	120.00	1.08	22.2		其他非十大死因	29	318.82	146.44	1.04	19.2		其他非十大死因	23	296.54	73.60	0.74	23.7
11	血管性及未明示之癱瘓症	5	29.67	6.74	2.53	2.0	11	敗血症	3	32.98	14.32	1.25	2.0	11	血管性及未明示之癱瘓症	2	25.79	6.22	1.48	2.1
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	23.74	11.60	1.28	1.6	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	32.98	13.18	0.83	2.0	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.89	7.94	1.74	1.0
13	帕金森病	4	23.74	6.45	2.73	1.6	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	32.98	10.29	4.62	2.0	13	疝氣及腸阻塞	1	12.89	2.40	4.79	1.0
14	高血壓性疾病	3	17.80	6.55	0.42	1.2	14	高血壓性疾病	2	21.99	9.12	0.65	1.3	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.89	2.40	1.17	1.0
15	病毒性肝炎	2	11.87	6.35	4.73	0.8	15	疝氣及腸阻塞	1	10.99	5.96	3.65	0.7	15	慢性下呼吸道疾病	1	12.89	2.40*-	0.23	1.0

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計16,852人 男性9,096人 女性7,756人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	194	1,276.4 0	504.61	1.07	100.0		所有死亡原因	114	1,428.2 1	710.27*+	1.19	100.0		所有死亡原因	80	1,108.49	297.69	0.94	100.0
	十大主要死因	163	1,072.4 4	431.38*+	1.16	84.0		十大主要死因	97	1,215.2 3	627.33*+	1.28*	85.1		十大主要死因	70	969.93	250.04	1.11	87.5
1	惡性腫瘤	59	388.18	169.08	1.27	30.4	1	惡性腫瘤	37	463.54	235.51	1.28	32.5	1	惡性腫瘤	22	304.84	93.33	1.27	27.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	131.59	48.99	0.88	10.3	2	事故傷害	13	162.87	117.00*+	2.67*	11.4	2	糖尿病	12	166.27	48.98	2.01*	15.0
3	事故傷害	16	105.27	66.56*+	2.25*	8.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	150.34	77.50	1.15	10.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	110.85	19.00*-	0.64	10.0
4	糖尿病	16	105.27	35.05	1.63	8.2	4	腦血管疾病	6	75.17	33.21	1.13	5.3	4	高血壓性疾病	6	83.14	24.03	1.68	7.5
5	腦血管疾病	10	65.79	23.68	0.95	5.2	5	慢性下呼吸道疾病	6	75.17	29.17	0.93	5.3	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	69.28	17.33	1.32	6.3
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	65.79	19.17	1.50	5.2	6	慢性肝病及肝硬化	5	62.64	34.06	1.64	4.4	6	肺炎	5	69.28	16.51	0.65	6.3
7	肺炎	10	65.79	17.55	0.62	5.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	62.64	24.16	1.78	4.4	7	腦血管疾病	4	55.42	11.87	0.77	5.0
8	慢性下呼吸道疾病	9	59.21	15.35	0.83	4.6	8	肺炎	5	62.64	21.17	0.63	4.4	8	事故傷害	3	41.57	8.19	1.34	3.8
9	高血壓性疾病	8	52.64	16.67	1.36	4.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	50.11	33.71	2.19	3.5	9	慢性下呼吸道疾病	3	41.57	7.36	0.81	3.8
10	慢性肝病及肝硬化	5	32.90	19.27	1.23	2.6	10	糖尿病	4	50.11	21.85	0.99	3.5	10	血管性及未明示之癱瘓症	2	27.71	3.44	1.67	2.5
	其他非十大死因	31	203.96	73.23	0.76	16.0		其他非十大死因	17	212.98	82.94	0.86	14.9		其他非十大死因	10	138.56	47.65	0.46*	12.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	4	26.32	17.05	1.50	2.1	11	帕金森病	3	37.58	14.11	4.43	2.6	11	先天性畸形變形及染色體異常	1	13.86	14.27	12.99	1.3
12	血管性及未明示之癱瘓症	4	26.32	7.66	2.42	2.1	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	25.06	10.60	4.07	1.8	12	疝氣及腸阻塞	1	13.86	2.82	5.89	1.3
13	帕金森病	3	19.74	5.38	2.52	1.5	13	高血壓性疾病	2	25.06	8.69	0.84	1.8	13	胃及十二指腸潰瘍	1	13.86	2.82	5.18	1.3
14	主動脈瘤及剝離	2	13.16	3.71	2.37	1.0	14	結核病	2	25.06	8.54	3.45	1.8	14	主動脈瘤及剝離	1	13.86	2.82	3.33	1.3
15	結核病	2	13.16	2.90	2.51	1.0	15	主動脈瘤及剝離	1	12.53	4.75	1.88	0.9	15	皮膚及皮下組織疾病	1	13.86	1.72	1.69	1.3

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,199人 男性7,982人 女性7,217人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪州鄉主要死亡原因

## 民國107年(2018年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	345	1,153.46	495.56*+	1.12*	100.0		所有死亡原因	187	1,197.57	610.96	1.07	100.0		所有死亡原因	158	1,105.28	374.54*+	1.17	100.0
	十大主要死因	278	929.46	398.62*+	1.16*	80.6		十大主要死因	152	973.42	501.64	1.12	81.3		十大主要死因	129	902.41	299.16*+	1.31*	81.6
1	惡性腫瘤	85	284.19	135.63	1.04	24.6	1	惡性腫瘤	54	345.82	175.16	1.03	28.9	1	惡性腫瘤	31	216.86	100.37	1.05	19.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	143.76	56.77	1.13	12.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	115.27	61.32	0.94	9.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	174.89	46.38	1.29	15.8
3	肺炎	34	113.67	37.60	1.30	9.9	3	腦血管疾病	18	115.27	52.71	1.86*	9.6	3	肺炎	22	153.90	39.95*+	1.92*	13.9
4	腦血管疾病	26	86.93	32.17	1.46	7.5	4	肺炎	12	76.85	33.90	0.82	6.4	4	糖尿病	13	90.94	40.20	1.39	8.2
5	糖尿病	20	66.87	31.55	1.21	5.8	5	慢性下呼吸道疾病	12	76.85	33.02	1.02	6.4	5	高血壓性疾病	10	69.95	16.35	1.87	6.3
6	高血壓性疾病	20	66.87	22.63*+	2.06*	5.8	6	事故傷害	11	70.45	61.11	1.21	5.9	6	腦血管疾病	8	55.96	12.55	0.98	5.1
7	慢性下呼吸道疾病	19	63.52	20.01	1.08	5.5	7	高血壓性疾病	10	64.04	28.66	2.28*	5.3	7	慢性下呼吸道疾病	7	48.97	9.08	1.25	4.4
8	事故傷害	14	46.81	37.78	1.09	4.1	8	糖尿病	7	44.83	22.48	0.95	3.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	41.97	9.36	1.02	3.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	30.09	10.62	0.82	2.6	9	敗血症	6	38.42	16.53	1.78	3.2	9	慢性肝病及肝硬化	4	27.98	10.66	1.98	2.5
10	慢性肝病及肝硬化	8	26.75	13.85	1.07	2.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	25.62	16.74	1.15	2.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	20.99	14.25	1.80	1.9
	其他非十大死因	67	224.01	96.94	0.98	19.4		其他非十大死因	35	224.14	109.33	0.90	18.7		其他非十大死因	29	202.87	75.38	0.80	18.4
11	敗血症	8	26.75	9.25	1.19	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	4	25.62	14.81	0.71	2.1	11	事故傷害	3	20.99	11.29	0.78	1.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	7	23.40	15.70	1.38	2.0	12	結核病	4	25.62	9.53	3.79*	2.1	12	敗血症	2	13.99	3.59	0.60	1.3
13	結核病	4	13.37	3.58	3.12	1.2	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	19.21	10.34	0.58	1.6	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	7.00	15.32	7.18	0.6
14	主動脈瘤及剝離	2	6.69	3.18	1.39	0.6	14	主動脈瘤及剝離	2	12.81	6.35	2.09	1.1	14	流行性感冒	1	7.00	4.09	2.89	0.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	6.69	3.12	0.85	0.6	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.40	2.77	0.82	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	7.00	3.62	0.88	0.6

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,910人 男性15,615人 女性14,295人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計