

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比
	所有死亡原因	1,523	657.07	350.25*-	0.88*	100.0		所有死亡原因	894	783.72	472.66*-	0.89*	100.0		所有死亡原因	629	534.34	249.02*-	0.89*	100.0
	十大主要死因	1,170	504.77	260.94*-	0.89*	76.8		十大主要死因	703	616.28	366.03*-	0.89*	78.6		十大主要死因	480	407.76	182.66*-	0.91*	76.3
1	惡性腫瘤	435	187.67	105.14*-	0.88*	28.6	1	惡性腫瘤	266	233.19	141.04*-	0.86*	29.8	1	惡性腫瘤	169	143.57	76.12	0.93	26.9
2	肺炎	148	63.85	28.52	0.98	9.7	2	肺炎	87	76.27	41.63	0.97	9.7	2	肺炎	61	51.82	18.46	1.00	9.7
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	136	58.67	28.83*-	0.77*	8.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	80	70.13	40.74	0.85	8.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	56	47.57	18.87*-	0.69*	8.9
4	腦血管疾病	106	45.73	22.27	1.02	7.0	4	腦血管疾病	70	61.36	34.52	1.14	7.8	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	41	34.83	14.49	1.37	6.5
5	糖尿病	82	35.38	17.86	0.92	5.4	5	事故傷害	49	42.96	29.98*-	0.82	5.5	5	糖尿病	40	33.98	14.64	0.90	6.4
6	事故傷害	64	27.61	18.82*-	0.79	4.2	6	慢性下呼吸道疾病	46	40.33	21.81	0.90	5.1	6	腦血管疾病	36	30.58	12.44	0.88	5.7
7	慢性下呼吸道疾病	60	25.89	11.94	0.83	3.9	7	糖尿病	42	36.82	21.63	0.95	4.7	7	高血壓性疾病	24	20.39	7.68*-	0.72	3.8
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	58	25.02	11.79	1.01	3.8	8	慢性肝病及肝硬化	24	21.04	14.58	0.78	2.7	8	血管性及未明示之癱瘓症	24	20.39	6.58	1.75*	3.8
9	高血壓性疾病	46	19.85	9.85	0.75	3.0	9	高血壓性疾病	22	19.29	11.90	0.82	2.5	9	事故傷害	15	12.74	8.74	0.76	2.4
10	血管性及未明示之癱瘓症	35	15.10	5.92*+	1.66*	2.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	14.90	8.20*-	0.63	1.9	10	慢性下呼吸道疾病	14	11.89	4.64	0.67	2.2
	其他非十大死因	353	152.29	89.30*-	0.84*	23.2		其他非十大死因	191	167.44	106.63	0.92	21.4		其他非十大死因	149	126.58	66.37	0.82*	23.7
11	慢性肝病及肝硬化	31	13.37	8.52*-	0.69*	2.0	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	14	12.27	6.96	1.29	1.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	11	9.34	7.94	0.99	1.7
12	蓄意自我傷害(自殺)	24	10.35	8.51	0.73	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	13	11.40	9.23	0.61	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.80	3.18	1.34	1.3
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	19	8.20	4.14	1.02	1.2	13	敗血症	12	10.52	5.98	1.23	1.3	13	慢性肝病及肝硬化	7	5.95	3.13	0.57	1.1
14	敗血症	18	7.77	4.01	0.83	1.2	14	血管性及未明示之癱瘓症	11	9.64	4.81	1.53	1.2	14	敗血症	6	5.10	2.48	0.51	1.0
15	帕金森病	14	6.04	3.05	1.18	0.9	15	帕金森病	10	8.77	5.04	1.40	1.1	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	4.25	1.87	0.64	0.8

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計231,788.0人 男性114,071.5人 女性117,716.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	595	685.96	369.14*-	0.93	100.0		所有死亡原因	333	756.96	481.62*-	0.89*	100.0		所有死亡原因	262	612.89	261.67	0.98	100.0
	十大主要死因	461	531.47	285.46	0.96	77.5		十大主要死因	263	597.84	378.50	0.91	79.0		十大主要死因	201	470.20	205.40	1.10	76.7
1	惡性腫瘤	182	209.82	122.31	1.01	30.6	1	惡性腫瘤	122	277.32	177.77	1.07	36.6	1	惡性腫瘤	60	140.36	72.13	0.92	22.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68	78.40	36.76	1.02	11.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	68.19	41.09	0.86	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	88.89	30.75	1.21	14.5
3	肺炎	41	47.27	21.46*-	0.71*	6.9	3	肺炎	24	54.56	31.80	0.72	7.2	3	糖尿病	26	60.82	23.88	1.55*	9.9
4	糖尿病	40	46.11	22.81	1.21	6.7	4	事故傷害	20	45.46	34.97	0.89	6.0	4	肺炎	17	39.77	12.43*-	0.71	6.5
5	事故傷害	32	36.89	27.05	1.08	5.4	5	腦血管疾病	17	38.64	23.82	0.74	5.1	5	衰老/老邁	15	35.09	10.07*+	2.93*	5.7
6	腦血管疾病	29	33.43	17.35	0.75	4.9	6	糖尿病	14	31.82	19.55	0.86	4.2	6	事故傷害	12	28.07	19.43	1.70	4.6
7	衰老/老邁	23	26.52	10.27*+	2.59*	3.9	7	慢性下呼吸道疾病	11	25.00	14.72*-	0.58	3.3	7	腦血管疾病	12	28.07	11.66	0.77	4.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	20.75	10.11	0.83	3.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	20.46	12.02	0.89	2.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	21.05	8.34	0.78	3.4
9	慢性肝病及肝硬化	14	16.14	9.69	0.86	2.4	9	慢性肝病及肝硬化	8	18.19	12.84	0.68	2.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	14.04	10.28	1.50	2.3
10	慢性下呼吸道疾病	14	16.14	7.65*-	0.51*	2.4	10	衰老/老邁	8	18.19	9.92	2.12	2.4	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	14.04	6.43	2.07	2.3
	其他非十大死因	134	154.48	83.69*-	0.82*	22.5		其他非十大死因	70	159.12	103.12	0.83	21.0		其他非十大死因	61	142.70	56.26*-	0.73*	23.3
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	11.53	6.23	1.43	1.7	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	9.09	5.99	0.98	1.2	11	高血壓性疾病	6	14.04	6.31	0.47	2.3
12	蓄意自我傷害(自殺)	9	10.38	7.96	0.74	1.5	12	敗血症	4	9.09	5.46	1.09	1.2	12	慢性肝病及肝硬化	6	14.04	5.77	1.36	2.3
13	高血壓性疾病	9	10.38	5.56*-	0.39*	1.5	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	9.09	5.45	1.73	1.2	13	帕金森病	5	11.70	5.40	2.72	1.9
14	帕金森病	8	9.22	4.18	1.76	1.3	14	阿茲海默病	4	9.09	4.95	9.77*	1.2	14	阿茲海默病	4	9.36	2.73	5.48*	1.5
15	阿茲海默病	8	9.22	3.70*+	7.03*	1.3	15	蓄意自我傷害(自殺)	3	6.82	5.45*-	0.37	0.9	15	敗血症	3	7.02	3.27	0.67	1.1

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,740.5人 男性43,992.0人 女性42,748.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	602	666.58	379.56	0.97	100.0		所有死亡原因	338	735.71	483.84*-	0.92	100.0		所有死亡原因	264	595.00	281.30	1.04	100.0
	十大主要死因	467	517.10	292.90	0.97	77.6		十大主要死因	273	594.23	388.55	0.95	80.8		十大主要死因	204	459.77	217.64	1.13	77.3
1	惡性腫瘤	177	195.99	118.24	0.99	29.4	1	惡性腫瘤	105	228.55	149.97	0.92	31.1	1	惡性腫瘤	72	162.27	88.26	1.12	27.3
2	肺炎	58	64.22	30.40	1.08	9.6	2	肺炎	31	67.48	40.37	0.99	9.2	2	肺炎	27	60.85	23.30	1.21	10.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	53.15	27.91*-	0.76	8.0	3	事故傷害	24	52.24	39.73	1.04	7.1	3	糖尿病	24	54.09	26.16	1.53	9.1
4	糖尿病	44	48.72	28.41*+	1.39*	7.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	52.24	33.30*-	0.70	7.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	54.09	21.18	0.82	9.1
5	腦血管疾病	41	45.40	23.89	1.10	6.8	5	腦血管疾病	23	50.06	31.38	1.03	6.8	5	腦血管疾病	18	40.57	17.06	1.23	6.8
6	事故傷害	25	27.68	20.37	0.83	4.2	6	糖尿病	20	43.53	29.14	1.25	5.9	6	慢性肝病及肝硬化	10	22.54	11.32	2.37*	3.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	25.47	13.49	1.14	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	16	34.83	20.19	0.91	4.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	20.28	8.62	0.85	3.4
8	慢性下呼吸道疾病	22	24.36	11.03	0.87	3.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	30.47	19.29	1.46	4.1	8	敗血症	7	15.78	8.16	1.64	2.7
9	高血壓性疾病	15	16.61	9.75	0.69	2.5	9	高血壓性疾病	8	17.41	12.64	0.82	2.4	9	高血壓性疾病	7	15.78	6.40	0.59	2.7
10	慢性肝病及肝硬化	14	15.50	9.41	0.83	2.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	8	17.41	12.54	0.95	2.4	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	13.52	7.17	2.17	2.3
	其他非十大死因	135	149.48	86.65	0.94	22.4		其他非十大死因	65	141.48	95.30*-	0.81	19.2		其他非十大死因	60	135.23	63.66*-	0.81	22.7
11	衰老/老邁	13	14.39	7.03	1.60	2.2	11	衰老/老邁	7	15.24	9.63	2.07	2.1	11	慢性下呼吸道疾病	6	13.52	4.99	0.79	2.3
12	蓄意自我傷害(自殺)	11	12.18	9.07	0.87	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	4	8.71	6.46*-	0.32*	1.2	12	衰老/老邁	6	13.52	4.85	1.27	2.3
13	敗血症	10	11.07	6.24	1.29	1.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.71	5.47	1.03	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	5	11.27	5.06	0.99	1.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	11.07	6.17	1.50	1.7	14	敗血症	3	6.53	4.19	0.86	0.9	14	蓄意自我傷害(自殺)	3	6.76	5.82	0.73	1.1
15	主動脈瘤及剝離	6	6.64	4.16	1.69	1.0	15	主動脈瘤及剝離	3	6.53	4.16	1.23	0.9	15	主動脈瘤及剝離	3	6.76	3.97	2.74	1.1

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,312.5人 男性45,942.5人 女性44,370.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	268	803.53	393.33	1.00	100.0		所有死亡原因	157	935.92	528.54	1.01	100.0		所有死亡原因	111	669.56	276.71	1.00	100.0
	十大主要死因	223	668.61	326.36	1.09	83.2		十大主要死因	134	798.81	450.92	1.14	85.4		十大主要死因	90	542.89	223.80	1.11	81.1
1	惡性腫瘤	83	248.85	138.39	1.11	31.0	1	惡性腫瘤	53	315.95	190.13	1.12	33.8	1	惡性腫瘤	30	180.96	92.83	1.11	27.0
2	糖尿病	27	80.95	37.20*+	1.95*	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	107.30	55.33	1.24	11.5	2	糖尿病	14	84.45	33.70	1.99*	12.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	80.95	36.16	0.98	10.1	3	糖尿病	13	77.50	41.47	1.90*	8.3	3	肺炎	11	66.35	19.21	1.10	9.9
4	肺炎	23	68.96	26.12	0.95	8.6	4	肺炎	12	71.54	34.86	0.85	7.6	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	54.29	22.47	0.69	8.1
5	腦血管疾病	18	53.97	23.27	1.12	6.7	5	腦血管疾病	11	65.57	35.69	1.15	7.0	5	腦血管疾病	7	42.22	11.64	1.08	6.3
6	事故傷害	12	35.98	19.03	1.00	4.5	6	事故傷害	10	59.61	34.12	1.10	6.4	6	高血壓性疾病	6	36.19	14.12	1.11	5.4
7	高血壓性疾病	11	32.98	15.34	1.15	4.1	7	高血壓性疾病	5	29.81	16.39	1.21	3.2	7	慢性下呼吸道疾病	6	36.19	11.66	1.75	5.4
8	慢性下呼吸道疾病	9	26.98	10.85	0.78	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	29.81	15.13	1.18	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.10	6.09	0.62	2.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	23.99	10.07	0.88	3.0	9	慢性肝病及肝硬化	4	23.85	16.60	0.85	2.5	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.06	6.04	2.21	1.8
10	慢性肝病及肝硬化	5	14.99	9.95	0.76	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.88	11.21	0.94	1.9	10	事故傷害	2	12.06	6.04	0.69	1.8
	其他非十大死因	45	134.92	66.96*-	0.73*	16.8		其他非十大死因	23	137.11	77.62*-	0.62*	14.6		其他非十大死因	21	126.67	52.91	0.70	18.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	8.99	5.44	0.62	1.1	11	慢性下呼吸道疾病	3	17.88	9.35*-	0.37	1.9	11	帕金森病	1	6.03	3.53	1.30	0.9
12	疝氣及腸阻塞	3	8.99	3.75	4.39	1.1	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	17.88	8.86	1.75	1.9	12	慢性肝病及肝硬化	1	6.03	3.53	0.54	0.9
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	8.99	3.75	1.03	1.1	13	結核病	2	11.92	7.27	2.89	1.3	13	主動脈瘤及剝離	1	6.03	3.05	2.04	0.9
14	結核病	2	6.00	3.45	2.08	0.7	14	疝氣及腸阻塞	2	11.92	5.99	7.85	1.3	14	腸道感染症	1	6.03	2.03	7.96	0.9
15	帕金森病	2	6.00	3.45	1.05	0.7	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.96	3.88	0.88	0.6	15	病毒性肝炎	1	6.03	2.03	7.60	0.9

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,353.0人 男性16,775.0人 女性16,578.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	835	669.95	362.71*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	490	793.45	485.22*-	0.92	100.0		所有死亡原因	345	548.67	254.12	0.94	100.0
	十大主要死因	635	509.48	274.06*-	0.93	76.0		十大主要死因	387	626.66	385.08	0.92	79.0		十大主要死因	252	400.77	180.91	0.93	73.0
1	惡性腫瘤	235	188.55	111.14	0.90	28.1	1	惡性腫瘤	159	257.46	160.24	0.96	32.4	1	惡性腫瘤	76	120.87	68.64	0.80	22.0
2	肺炎	88	70.61	33.89	1.12	10.5	2	肺炎	62	100.40	56.39	1.31*	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	71.57	30.00	1.08	13.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	84	67.40	34.55	0.91	10.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	63.15	38.32	0.78	8.0	3	肺炎	26	41.35	15.97	0.84	7.5
4	慢性下呼吸道疾病	48	38.51	18.52	1.29	5.7	4	慢性下呼吸道疾病	31	50.20	28.42	1.16	6.3	4	衰老/老邁	22	34.99	11.83*+	3.41*	6.4
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	38	30.49	14.55	1.28	4.6	5	事故傷害	23	37.24	26.21*-	0.72	4.7	5	腦血管疾病	20	31.81	13.56	0.96	5.8
6	腦血管疾病	37	29.69	15.93*-	0.68*	4.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	32.39	17.98	1.40	4.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	28.63	11.83	1.17	5.2
7	衰老/老邁	31	24.87	10.60*+	2.66*	3.7	7	腦血管疾病	17	27.53	17.78*-	0.52*	3.5	7	慢性下呼吸道疾病	17	27.04	10.08	1.59	4.9
8	事故傷害	30	24.07	15.81*-	0.70*	3.6	8	糖尿病	17	27.53	16.29	0.72	3.5	8	糖尿病	13	20.67	8.63*-	0.57*	3.8
9	糖尿病	30	24.07	12.27*-	0.64*	3.6	9	慢性肝病及肝硬化	10	16.19	10.17*-	0.60	2.0	9	高血壓性疾病	8	12.72	4.23*-	0.47*	2.3
10	慢性肝病及肝硬化	14	11.23	6.80*-	0.59*	1.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	9	14.57	13.28	0.78	1.8	10	事故傷害	7	11.13	6.14	0.67	2.0
	其他非十大死因	200	160.47	88.65*-	0.88	24.0		其他非十大死因	103	166.79	100.14	0.91	21.0		其他非十大死因	93	147.90	73.21	0.98	27.0
11	高血壓性疾病	13	10.43	4.68*-	0.41*	1.6	11	衰老/老邁	9	14.57	8.25	1.73	1.8	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	9.54	4.03	1.50	1.7
12	蓄意自我傷害(自殺)	12	9.63	8.87	0.69	1.4	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	8.10	5.26	0.86	1.0	12	敗血症	5	7.95	3.94	0.83	1.4
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	11	8.83	4.77	1.13	1.3	13	高血壓性疾病	5	8.10	4.71*-	0.35*	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	5	7.95	3.21	0.71	1.4
14	敗血症	8	6.42	3.32	0.71	1.0	14	帕金森病	5	8.10	4.34	1.33	1.0	14	慢性肝病及肝硬化	4	6.36	3.80	0.63	1.2
15	血管性及未明示之癱瘓症	7	5.62	2.49	0.65	0.8	15	胃及十二指腸潰瘍	4	6.48	3.77	2.33	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	6.36	2.68	1.29	1.2

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計124,635.5人 男性61,756.5人 女性62,879.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	417	758.18	391.77	0.99	100.0		所有死亡原因	243	874.01	549.15	1.03	100.0		所有死亡原因	174	639.80	251.42	0.96	100.0
	十大主要死因	329	598.18	317.38	1.02	78.9		十大主要死因	208	748.12	469.85	1.12	85.6		十大主要死因	126	463.30	188.32	0.96	72.4
1	惡性腫瘤	117	212.73	125.60	1.01	28.1	1	惡性腫瘤	80	287.74	184.53	1.11	32.9	1	惡性腫瘤	37	136.05	74.14	0.87	21.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	81.82	35.70	1.03	10.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	93.52	53.96	1.18	10.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	69.86	23.22	0.88	10.9
3	肺炎	40	72.73	32.87	1.05	9.6	3	肺炎	23	82.72	49.12	1.10	9.5	3	肺炎	17	62.51	19.23	1.00	9.8
4	慢性下呼吸道疾病	28	50.91	22.94	1.54*	6.7	4	慢性下呼吸道疾病	21	75.53	42.08	1.76*	8.6	4	腦血管疾病	10	36.77	14.83	0.94	5.7
5	腦血管疾病	20	36.36	20.90	0.79	4.8	5	事故傷害	11	39.56	27.72	0.77	4.5	5	高血壓性疾病	10	36.77	10.57	1.11	5.7
6	高血壓性疾病	19	34.55	16.74	1.25	4.6	6	腦血管疾病	10	35.97	25.91	0.69	4.1	6	糖尿病	8	29.42	11.91	0.71	4.6
7	糖尿病	17	30.91	17.18	0.79	4.1	7	慢性肝病及肝硬化	10	35.97	24.72	1.34	4.1	7	慢性下呼吸道疾病	7	25.74	11.53	1.22	4.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	29.09	13.04	1.13	3.8	8	糖尿病	9	32.37	22.33	0.88	3.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.74	8.04	0.90	4.0
9	事故傷害	14	25.45	17.08	0.74	3.4	9	高血壓性疾病	9	32.37	21.04	1.44	3.7	9	敗血症	7	25.74	6.45	2.27	4.0
10	慢性肝病及肝硬化	13	23.64	15.32	1.25	3.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	32.37	18.45	1.42	3.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.71	8.41	1.58	2.3
	其他非十大死因	88	160.00	74.38*-	0.90	21.1		其他非十大死因	35	125.89	79.30*-	0.71*	14.4		其他非十大死因	48	176.50	63.10	0.96	27.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	16.36	9.53	1.17	2.2	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	17.98	11.06	0.98	2.1	11	皮膚及皮下組織疾病	4	14.71	5.08	5.06*	2.3
12	敗血症	9	16.36	5.59	1.68	2.2	12	衰老/老邁	3	10.79	5.33	1.28	1.2	12	事故傷害	3	11.03	7.36	0.65	1.7
13	衰老/老邁	6	10.91	3.43	0.99	1.4	13	敗血症	2	7.19	3.64	0.87	0.8	13	慢性肝病及肝硬化	3	11.03	5.77	1.05	1.7
14	皮膚及皮下組織疾病	5	9.09	4.05	3.45*	1.2	14	病毒性肝炎	1	3.60	2.83	1.40	0.4	14	帕金森病	3	11.03	3.07	2.46	1.7
15	帕金森病	4	7.27	2.51	1.35	1.0	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	3.60	2.67	0.68	0.4	15	衰老/老邁	3	11.03	2.53	0.80	1.7

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計54,999.5人 男性27,803.0人 女性27,196.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	425	1,037.09	423.00	1.09	100.0		所有死亡原因	264	1,256.37	568.99	1.10	100.0		所有死亡原因	161	806.29	283.91	1.05	100.0
	十大主要死因	350	854.08	335.48	1.19*	82.4		十大主要死因	217	1,032.69	460.83	1.16*	82.2		十大主要死因	133	666.07	225.69	1.21*	82.6
1	惡性腫瘤	100	244.02	109.29	0.95	23.5	1	惡性腫瘤	66	314.09	152.76	0.94	25.0	1	惡性腫瘤	34	170.27	67.07	0.94	21.1
2	肺炎	58	141.53	47.76*+	1.56*	13.6	2	肺炎	39	185.60	67.38*+	1.65*	14.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	105.17	32.08	1.15	13.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	107.37	39.41	1.07	10.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	109.46	46.62	1.00	8.7	3	肺炎	19	95.15	31.51	1.33	11.8
4	糖尿病	37	90.29	35.88*+	1.82*	8.7	4	糖尿病	20	95.18	42.72*+	1.92*	7.6	4	糖尿病	17	85.14	28.88	1.74*	10.6
5	慢性下呼吸道疾病	28	68.33	22.66	1.59*	6.6	5	慢性下呼吸道疾病	19	90.42	34.04	1.37	7.2	5	高血壓性疾病	14	70.11	22.28	1.83	8.7
6	高血壓性疾病	24	58.57	20.58	1.66*	5.6	6	腦血管疾病	15	71.38	29.52	1.01	5.7	6	慢性下呼吸道疾病	9	45.07	12.10	1.85	5.6
7	腦血管疾病	22	53.68	19.79	0.93	5.2	7	事故傷害	10	47.59	32.39	0.79	3.8	7	腦血管疾病	7	35.06	10.87	0.77	4.3
8	事故傷害	15	36.60	22.41	0.93	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	47.59	20.30	1.45	3.8	8	事故傷害	5	25.04	11.63	1.31	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	31.72	11.75	0.96	3.1	9	高血壓性疾病	10	47.59	18.79	1.52	3.8	9	血管性及未明示之癱瘓症	4	20.03	4.14	1.22	2.5
10	血管性及未明示之癱瘓症	9	21.96	5.94	1.66	2.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	23.79	16.31	1.15	1.9	10	敗血症	3	15.02	5.12	1.15	1.9
	其他非十大死因	75	183.02	87.53	0.80*	17.6		其他非十大死因	47	223.67	108.16	0.89	17.8		其他非十大死因	28	140.22	58.22	0.64*	17.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	17.08	12.26	1.12	1.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	5	23.79	8.12	2.46	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.02	4.24*-	0.45	1.9
12	慢性肝病及肝硬化	5	12.20	7.48	0.56	1.2	12	慢性肝病及肝硬化	4	19.04	10.71	0.63	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.02	8.23	1.01	1.2
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	12.20	5.45	1.91	1.2	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	14.28	6.82	2.19	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.02	4.09	1.63	1.2
14	敗血症	5	12.20	4.71	0.98	1.2	14	主動脈瘤及剝離	3	14.28	4.85	1.88	1.1	14	慢性肝病及肝硬化	1	5.01	4.52	0.40	0.6
15	主動脈瘤及剝離	3	7.32	2.26	1.35	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.52	5.61	0.74	0.8	15	流行性感胃	1	5.01	1.03	5.68	0.6

附 註：1.彰化縣田中鎮年中人口數 計40,980.5人 男性21,013.0人 女性19,967.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	533	1,068.54	461.41*+	1.06	100.0		所有死亡原因	323	1,261.97	641.79*+	1.16*	100.0		所有死亡原因	210	864.70	292.96	0.94	100.0
	十大主要死因	411	823.96	351.65*+	1.08	77.1		十大主要死因	254	992.38	495.27*+	1.17*	78.6		十大主要死因	160	658.82	228.59	0.99	76.2
1	惡性腫瘤	146	292.70	141.91	1.10	27.4	1	惡性腫瘤	107	418.05	216.02*+	1.28*	33.1	1	惡性腫瘤	39	160.59	72.67	0.80	18.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	72	144.34	49.41	1.35*	13.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	152.37	66.72	1.48*	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	135.88	33.07	1.21	15.7
3	腦血管疾病	37	74.18	29.50	1.21	6.9	3	腦血管疾病	26	101.58	48.82	1.51	8.0	3	肺炎	22	90.59	15.75	1.01	10.5
4	肺炎	36	72.17	21.16*-	0.74	6.8	4	事故傷害	21	82.05	49.59	1.38	6.5	4	糖尿病	13	53.53	12.08	0.91	6.2
5	事故傷害	28	56.13	39.48	1.38	5.3	5	肺炎	14	54.70	24.53*-	0.53*	4.3	5	高血壓性疾病	13	53.53	10.38	1.13	6.2
6	糖尿病	26	52.12	18.06	0.99	4.9	6	糖尿病	13	50.79	23.62	1.06	4.0	6	腦血管疾病	11	45.29	13.30	0.83	5.2
7	慢性下呼吸道疾病	20	40.10	10.74	0.86	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	13	50.79	19.31	0.85	4.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	37.06	10.82	0.90	4.3
8	高血壓性疾病	18	36.09	10.47	0.96	3.4	8	慢性肝病及肝硬化	8	31.26	18.43	1.03	2.5	8	事故傷害	7	28.82	31.17	1.39	3.3
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	32.08	10.68	0.90	3.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	27.35	11.12	0.89	2.2	9	慢性下呼吸道疾病	7	28.82	4.92	0.94	3.3
10	蓄意自我傷害(自殺)	12	24.06	20.25	1.55	2.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	23.44	17.10	1.14	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	24.71	24.43	2.44	2.9
	其他非十大死因	122	244.58	109.76	1.01	22.9		其他非十大死因	69	269.58	146.52	1.14	21.4		其他非十大死因	50	205.88	64.36	0.83	23.8
11	慢性肝病及肝硬化	10	20.05	10.97	0.91	1.9	11	高血壓性疾病	5	19.54	8.92	0.67	1.5	11	主動脈瘤及剝離	3	12.35	4.80	3.12	1.4
12	主動脈瘤及剝離	6	12.03	4.93	2.08	1.1	12	敗血症	4	15.63	6.90	1.43	1.2	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	12.35	2.30	0.59	1.4
13	結核病	6	12.03	4.72	3.09*	1.1	13	結核病	4	15.63	6.53	3.06	1.2	13	結核病	2	8.24	3.90	3.35	1.0
14	帕金森病	5	10.02	3.64	1.29	0.9	14	病毒性肝炎	3	11.72	6.35	3.84	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.24	3.64	0.85	1.0
15	敗血症	5	10.02	3.56	0.75	0.9	15	主動脈瘤及剝離	3	11.72	5.31	1.56	0.9	15	帕金森病	2	8.24	2.50	1.27	1.0

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計49,881.0人 男性25,595.0人 女性24,286.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	107	640.76	333.78	0.81*	100.0		所有死亡原因	61	710.54	423.47*-	0.76*	100.0		所有死亡原因	46	566.92	242.49	0.87	100.0
	十大主要死因	90	538.95	277.18	0.93	84.1		十大主要死因	50	582.41	348.85	0.92	82.0		十大主要死因	41	505.30	224.85	1.09	89.1
1	惡性腫瘤	32	191.63	98.78	0.88	29.9	1	惡性腫瘤	15	174.72	98.67*-	0.62	24.6	1	惡性腫瘤	17	209.51	97.80	1.34	37.0
2	肺炎	13	77.85	34.07	1.08	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	93.19	45.11	1.05	13.1	2	肺炎	6	73.95	24.73	1.25	13.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	65.87	26.25	0.80	10.3	3	肺炎	7	81.54	43.99	0.95	11.5	3	高血壓性疾病	4	49.30	13.52	1.57	8.7
4	高血壓性疾病	10	59.88	27.63	2.12*	9.3	4	高血壓性疾病	6	69.89	39.70	2.78*	9.8	4	腦血管疾病	3	36.97	14.34	0.97	6.5
5	事故傷害	5	29.94	38.07	0.84	4.7	5	事故傷害	3	34.94	43.40	0.65	4.9	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	36.97	10.39*-	0.48	6.5
6	糖尿病	4	23.95	13.12	0.59	3.7	6	血管性及未明示之癱瘓症	3	34.94	17.03	4.98*	4.9	6	事故傷害	2	24.65	30.91	1.47	4.3
7	腦血管疾病	4	23.95	11.15*-	0.50	3.7	7	蓄意自我傷害(自殺)	2	23.30	21.11	1.21	3.3	7	糖尿病	2	24.65	10.11	0.60	4.3
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.95	9.77	0.90	3.7	8	糖尿病	2	23.30	16.34	0.58	3.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	24.65	7.25	0.89	4.3
9	血管性及未明示之癱瘓症	4	23.95	9.31	2.35	3.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	23.30	12.45	0.91	3.3	9	帕金森病	1	12.32	8.71	2.78	2.2
10	慢性肝病及肝硬化	3	17.97	9.03	0.91	2.8	10	敗血症	2	23.30	11.04	2.52	3.3	10	慢性肝病及肝硬化	1	12.32	7.09	1.17	2.2
	其他非十大死因	17	101.80	56.60*-	0.49*	15.9		其他非十大死因	11	128.13	74.62*-	0.43*	18.0		其他非十大死因	5	61.62	17.64*-	0.33*	10.9
11	敗血症	3	17.97	7.16	1.78	2.8	11	慢性肝病及肝硬化	2	23.30	11.04	0.81	3.3	11	皮膚及皮下組織疾病	1	12.32	3.13	4.43	2.2
12	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.98	10.30	0.83	1.9	12	胃及十二指腸潰瘍	1	11.65	9.38	3.73	1.6	12	敗血症	1	12.32	3.13	1.12	2.2
13	胃及十二指腸潰瘍	1	5.99	4.86	2.47	0.9	13	慢性下呼吸道疾病	1	11.65	8.46	0.24	1.6	13	血管性及未明示之癱瘓症	1	12.32	3.13	0.92	2.2
14	帕金森病	1	5.99	4.29	1.07	0.9	14	主動脈瘤及剝離	1	11.65	6.46	1.85	1.6							
15	慢性下呼吸道疾病	1	5.99	4.29*-	0.18*	0.9	15	腦血管疾病	1	11.65	6.04*-	0.20	1.6							

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計16,699.0人 男性8,585.0人 女性8,114.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	261	694.26	410.11	1.01	100.0		所有死亡原因	169	886.30	604.31	1.12	100.0		所有死亡原因	92	496.57	238.94	0.86	100.0
	十大主要死因	207	550.62	322.96	1.07	79.3		十大主要死因	137	718.48	485.95	1.17	81.1		十大主要死因	74	399.42	186.60	0.93	80.4
1	惡性腫瘤	74	196.84	121.45	1.01	28.4	1	惡性腫瘤	49	256.98	175.11	1.05	29.0	1	惡性腫瘤	25	134.94	71.91	0.95	27.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	66.50	37.28	0.94	9.6	2	肺炎	16	83.91	52.28	1.22	9.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	59.37	25.72	0.88	12.0
3	肺炎	23	61.18	33.49	1.01	8.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	73.42	50.06	0.99	8.3	3	肺炎	7	37.78	20.26	0.73	7.6
4	腦血管疾病	16	42.56	26.34	1.03	6.1	4	事故傷害	11	57.69	49.94	1.15	6.5	4	高血壓性疾病	7	37.78	14.84	1.37	7.6
5	高血壓性疾病	16	42.56	23.10	1.75	6.1	5	腦血管疾病	11	57.69	40.17	1.19	6.5	5	腦血管疾病	5	26.99	13.62	0.81	5.4
6	事故傷害	15	39.90	31.20	1.20	5.7	6	慢性下呼吸道疾病	11	57.69	33.54	1.48	6.5	6	糖尿病	5	26.99	11.27	0.75	5.4
7	慢性下呼吸道疾病	14	37.24	16.51	1.30	5.4	7	高血壓性疾病	9	47.20	31.67	2.22*	5.3	7	事故傷害	4	21.59	12.68	1.38	4.3
8	糖尿病	10	26.60	13.21	0.76	3.8	8	敗血症	6	31.47	17.49	4.13*	3.6	8	血管性及未明示之癱瘓症	4	21.59	6.25	1.84	4.3
9	敗血症	8	21.28	8.75	2.46*	3.1	9	慢性肝病及肝硬化	5	26.22	19.32	0.98	3.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.19	5.35	0.66	3.3
10	慢性肝病及肝硬化	6	15.96	11.61	0.87	2.3	10	糖尿病	5	26.22	16.36	0.77	3.0	10	慢性下呼吸道疾病	3	16.19	4.69	0.92	3.3
	其他非十大死因	54	143.64	87.15	0.82	20.7		其他非十大死因	32	167.82	118.36	0.93	18.9		其他非十大死因	18	97.16	52.34	0.64	19.6
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	13.30	6.05*-	0.59	1.9	11	衰老/老邁	5	26.22	14.12	3.44*	3.0	11	敗血症	2	10.80	3.13	1.11	2.2
12	衰老/老邁	5	13.30	5.03	1.42	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	20.98	17.47	1.16	2.4	12	源於周產期的特定病況	1	5.40	8.85	2.32	1.1
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	10.64	8.46	0.77	1.5	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.49	12.76	2.09	1.2	13	慢性肝病及肝硬化	1	5.40	3.18	0.57	1.1
14	血管性及未明示之癱瘓症	4	10.64	4.02	1.25	1.5	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	10.49	6.61	0.50	1.2	14	腸道感染症	1	5.40	1.56	8.43	1.1
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.32	6.56	1.09	0.8	15	主動脈瘤及剝離	2	10.49	6.10	1.97	1.2	15	貧血	1	5.40	1.56	4.54	1.1

附 註：1.彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,594.5人 男性19,067.5人 女性18,527.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	392	841.67	437.17	1.01	100.0		所有死亡原因	233	960.51	563.91	1.03	100.0		所有死亡原因	159	712.49	319.06	0.97	100.0
	十大主要死因	303	650.58	317.04	1.05	77.3		十大主要死因	189	779.12	439.21	1.08	81.1		十大主要死因	117	524.29	216.04	0.99	73.6
1	惡性腫瘤	107	229.74	120.88	1.02	27.3	1	惡性腫瘤	75	309.18	177.12	1.10	32.2	1	惡性腫瘤	32	143.39	67.99	0.85	20.1
2	衰老/老邁	37	79.44	25.44*+	6.28*	9.4	2	肺炎	25	103.06	55.37	1.20	10.7	2	衰老/老邁	20	89.62	21.97*+	5.85*	12.6
3	肺炎	34	73.00	32.72	0.94	8.7	3	衰老/老邁	17	70.08	30.58*+	6.87*	7.3	3	腦血管疾病	15	67.22	26.05	1.56	9.4
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	57.97	25.32*-	0.66*	6.9	4	事故傷害	14	57.71	40.27	1.06	6.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	67.22	22.97	0.77	9.4
5	腦血管疾病	24	51.53	25.83	1.02	6.1	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	49.47	27.31*-	0.56*	5.2	5	肺炎	9	40.33	13.68	0.58	5.7
6	事故傷害	20	42.94	30.40	1.18	5.1	6	慢性下呼吸道疾病	12	49.47	26.43	1.00	5.2	6	事故傷害	6	26.89	20.80	1.51	3.8
7	糖尿病	16	34.35	16.49	0.80	4.1	7	糖尿病	11	45.35	23.85	1.13	4.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	26.89	11.94	0.85	3.8
8	慢性下呼吸道疾病	15	32.21	13.46	0.87	3.8	8	腦血管疾病	9	37.10	24.25	0.65	3.9	8	慢性肝病及肝硬化	5	22.41	11.31	1.95	3.1
9	慢性肝病及肝硬化	12	25.77	13.73	1.29	3.1	9	高血壓性疾病	7	28.86	17.22	1.14	3.0	9	糖尿病	5	22.41	11.13	0.49	3.1
10	高血壓性疾病	11	23.62	12.77	0.77	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	7	28.86	16.83	1.01	3.0	10	高血壓性疾病	4	17.92	8.19	0.49	2.5
	其他非十大死因	89	191.09	120.13	0.91	22.7		其他非十大死因	44	181.38	124.69	0.86	18.9		其他非十大死因	42	188.21	103.02	0.92	26.4
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	21.47	10.38	0.75	2.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	16.49	13.26	0.85	1.7	11	敗血症	4	17.92	4.22	1.43	2.5
12	敗血症	6	12.88	5.11	1.19	1.5	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	16.49	8.63	0.64	1.7	12	源於周產期的特定病況	3	13.44	29.03	7.63*	1.9
13	蓄意自我傷害(自殺)	5	10.74	8.57	0.73	1.3	13	主動脈瘤及剝離	3	12.37	5.97	1.98	1.3	13	慢性下呼吸道疾病	3	13.44	2.78*-	0.57	1.9
14	源於周產期的特定病況	3	6.44	13.81	5.24*	0.8	14	病毒性肝炎	2	8.24	7.00	3.03	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.96	5.50	1.15	1.3
15	病毒性肝炎	3	6.44	4.92	3.63	0.8	15	敗血症	2	8.24	5.18	0.89	0.9	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	8.96	3.07	0.56	1.3

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計46,573.5人 男性24,258.0人 女性22,315.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	299	767.26	420.29	1.05	00.0		所有死亡原因	184	916.11	579.92	1.09	00.0		所有死亡原因	115	608.95	273.98	0.98	00.0
	十大主要死因	226	579.93	320.66	1.04	75.6		十大主要死因	150	746.83	478.62	1.13	81.5		十大主要死因	79	418.32	203.11	1.04	68.7
1	惡性腫瘤	82	210.42	124.83	1.02	27.4	1	惡性腫瘤	53	263.88	165.54	1.01	28.8	1	惡性腫瘤	29	153.56	90.85	1.02	25.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	92.38	50.64	1.22	12.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	104.56	69.85	1.33	11.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	79.43	30.94	1.09	13.0
3	肺炎	28	71.85	32.93	1.10	9.4	3	肺炎	16	79.66	49.02	1.08	8.7	3	肺炎	12	63.54	19.42	1.12	10.4
4	腦血管疾病	16	41.06	21.77	0.93	5.4	4	慢性下呼吸道疾病	13	64.72	36.07	1.55	7.1	4	腦血管疾病	7	37.07	15.29	1.02	6.1
5	慢性下呼吸道疾病	14	35.93	15.82	1.16	4.7	5	事故傷害	10	49.79	35.40	0.96	5.4	5	高血壓性疾病	5	26.48	11.97	0.88	4.3
6	事故傷害	13	33.36	21.68	0.97	4.3	6	腦血管疾病	9	44.81	26.65	0.87	4.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	21.18	6.66	0.80	3.5
7	高血壓性疾病	13	33.36	16.25	1.29	4.3	7	高血壓性疾病	8	39.83	23.45	1.79	4.3	7	事故傷害	3	15.89	8.82	0.97	2.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	23.09	9.17	0.95	3.0	8	慢性肝病及肝硬化	7	34.85	24.94	1.27	3.8	8	胃及十二指腸潰瘍	2	10.59	3.33	6.21	1.7
9	糖尿病	8	20.53	12.22	0.55	2.7	9	糖尿病	7	34.85	22.46	0.95	3.8	9	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.30	11.08	6.37	0.9
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	17.96	15.35	1.28	2.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	29.87	25.24	1.60	3.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.30	4.76	0.57	0.9
	其他非十大死因	73	187.32	99.63	1.07	24.4		其他非十大死因	34	169.28	101.31	0.95	18.5		其他非十大死因	36	190.63	70.87	0.86	31.3
11	慢性肝病及肝硬化	7	17.96	12.96	0.95	2.3	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	24.89	12.98	1.11	2.7	11	流行性感冒	1	5.30	3.04	7.45	0.9
12	帕金森病	4	10.26	4.44	2.02	1.3	12	結核病	3	14.94	10.01	4.27	1.6	12	疝氣及腸阻塞	1	5.30	1.94	2.14	0.9
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.70	5.41	1.49	1.0	13	帕金森病	3	14.94	7.83	2.56	1.6	13	帕金森病	1	5.30	1.94	1.26	0.9
14	結核病	3	7.70	4.55	3.01	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.96	8.67	1.89	1.1	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.30	1.94	1.04	0.9
15	主動脈瘤及剝離	3	7.70	3.42	1.82	1.0	15	主動脈瘤及剝離	2	9.96	5.23	1.75	1.1	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.30	1.94	0.78	0.9

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計38,970.0人 男性20,085.0人 女性18,885.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	349	768.74	404.02	1.04	00.0		所有死亡原因	185	793.99	492.46	0.92	00.0		所有死亡原因	164	742.15	312.78	1.23*	00.0
	十大主要死因	269	592.52	316.05	1.04	77.1		十大主要死因	145	622.32	390.95	0.92	78.4		十大主要死因	128	579.24	252.98*+	1.41*	78.0
1	惡性腫瘤	102	224.67	131.97	1.06	29.2	1	惡性腫瘤	61	261.80	170.52	0.98	33.0	1	惡性腫瘤	41	185.54	95.10	1.21	25.0
2	肺炎	28	61.68	27.10	0.97	8.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	55.79	35.28	0.69	7.0	2	高血壓性疾病	16	72.40	27.28*+	2.56*	9.8
3	高血壓性疾病	27	59.47	27.53*+	2.31*	7.7	3	肺炎	13	55.79	30.97	0.74	7.0	3	肺炎	15	67.88	23.01	1.30	9.1
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	57.27	29.89	0.76	7.4	4	腦血管疾病	12	51.50	30.50	0.97	6.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	58.83	23.51	0.85	7.9
5	腦血管疾病	22	48.46	26.12	1.10	6.3	5	高血壓性疾病	11	47.21	26.75	2.04*	5.9	5	腦血管疾病	10	45.25	22.35	1.30	6.1
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	41.85	21.03	1.74*	5.4	6	事故傷害	10	42.92	28.91	0.81	5.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	45.25	18.54	1.79	6.1
7	事故傷害	15	33.04	20.57	0.94	4.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	38.63	22.61	1.68	4.9	7	敗血症	6	27.15	12.24	2.70	3.7
8	慢性肝病及肝硬化	11	24.23	12.47	1.24	3.2	8	慢性下呼吸道疾病	6	25.75	14.44	0.60	3.2	8	慢性肝病及肝硬化	6	27.15	11.49	2.66	3.7
9	慢性下呼吸道疾病	10	22.03	9.54	0.73	2.9	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	21.46	18.01	1.12	2.7	9	衰老/老邁	6	27.15	7.98	2.47	3.7
10	糖尿病	9	19.82	9.84*-	0.53*	2.6	10	糖尿病	5	21.46	12.96	0.57	2.7	10	事故傷害	5	22.63	11.48	1.36	3.0
	其他非十大死因	80	176.22	87.96	1.05	22.9		其他非十大死因	40	171.67	101.52	0.91	21.6		其他非十大死因	36	162.91	59.79*-	0.85	22.0
11	敗血症	8	17.62	9.36	1.92	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	5	21.46	12.49	0.75	2.7	11	糖尿病	4	18.10	6.30*-	0.48	2.4
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	17.62	8.67	2.23	2.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	21.46	11.68	2.32	2.7	12	慢性下呼吸道疾病	4	18.10	5.81	1.01	2.4
13	衰老/老邁	8	17.62	6.52	1.83	2.3	13	敗血症	2	8.58	5.66	1.03	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	13.58	7.25	2.06	1.8
14	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.01	9.24	0.76	1.4	14	結核病	2	8.58	5.29	2.36	1.1	14	皮膚及皮下組織疾病	2	9.05	3.94	3.69	1.2
15	主動脈瘤及剝離	2	4.41	2.65	1.03	0.6	15	帕金森病	2	8.58	4.90	1.44	1.1	15	主動脈瘤及剝離	1	4.53	2.31	1.71	0.6

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,399.0人 男性23,300.5人 女性22,098.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	248	1,065.02	463.03	1.07	00.0		所有死亡原因	146	1,191.64	612.53	1.06	00.0		所有死亡原因	102	924.50	305.84	1.05	00.0
	十大主要死因	201	863.18	371.88*+	1.16*	81.0		十大主要死因	117	954.95	487.26	1.09	80.1		十大主要死因	90	815.73	256.99	1.27*	88.2
1	惡性腫瘤	57	244.78	126.19	0.93	23.0	1	惡性腫瘤	39	318.32	175.81	0.95	26.7	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	172.21	50.58	1.60	18.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	154.60	55.83	1.45*	14.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	138.75	60.28	1.29	11.6	2	惡性腫瘤	18	163.15	74.83	0.84	17.6
3	肺炎	25	107.36	33.95	1.11	10.1	3	肺炎	16	130.59	55.58	1.20	11.0	3	高血壓性疾病	10	90.64	22.03	1.98	9.8
4	糖尿病	19	81.59	30.93	1.57	7.7	4	糖尿病	9	73.46	37.86	1.50	6.2	4	糖尿病	10	90.64	21.83	1.62	9.8
5	高血壓性疾病	16	68.71	23.10	1.83*	6.5	5	腦血管疾病	8	65.30	32.21	0.94	5.5	5	肺炎	9	81.57	13.03	0.94	8.8
6	慢性下呼吸道疾病	14	60.12	21.12	1.30	5.6	6	事故傷害	7	57.13	39.97	0.95	4.8	6	慢性下呼吸道疾病	7	63.45	24.04	2.17	6.9
7	腦血管疾病	13	55.83	22.12	0.92	5.2	7	慢性下呼吸道疾病	7	57.13	20.56	0.90	4.8	7	腦血管疾病	5	45.32	12.76	0.86	4.9
8	事故傷害	8	34.36	23.58	0.85	3.2	8	高血壓性疾病	6	48.97	21.32	1.61	4.1	8	血管性及未明示之癱瘓症	5	45.32	9.56	2.24	4.9
9	蓄意自我傷害(自殺)	7	30.06	17.56	1.94	2.8	9	慢性肝病及肝硬化	5	40.81	28.55	1.31	3.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	36.25	20.83	3.61	3.9
10	慢性肝病及肝硬化	6	25.77	17.51	1.17	2.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	24.49	15.11	1.17	2.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	27.19	7.48	0.70	2.9
	其他非十大死因	47	201.84	91.15	0.79	19.0		其他非十大死因	29	236.70	125.27	0.96	19.9		其他非十大死因	12	108.76	48.85	0.45*	11.8
11	血管性及未明示之癱瘓症	6	25.77	6.51	1.79	2.4	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	16.32	5.43	2.50	1.4	11	疝氣及腸阻塞	2	18.13	7.00	5.15	2.0
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.18	5.45*-	0.49	1.6	12	衰老/老邁	2	16.32	4.85	1.24	1.4	12	衰老/老邁	2	18.13	2.90	0.93	2.0
13	衰老/老邁	4	17.18	3.63	1.06	1.6	13	源於周產期的特定病況	1	8.16	14.63	9.30	0.7	13	源於周產期的特定病況	1	9.06	19.57	5.14	1.0
14	疝氣及腸阻塞	3	12.88	5.86	4.80	1.2	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	8.16	8.95	25.22	0.7	14	慢性肝病及肝硬化	1	9.06	4.39	0.68	1.0
15	源於周產期的特定病況	2	8.59	16.74	6.35	0.8	15	疝氣及腸阻塞	1	8.16	4.47	4.25	0.7	15	事故傷害	1	9.06	3.77	0.45	1.0

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,285.5人 男性12,252.5人 女性11,033.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	283	748.88	390.84	0.99	100.0		所有死亡原因	165	850.52	520.24	1.00	100.0		所有死亡原因	118	641.65	273.01	0.98	100.0
	十大主要死因	197	521.30	274.66	0.90	69.6		十大主要死因	116	597.94	366.55	0.89	70.3		十大主要死因	83	451.33	203.40	0.96	70.3
1	惡性腫瘤	67	177.30	101.01	0.83	23.7	1	惡性腫瘤	41	211.34	126.16*-	0.80	24.8	1	惡性腫瘤	26	141.38	85.77	0.90	22.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	60.86	29.70	0.78	8.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	67.01	41.94	0.84	7.9	2	肺炎	11	59.82	20.60	0.99	9.3
3	肺炎	21	55.57	24.68	0.82	7.4	3	事故傷害	12	61.86	43.20	1.18	7.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	54.38	13.73*-	0.70	8.5
4	事故傷害	15	39.69	25.91	1.13	5.3	4	肺炎	10	51.55	29.19	0.70	6.1	4	糖尿病	8	43.50	14.78	1.06	6.8
5	糖尿病	15	39.69	18.01	1.03	5.3	5	腦血管疾病	9	46.39	28.06	0.89	5.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	38.06	16.01	1.36	5.9
6	腦血管疾病	14	37.05	18.91	0.82	4.9	6	慢性下呼吸道疾病	9	46.39	27.27	1.11	5.5	6	腦血管疾病	5	27.19	9.87	0.71	4.2
7	慢性下呼吸道疾病	14	37.05	16.98	1.16	4.9	7	慢性肝病及肝硬化	7	36.08	26.10	1.27	4.2	7	慢性下呼吸道疾病	5	27.19	9.25	1.33	4.2
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	31.75	16.71	1.26	4.2	8	糖尿病	7	36.08	20.27	0.98	4.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	21.75	18.23	2.29	3.4
9	慢性肝病及肝硬化	9	23.82	15.45	1.22	3.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	25.77	16.02	1.15	3.0	9	高血壓性疾病	4	21.75	5.23*-	0.68	3.4
10	高血壓性疾病	7	18.52	7.31	0.69	2.5	10	高血壓性疾病	3	15.46	8.32	0.68	1.8	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	16.31	9.93	2.31	2.5
	其他非十大死因	86	227.57	116.18	1.30*	30.4		其他非十大死因	49	252.58	153.69	1.43*	29.7		其他非十大死因	35	190.32	69.61	1.03	29.7
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	13.23	10.61	0.92	1.8	11	主動脈瘤及剝離	2	10.31	7.58	1.80	1.2	11	事故傷害	3	16.31	6.95	0.97	2.5
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	13.23	7.59	1.63	1.8	12	敗血症	2	10.31	7.58	1.27	1.2	12	慢性肝病及肝硬化	2	10.88	4.15	1.04	1.7
13	敗血症	4	10.58	5.39	1.10	1.4	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.31	6.92	1.95	1.2	13	敗血症	2	10.88	2.62	0.97	1.7
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	7.94	4.31	0.83	1.1	14	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	2	10.31	6.53	32.83*	1.2	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.44	6.23	6.27	0.8
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.94	4.23	1.50	1.1	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.31	6.10	1.78	1.2	15	皮膚及皮下組織疾病	1	5.44	3.37	1.95	0.8

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計37,790.5人 男性19,400.5人 女性18,390.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	335	1,045.21	424.12	1.06	100.0		所有死亡原因	202	1,198.96	600.32	1.11	100.0		所有死亡原因	133	874.77	259.40	0.97	100.0
	十大主要死因	261	814.33	327.68	1.10	77.9		十大主要死因	158	937.80	474.32	1.11	78.2		十大主要死因	107	703.76	209.68	1.09	80.5
1	惡性腫瘤	93	290.16	132.65	1.12	27.8	1	惡性腫瘤	61	362.06	189.31	1.12	30.2	1	惡性腫瘤	32	210.47	75.77	1.08	24.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	99.84	36.93	0.94	9.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	118.71	54.00	1.15	9.9	2	高血壓性疾病	14	92.08	24.15	1.96*	10.5
3	肺炎	31	96.72	27.36	1.00	9.3	3	肺炎	17	100.90	38.70	0.96	8.4	3	肺炎	14	92.08	19.84	1.03	10.5
4	高血壓性疾病	19	59.28	20.32	1.59	5.7	4	事故傷害	15	89.03	69.89	1.50	7.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	78.93	21.62	0.71	9.0
5	事故傷害	17	53.04	39.46	1.33	5.1	5	慢性下呼吸道疾病	10	59.35	24.39	0.98	5.0	5	糖尿病	8	52.62	17.89	0.93	6.0
6	腦血管疾病	17	53.04	18.77	0.88	5.1	6	腦血管疾病	9	53.42	21.56	0.79	4.5	6	腦血管疾病	8	52.62	17.31	0.98	6.0
7	慢性下呼吸道疾病	17	53.04	18.66	1.15	5.1	7	糖尿病	8	47.48	18.76	1.01	4.0	7	慢性下呼吸道疾病	7	46.04	16.43	1.53	5.3
8	糖尿病	16	49.92	17.56	0.97	4.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	47.48	17.70	1.52	4.0	8	敗血症	5	32.89	6.54	2.12	3.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	37.44	10.51	1.06	3.6	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	29.68	25.56	1.43	2.5	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.31	7.08	0.66	3.0
10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	21.84	5.48	1.99	2.1	10	高血壓性疾病	5	29.68	14.45	1.02	2.5	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	19.73	3.05	2.09	2.3
	其他非十大死因	74	230.88	96.43	0.95	22.1		其他非十大死因	44	261.16	126.00	1.10	21.8		其他非十大死因	26	171.01	49.72*-	0.68*	19.5
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	15.60	13.12	1.01	1.5	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	23.74	7.99	1.90	2.0	11	事故傷害	2	13.15	6.88	0.66	1.5
12	敗血症	5	15.60	3.88	1.19	1.5	12	慢性肝病及肝硬化	3	17.81	15.06	0.59	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.15	5.05	1.96	1.5
13	慢性肝病及肝硬化	4	12.48	9.82	0.57	1.2	13	帕金森病	3	17.81	8.63	2.04	1.5	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	13.15	2.76	0.63	1.5
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	12.48	5.65	1.92	1.2	14	皮膚及皮下組織疾病	3	17.81	7.32	5.80*	1.5	14	衰老/老邁	2	13.15	2.03	0.65	1.5
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	12.48	2.95	0.87	1.2	15	主動脈瘤及剝離	2	11.87	6.27	1.58	1.0	15	病毒性肝炎	1	6.58	3.72	7.05	0.8

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,051.0人 男性16,847.5人 女性15,203.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	300	867.25	436.64	1.10	00.0		所有死亡原因	180	1,012.83	587.98	1.12	00.0		所有死亡原因	120	713.44	289.11	1.07	00.0
	十大主要死因	226	653.33	334.87	1.08	75.3		十大主要死因	142	799.01	468.33	1.12	78.9		十大主要死因	88	523.19	209.64	1.13	73.3
1	惡性腫瘤	80	231.27	131.44	1.05	26.7	1	惡性腫瘤	52	292.60	174.10	1.05	28.9	1	惡性腫瘤	28	166.47	91.89	1.04	23.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	98.29	46.07	1.20	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	112.54	64.33	1.32	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	83.23	28.55	1.06	11.7
3	肺炎	22	63.60	25.38	0.90	7.3	3	慢性下呼吸道疾病	12	67.52	36.41	1.48	6.7	3	肺炎	11	65.40	20.04	1.07	9.2
4	腦血管疾病	17	49.14	22.80	1.04	5.7	4	腦血管疾病	11	61.90	33.15	1.12	6.1	4	糖尿病	7	41.62	15.55	1.00	5.8
5	糖尿病	16	46.25	24.32	1.15	5.3	5	肺炎	11	61.90	32.22	0.77	6.1	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	41.62	14.59	1.46	5.8
6	慢性下呼吸道疾病	15	43.36	18.57	1.29	5.0	6	糖尿病	9	50.64	31.65	1.28	5.0	6	腦血管疾病	6	35.67	12.35	0.92	5.0
7	高血壓性疾病	12	34.69	15.44	1.23	4.0	7	事故傷害	8	45.01	30.70	0.83	4.4	7	高血壓性疾病	5	29.73	10.05	0.91	4.2
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	31.80	15.65	1.21	3.7	8	慢性肝病及肝硬化	8	45.01	29.35	1.55	4.4	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	23.78	6.47	3.33	3.3
9	事故傷害	10	28.91	19.43	0.80	3.3	9	高血壓性疾病	7	39.39	21.64	1.62	3.9	9	胃及十二指腸潰瘍	3	17.84	5.07	9.90*	2.5
10	慢性肝病及肝硬化	9	26.02	15.78	1.30	3.0	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.51	14.79	0.93	2.2	10	血管性及未明示之癱呆症	3	17.84	5.07	1.27	2.5
	其他非十大死因	74	213.92	101.77	1.18	24.7		其他非十大死因	38	213.82	119.65	1.14	21.1		其他非十大死因	32	190.25	79.47	0.94	26.7
11	胃及十二指腸潰瘍	6	17.35	7.91*+	7.26*	2.0	11	胃及十二指腸潰瘍	3	16.88	9.57	5.73*	1.7	11	慢性下呼吸道疾病	3	17.84	4.20	0.86	2.5
12	血管性及未明示之癱呆症	5	14.45	6.25	1.43	1.7	12	血管性及未明示之癱呆症	2	11.25	6.88	1.76	1.1	12	疝氣及腸阻塞	2	11.89	8.52	4.54	1.7
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	14.45	5.70	1.71	1.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.63	3.48	0.58	0.6	13	事故傷害	2	11.89	7.65	0.69	1.7
14	疝氣及腸阻塞	2	5.78	4.29	2.87	0.7	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.63	3.48*-	0.29	0.6	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.89	6.15	2.20	1.7
15	蓄意自我傷害(自殺)	2	5.78	3.20*-	0.40	0.7	15	病毒性肝炎	1	5.63	3.33	2.02	0.6	15	加害(他殺)	1	5.95	6.23	12.97	0.8

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,592.5人 男性17,772.5人 女性16,820.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	353	967.76	471.08*+	1.17*	100.0		所有死亡原因	201	1,065.86	607.70	1.13	100.0		所有死亡原因	152	862.75	334.09	1.22*	100.0
	十大主要死因	283	775.85	368.65*+	1.22*	80.2		十大主要死因	167	885.57	493.38	1.18*	83.1		十大主要死因	119	675.45	252.38*+	1.32*	78.3
1	惡性腫瘤	113	309.79	149.29	1.34*	32.0	1	惡性腫瘤	66	349.98	191.83	1.21	32.8	1	惡性腫瘤	47	266.77	110.15	1.58*	30.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	120.63	54.20	1.40*	12.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	116.66	66.60	1.31	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	124.87	39.26	1.49	14.5
3	肺炎	20	54.83	23.12	0.73	5.7	3	事故傷害	13	68.94	51.78	1.25	6.5	3	高血壓性疾病	10	56.76	22.00	1.64	6.6
4	慢性下呼吸道疾病	18	49.35	17.04	1.37	5.1	4	肺炎	13	68.94	35.16	0.80	6.5	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	45.41	18.45	1.49	5.3
5	事故傷害	16	43.86	29.64	1.19	4.5	5	慢性下呼吸道疾病	13	68.94	31.24	1.40	6.5	5	糖尿病	8	45.41	18.39	1.02	5.3
6	腦血管疾病	16	43.86	20.31	0.88	4.5	6	慢性肝病及肝硬化	11	58.33	38.50	2.00	5.5	6	肺炎	7	39.73	12.83	0.61	4.6
7	糖尿病	15	41.12	18.79	0.96	4.2	7	腦血管疾病	11	58.33	30.30	1.00	5.5	7	腦血管疾病	5	28.38	11.16	0.68	3.3
8	高血壓性疾病	15	41.12	17.19	1.38	4.2	8	糖尿病	7	37.12	19.28	0.90	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	5	28.38	6.49	1.29	3.3
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	38.38	17.31	1.37	4.0	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31.82	16.35	1.23	3.0	9	敗血症	4	22.70	5.19	1.90	2.6
10	慢性肝病及肝硬化	12	32.90	21.76	1.61	3.4	10	高血壓性疾病	5	26.51	12.34	1.05	2.5	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.03	8.45	1.74	2.0
	其他非十大死因	70	191.91	102.43	1.00	19.8		其他非十大死因	34	180.29	114.32	0.92	16.9		其他非十大死因	33	187.31	81.71	0.96	21.7
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	19.19	11.52	1.30	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	21.21	14.02	1.08	2.0	11	事故傷害	3	17.03	5.37	0.95	2.0
12	敗血症	7	19.19	8.08	1.81	2.0	12	敗血症	3	15.91	9.81	1.71	1.5	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	17.03	3.90	1.15	2.0
13	膽結石及其他膽囊疾患	3	8.22	3.29	3.85	0.8	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.61	6.04	1.02	1.0	13	主動脈瘤及剝離	1	5.68	2.83	1.84	0.7
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	8.22	2.46	0.77	0.8	14	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.61	5.16	4.27	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.68	2.83	0.99	0.7
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.48	3.41	0.95	0.6	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.30	3.74	0.92	0.5	15	慢性肝病及肝硬化	1	5.68	2.77	0.49	0.7

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計36,475.5人 男性18,858.0人 女性17,617.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	372	875.21	428.33	1.05	100.0		所有死亡原因	202	925.29	523.98	0.96	100.0		所有死亡原因	170	822.29	329.62	1.18*	100.0
	十大主要死因	287	675.23	331.61	1.06	77.2		十大主要死因	160	732.90	411.46	0.97	79.2		十大主要死因	134	648.16	257.85*+	1.27*	78.8
1	惡性腫瘤	93	218.80	117.09	0.95	25.0	1	惡性腫瘤	49	224.45	125.87*-	0.76	24.3	1	惡性腫瘤	44	212.83	110.75	1.27	25.9
2	肺炎	54	127.05	53.31*+	1.67*	14.5	2	肺炎	35	160.32	82.42*+	1.81*	17.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	101.58	37.53	1.23	12.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	82.35	37.45	0.95	9.4	3	腦血管疾病	21	96.19	56.04	1.61	10.4	3	肺炎	19	91.90	26.24	1.44	11.2
4	腦血管疾病	30	70.58	35.19	1.40	8.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	64.13	35.30	0.70	6.9	4	糖尿病	10	48.37	16.86	1.09	5.9
5	糖尿病	17	40.00	17.72	0.93	4.6	5	事故傷害	10	45.81	35.59	0.82	5.0	5	腦血管疾病	9	43.53	14.12	1.06	5.3
6	慢性下呼吸道疾病	15	35.29	12.90	0.98	4.0	6	慢性下呼吸道疾病	9	41.23	18.38	0.81	4.5	6	慢性肝病及肝硬化	7	33.86	14.29	2.96*	4.1
7	慢性肝病及肝硬化	13	30.59	16.94	1.50	3.5	7	糖尿病	7	32.06	17.49	0.76	3.5	7	高血壓性疾病	7	33.86	9.71	0.99	4.1
8	高血壓性疾病	12	28.23	11.59	0.94	3.2	8	慢性肝病及肝硬化	6	27.48	17.81	0.94	3.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	29.02	13.36	0.96	3.5
9	事故傷害	11	25.88	20.56	0.70	3.0	9	高血壓性疾病	5	22.90	12.52	0.89	2.5	9	慢性下呼吸道疾病	6	29.02	8.92	1.33	3.5
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	16.47	8.87	0.58	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	18.32	10.03	0.93	2.0	10	血管性及未明示之癱呆症	5	24.18	6.07	1.66	2.9
	其他非十大死因	85	199.98	96.72	1.04	22.8		其他非十大死因	42	192.39	112.52	0.92	20.8		其他非十大死因	36	174.13	71.78	0.93	21.2
11	敗血症	5	11.76	7.66	1.10	1.3	11	敗血症	3	13.74	9.23	1.44	1.5	11	帕金森病	4	19.35	6.24	4.00*	2.4
12	帕金森病	5	11.76	4.26	1.97	1.3	12	主動脈瘤及剝離	3	13.74	7.13	2.09	1.5	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	14.51	6.92	2.57	1.8
13	血管性及未明示之癱呆症	5	11.76	3.68	1.09	1.3	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.16	5.06	0.86	1.0	13	敗血症	2	9.67	6.53	0.82	1.2
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	9.41	4.78	1.64	1.1	14	源於周產期的特定病況	1	4.58	9.14	5.81	0.5	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.84	11.04	6.25	0.6
15	蓄意自我傷害(自殺)	4	9.41	4.70*-	0.64	1.1	15	流行性感冒	1	4.58	5.42	3.23	0.5	15	事故傷害	1	4.84	4.44	0.27	0.6

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計42,504.5人 男性21,831.0人 女性20,673.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	213	1,444.85	495.33*+	1.18*	100.0		所有死亡原因	115	1,478.34	619.46	1.09	100.0		所有死亡原因	98	1,407.24	358.77	1.27*	100.0
	十大主要死因	166	1,126.03	398.33*+	1.24*	77.9		十大主要死因	98	1,259.80	523.70	1.19	85.2		十大主要死因	77	1,105.69	280.07*+	1.35*	78.6
1	惡性腫瘤	42	284.90	113.29	0.89	19.7	1	惡性腫瘤	25	321.38	131.99	0.80	21.7	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	258.47	51.34	1.87*	18.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	237.42	60.67*+	1.79*	16.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	218.54	70.33	1.68	14.8	2	惡性腫瘤	17	244.11	98.03	1.02	17.3
3	肺炎	27	183.15	47.41	1.48	12.7	3	肺炎	16	205.68	62.43	1.50	13.9	3	肺炎	11	157.96	36.66	1.42	11.2
4	慢性下呼吸道疾病	13	88.18	21.40	1.49	6.1	4	慢性下呼吸道疾病	9	115.70	33.73	1.44	7.8	4	糖尿病	6	86.16	22.51	1.19	6.1
5	腦血管疾病	11	74.62	24.74	0.99	5.2	5	事故傷害	7	89.99	70.54	1.33	6.1	5	腦血管疾病	5	71.80	15.93	1.07	5.1
6	糖尿病	9	61.05	20.09	0.94	4.2	6	慢性肝病及肝硬化	7	89.99	53.29	2.66*	6.1	6	敗血症	4	57.44	17.82	2.97	4.1
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	54.27	14.09	1.21	3.8	7	腦血管疾病	6	77.13	31.43	0.91	5.2	7	慢性下呼吸道疾病	4	57.44	12.39	1.52	4.1
8	事故傷害	7	47.48	37.25	1.03	3.3	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	51.42	35.38	2.25	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	57.44	8.98	1.13	4.1
9	慢性肝病及肝硬化	7	47.48	29.69	1.89	3.3	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	51.42	18.11	1.28	3.5	9	高血壓性疾病	4	57.44	8.98	0.98	4.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	47.48	29.69	2.81*	3.3	10	糖尿病	3	38.57	16.47	0.64	2.6	10	血管性及未明示之癱瘓症	4	57.44	7.43	2.24	4.1
	其他非十大死因	47	318.82	97.01	1.00	22.1		其他非十大死因	17	218.54	95.76	0.73	14.8		其他非十大死因	21	301.55	78.70	1.03	21.4
11	敗血症	6	40.70	13.58	2.46	2.8	11	高血壓性疾病	2	25.71	13.83	0.70	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	43.08	22.66	3.98	3.1
12	高血壓性疾病	6	40.70	12.39	0.87	2.8	12	敗血症	2	25.71	9.88	1.82	1.7	12	貧血	2	28.72	4.49	12.69*	2.0
13	血管性及未明示之癱瘓症	5	33.92	5.77	1.85	2.3	13	腦膜炎	1	12.86	10.78	38.84	0.9	13	加害(他殺)	1	14.36	13.61	36.33	1.0
14	貧血	2	13.57	2.66	8.68	0.9	14	主動脈瘤及剝離	1	12.86	5.84	1.37	0.9	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	14.36	4.52	4.63	1.0
15	加害(他殺)	1	6.78	6.30	8.29	0.5	15	帕金森病	1	12.86	3.53	1.12	0.9	15	流行性感	1	14.36	1.86	11.02	1.0

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,742.5人 男性7,779.0人 女性6,963.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	253	942.55	395.97	1.02	100.0		所有死亡原因	145	1,046.40	537.57	1.01	100.0		所有死亡原因	108	831.73	250.26	1.01	100.0
	十大主要死因	204	760.00	322.82	1.07	80.6		十大主要死因	120	865.99	447.81	1.06	82.8		十大主要死因	84	646.90	193.87	1.08	77.8
1	惡性腫瘤	59	219.80	105.28	0.89	23.3	1	惡性腫瘤	40	288.66	153.63	0.93	27.6	1	惡性腫瘤	19	146.32	56.74	0.81	17.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	134.12	50.93	1.36	14.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	129.90	62.95	1.32	12.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	138.62	35.86	1.38	16.7
3	肺炎	24	89.41	33.65	1.01	9.5	3	腦血管疾病	12	86.60	38.51	1.35	8.3	3	肺炎	14	107.82	30.77	1.34	13.0
4	腦血管疾病	20	74.51	25.11	1.33	7.9	4	事故傷害	10	72.17	43.34	1.25	6.9	4	腦血管疾病	8	61.61	13.11	1.26	7.4
5	事故傷害	13	48.43	27.98	1.26	5.1	5	肺炎	10	72.17	35.33	0.74	6.9	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	38.51	10.61	1.07	4.6
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	44.71	14.97	1.38	4.7	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	50.52	21.13	1.73	4.8	6	糖尿病	5	38.51	9.82	0.74	4.6
7	慢性下呼吸道疾病	12	44.71	13.17	1.05	4.7	7	慢性下呼吸道疾病	7	50.52	20.85	0.89	4.8	7	慢性下呼吸道疾病	5	38.51	6.69	1.42	4.6
8	糖尿病	11	40.98	21.88	0.85	4.3	8	糖尿病	6	43.30	30.83	0.96	4.1	8	高血壓性疾病	4	30.80	8.48	0.73	3.7
9	高血壓性疾病	10	37.26	14.14	1.08	4.0	9	高血壓性疾病	6	43.30	20.27	1.54	4.1	9	事故傷害	3	23.10	12.76	1.23	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	7	26.08	15.72	1.23	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	4	28.87	20.96	0.96	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	3	23.10	9.03	1.85	2.8
	其他非十大死因	49	182.55	73.16	0.84	19.4		其他非十大死因	25	180.41	89.76	0.83	17.2		其他非十大死因	24	184.83	56.39	0.84	22.2
11	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.90	9.42	0.99	1.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	4	28.87	18.07	1.43	2.8	11	敗血症	2	15.40	5.80	1.09	1.9
12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	11.18	5.01	3.17	1.2	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	14.43	6.97	3.71	1.4	12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	7.70	4.75	16.35	0.9
13	敗血症	3	11.18	3.95	0.92	1.2	13	主動脈瘤及剝離	2	14.43	6.29	2.03	1.4	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.70	4.38	1.23	0.9
14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	7.45	4.26	12.36*	0.8	14	膽結石及其他膽囊疾患	2	14.43	5.10	5.21	1.4	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	7.70	3.66	2.51	0.9
15	主動脈瘤及剝離	2	7.45	2.73	1.41	0.8	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	7.22	4.02	10.35	0.7	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	7.70	2.14	0.41	0.9

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計26,842.0人 男性13,857.0人 女性12,985.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	299	988.99	413.59	1.03	00.0		所有死亡原因	171	1,096.93	538.38	1.04	00.0		所有死亡原因	128	874.08	299.86	1.01	00.0
	十大主要死因	211	697.91	298.58	0.98	70.6		十大主要死因	129	827.51	417.14	1.02	75.4		十大主要死因	86	587.27	207.70	0.99	67.2
1	惡性腫瘤	74	244.77	114.01	0.96	24.7	1	惡性腫瘤	49	314.32	158.12	0.99	28.7	1	惡性腫瘤	25	170.72	73.49	0.90	19.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	122.38	49.54	1.20	12.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	115.47	60.84	1.16	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	129.75	36.76	1.23	14.8
3	肺炎	22	72.77	23.55	0.78	7.4	3	肺炎	14	89.81	38.67	0.89	8.2	3	糖尿病	13	88.77	26.04	1.62	10.2
4	糖尿病	20	66.15	25.33	1.32	6.7	4	腦血管疾病	12	76.98	39.20	1.18	7.0	4	肺炎	8	54.63	11.67	0.64	6.3
5	腦血管疾病	16	52.92	24.49	0.91	5.4	5	事故傷害	9	57.73	32.15	0.99	5.3	5	事故傷害	5	34.14	14.59	1.72	3.9
6	事故傷害	14	46.31	23.35	1.18	4.7	6	慢性下呼吸道疾病	9	57.73	21.01	1.00	5.3	6	腦血管疾病	4	27.31	11.09	0.53	3.1
7	慢性下呼吸道疾病	10	33.08	8.54*-	0.75	3.3	7	糖尿病	7	44.90	22.78	0.97	4.1	7	高血壓性疾病	4	27.31	7.14	0.61	3.1
8	慢性肝病及肝硬化	9	29.77	21.21	1.41	3.0	8	慢性肝病及肝硬化	6	38.49	31.16	1.30	3.5	8	慢性肝病及肝硬化	3	20.49	8.89	1.55	2.3
9	高血壓性疾病	5	16.54	4.82*-	0.46	1.7	9	帕金森病	3	19.24	7.97	2.33	1.8	9	血管性及未明示之癱瘓症	3	20.49	3.40	1.04	2.3
10	血管性及未明示之癱瘓症	4	13.23	3.74	0.96	1.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	12.83	5.25*-	0.43	1.2	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.66	14.64	1.39	1.6
	其他非十大死因	88	291.07	115.01	1.18	29.4		其他非十大死因	42	269.42	121.24	1.12	24.6		其他非十大死因	42	286.81	92.16	1.06	32.8
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	13.23	3.64*-	0.39*	1.3	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.41	3.36*-	0.32	0.6	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.66	5.82	1.49	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	3	9.92	8.62	0.65	1.0	12	病毒性肝炎	1	6.41	3.33	2.17	0.6	12	皮膚及皮下組織疾病	2	13.66	2.95	3.42	1.6
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.92	4.34	0.94	1.0	13	疝氣及腸阻塞	1	6.41	3.17	3.64	0.6	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.66	2.26*-	0.36	1.6
14	帕金森病	3	9.92	3.33	1.37	1.0	14	血管性及未明示之癱瘓症	1	6.41	3.17	0.77	0.6	14	源於周產期的特定病況	1	6.83	12.95	3.40	0.8
15	敗血症	2	6.62	2.74	0.52	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.41	3.17	0.54	0.6	15	主動脈瘤及剝離	1	6.83	3.74	1.85	0.8

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,233.0人 男性15,589.0人 女性14,644.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	428	1,300.8 3	469.74*+	1.09	00.0		所有死亡原因	248	1,427.2 6	619.74	1.11	00.0		所有死亡原因	180	1,159.35	309.64	1.04	00.0
	十大主要死因	330	1,002.9 8	380.19*+	1.11	77.1		十大主要死因	202	1,162.5 2	518.43*+	1.16*	81.5		十大主要死因	128	824.42	233.12	1.02	71.1
1	惡性腫瘤	131	398.15	162.40*+	1.31*	30.6	1	惡性腫瘤	86	494.94	220.21*+	1.32*	34.7	1	惡性腫瘤	45	289.84	100.23	1.26	25.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	136.77	47.55	1.05	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	155.39	64.95	1.25	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	115.93	27.19	0.83	10.0
3	腦血管疾病	32	97.26	31.64	1.33	7.5	3	腦血管疾病	18	103.59	44.95	1.29	7.3	3	腦血管疾病	14	90.17	16.65	1.34	7.8
4	肺炎	29	88.14	19.56*-	0.72	6.8	4	事故傷害	17	97.84	66.57	1.50	6.9	4	肺炎	12	77.29	10.82*-	0.68	6.7
5	事故傷害	25	75.98	47.51*+	1.71*	5.8	5	肺炎	17	97.84	30.49	0.75	6.9	5	糖尿病	10	64.41	17.24	0.90	5.6
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	57.75	16.53	1.31	4.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	57.55	19.47	1.50	4.0	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	57.97	14.24	1.14	5.0
7	糖尿病	15	45.59	17.14	0.72	3.5	7	蓄意自我傷害(自殺)	9	51.80	31.35	2.34*	3.6	7	事故傷害	8	51.53	28.47	2.22	4.4
8	蓄意自我傷害(自殺)	12	36.47	19.20	2.22*	2.8	8	慢性下呼吸道疾病	7	40.29	12.26*-	0.53	2.8	8	慢性下呼吸道疾病	5	32.20	9.35	0.83	2.8
9	慢性下呼吸道疾病	12	36.47	10.00	0.62	2.8	9	高血壓性疾病	6	34.53	13.88	0.97	2.4	9	高血壓性疾病	4	25.76	3.12*-	0.43	2.2
10	高血壓性疾病	10	30.39	8.67	0.66	2.3	10	糖尿病	5	28.78	14.30	0.51	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	19.32	5.81	1.82	1.7
	其他非十大死因	98	297.85	89.55	1.02	22.9		其他非十大死因	46	264.73	101.32	0.93	18.5		其他非十大死因	52	334.92	76.52	1.09	28.9
11	慢性肝病及肝硬化	6	18.24	8.92	0.75	1.4	11	慢性肝病及肝硬化	5	28.78	14.11	0.86	2.0	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.88	10.79	1.60	1.1
12	血管性及未明示之癱瘓症	5	15.20	3.71	0.82	1.2	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	17.27	5.51	1.54	1.2	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	12.88	5.53	3.08	1.1
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	12.16	4.69	2.54	0.9	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	11.51	4.70	2.17	0.8	13	敗血症	2	12.88	5.53	0.66	1.1
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.16	2.77	0.90	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.51	3.84	0.76	0.8	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.88	2.05	0.48	1.1
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.12	6.25	1.19	0.7	15	敗血症	1	5.76	5.71	0.43	0.4	15	主動脈瘤及剝離	2	12.88	1.56	2.71	1.1

附 註：1.彰化縣芳苑鄉年中人口數 計32,902.0人 男性17,375.5人 女性15,526.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	213	1,311.6 6	506.88*+	0.99	100.0		所有死亡原因	122	1,391.7 4	686.99	1.01	100.0		所有死亡原因	91	1,217.88	271.31	0.95	100.0
	十大主要死因	167	1,028.3 9	423.04*+	1.07	78.4		十大主要死因	100	1,140.7 7	583.95*+	1.09	82.0		十大主要死因	74	990.36	205.70	1.07	81.3
1	惡性腫瘤	58	357.16	138.59	1.06	27.2	1	惡性腫瘤	41	467.72	200.97	1.15	33.6	1	惡性腫瘤	17	227.52	63.69	0.86	18.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	147.79	49.26	1.03	11.3	2	事故傷害	12	136.89	120.59	1.99*	9.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	200.75	40.21	1.24	16.5
3	事故傷害	17	104.69	71.14	2.18*	8.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	102.67	47.88	0.78	7.4	3	糖尿病	10	133.83	27.18	1.60	11.0
4	腦血管疾病	16	98.53	29.46	1.21	7.5	4	腦血管疾病	8	91.26	35.48	1.06	6.6	4	腦血管疾病	8	107.07	23.37	1.37	8.8
5	糖尿病	14	86.21	22.73	1.22	6.6	5	蓄意自我傷害(自殺)	6	68.45	50.42	2.95*	4.9	5	肺炎	6	80.30	10.35*-	0.61	6.6
6	肺炎	12	73.90	19.49	0.54*	5.6	6	慢性肝病及肝硬化	6	68.45	49.58	1.93	4.9	6	事故傷害	5	66.92	17.29	2.54	5.5
7	蓄意自我傷害(自殺)	8	49.26	35.97	2.84*	3.8	7	肺炎	6	68.45	25.92	0.49	4.9	7	高血壓性疾病	4	53.53	8.22	0.77	4.4
8	慢性肝病及肝硬化	7	43.11	32.63	1.64	3.3	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	45.63	19.54	2.77	3.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	40.15	6.04	0.67	3.3
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	36.95	12.16	0.75	2.8	9	糖尿病	4	45.63	17.33	0.75	3.3	9	血管性及未明示之癱呆症	3	40.15	5.04	1.31	3.3
10	高血壓性疾病	5	30.79	11.60	0.60	2.3	10	慢性下呼吸道疾病	4	45.63	16.23	0.56	3.3	10	敗血症	3	40.15	4.31	1.80	3.3
	其他非十大死因	46	283.27	83.84	0.78	21.6		其他非十大死因	22	250.97	103.05	0.76	18.0		其他非十大死因	17	227.52	65.61	0.63	18.7
11	敗血症	5	30.79	5.07	1.71	2.3	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	34.22	19.45	4.29	2.5	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	26.77	16.73	2.40	2.2
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	24.63	13.31	2.93	1.9	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	34.22	16.15	0.84	2.5	12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	13.38	10.85	31.04	1.1
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	24.63	10.30	1.62	1.9	13	敗血症	2	22.82	5.73	1.59	1.6	13	慢性肝病及肝硬化	1	13.38	4.45	0.68	1.1
14	慢性下呼吸道疾病	4	24.63	6.73*-	0.38*	1.9	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	22.82	5.67	4.18	1.6	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	13.38	2.17	3.63	1.1
15	血管性及未明示之癱呆症	3	18.47	3.15	0.91	1.4	15	高血壓性疾病	1	11.41	13.04	0.30	0.8	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	13.38	1.44	1.47	1.1

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計16,239.0人 男性8,766.5人 女性7,472.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	182	1,224.19	461.61	1.02	00.0		所有死亡原因	100	1,286.01	613.06	1.04	00.0		所有死亡原因	82	1,156.56	290.29	1.00	00.0
	十大主要死因	148	995.49	382.32	1.09	81.3		十大主要死因	81	1,041.67	495.59	1.10	81.0		十大主要死因	72	1,015.51	268.27*+	1.42*	87.8
1	惡性腫瘤	60	403.58	157.02	1.32*	33.0	1	惡性腫瘤	34	437.24	207.19	1.17	34.0	1	惡性腫瘤	26	366.71	94.60	1.55*	31.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	127.80	41.32	0.98	10.4	2	慢性肝病及肝硬化	9	115.74	69.88*+	3.57*	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	169.25	44.98	1.16	14.6
3	腦血管疾病	16	107.62	30.15	1.46	8.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	90.02	36.86	0.76	7.0	3	腦血管疾病	10	141.04	28.31	2.01	12.2
4	肺炎	14	94.17	30.15	0.77	7.7	4	腦血管疾病	6	77.16	30.01	1.00	6.0	4	肺炎	9	126.94	35.00	1.06	11.0
5	慢性下呼吸道疾病	10	67.26	15.87	1.15	5.5	5	慢性下呼吸道疾病	6	77.16	26.23	1.09	6.0	5	高血壓性疾病	5	70.52	14.26	1.12	6.1
6	慢性肝病及肝硬化	9	60.54	39.80*+	2.53*	4.9	6	事故傷害	5	64.30	44.78	1.00	5.0	6	慢性下呼吸道疾病	4	56.42	7.55	1.40	4.9
7	事故傷害	8	53.81	41.09	1.21	4.4	7	肺炎	5	64.30	24.91	0.53	5.0	7	事故傷害	3	42.31	38.75	1.78	3.7
8	高血壓性疾病	5	33.63	7.89	0.73	2.7	8	糖尿病	4	51.44	27.09	0.93	4.0	8	胃及十二指腸潰瘍	1	14.10	1.60	4.18	1.2
9	糖尿病	4	26.91	13.66	0.42	2.2	9	血管性及未明示之癱瘓症	3	38.58	12.74	3.83	3.0	9	疝氣及腸阻塞	1	14.10	1.60	3.02	1.2
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	20.18	5.36	0.46	1.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	25.72	15.90	1.18	2.0	10	帕金森病	1	14.10	1.60	1.70	1.2
	其他非十大死因	34	228.69	79.29	0.80	18.7		其他非十大死因	19	244.34	117.47	0.82	19.0		其他非十大死因	10	141.04	22.03*-	0.32*	12.2
11	血管性及未明示之癱瘓症	3	20.18	4.57	1.10	1.6	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	25.72	9.82	0.71	2.0	11	衰老/老邁	1	14.10	1.60	0.51	1.2
12	衰老/老邁	3	20.18	3.36	0.98	1.6	12	衰老/老邁	2	25.72	7.48	1.79	2.0	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	14.10	1.60*-	0.27	1.2
13	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.45	9.42	0.83	1.1	13	源於周產期的特定病況	1	12.86	32.73	20.81	1.0							
14	帕金森病	2	13.45	2.24	1.40	1.1	14	敗血症	1	12.86	10.41	1.01	1.0							
15	源於周產期的特定病況	1	6.73	15.86	5.99	0.5	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.86	6.02	1.76	1.0							

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計14,867.0人 男性7,776.5人 女性7,090.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因

民國109年(2020年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	356	1,215.68	520.51*+	1.18*	100.0		所有死亡原因	203	1,327.67	692.45*+	1.18*	100.0		所有死亡原因	153	1,093.33	330.14	1.18	100.0
	十大主要死因	291	993.72	429.50*+	1.30*	81.7		十大主要死因	173	1,131.46	585.82*+	1.28*	85.2		十大主要死因	125	893.24	260.75*+	1.31*	81.7
1	惡性腫瘤	92	314.16	145.19	1.15	25.8	1	惡性腫瘤	57	372.79	193.04	1.10	28.1	1	惡性腫瘤	35	250.11	89.63	1.23	22.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	136.59	58.22	1.25	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	150.43	75.65	1.40	11.3	2	肺炎	22	157.21	29.97	1.73*	14.4
3	肺炎	40	136.59	39.66	1.36	11.2	3	肺炎	18	117.72	48.19	1.08	8.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	121.48	39.63	1.07	11.1
4	高血壓性疾病	24	81.96	28.62*+	2.13*	6.7	4	慢性下呼吸道疾病	14	91.56	38.48	1.46	6.9	4	高血壓性疾病	16	114.33	24.66*+	2.38*	10.5
5	腦血管疾病	20	68.30	27.39	1.09	5.6	5	事故傷害	12	78.48	58.74	1.29	5.9	5	腦血管疾病	8	57.17	21.12	1.03	5.2
6	糖尿病	20	68.30	26.12	1.26	5.6	6	糖尿病	12	78.48	35.77	1.57	5.9	6	糖尿病	8	57.17	16.95	0.96	5.2
7	慢性下呼吸道疾病	19	64.88	22.22	1.35	5.3	7	腦血管疾病	12	78.48	34.46	1.12	5.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	42.88	8.80	1.03	3.9
8	事故傷害	15	51.22	33.24	1.24	4.2	8	慢性肝病及肝硬化	9	58.86	40.51	1.89	4.4	8	血管性及未明示之癱瘓症	5	35.73	11.92	1.70	3.3
9	慢性肝病及肝硬化	12	40.98	26.52	1.83	3.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	8	52.32	33.77	2.49*	3.9	9	慢性下呼吸道疾病	5	35.73	8.20	1.16	3.3
10	蓄意自我傷害(自殺)	9	30.73	22.32	1.95	2.5	10	高血壓性疾病	8	52.32	27.19	1.71	3.9	10	慢性肝病及肝硬化	3	21.44	9.87	1.47	2.0
	其他非十大死因	65	221.96	91.01	0.85	18.3		其他非十大死因	30	196.21	106.63	0.79	14.8		其他非十大死因	28	200.09	69.40	0.81	18.3
11	血管性及未明示之癱瘓症	7	23.90	7.64	1.63	2.0	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	32.70	12.93	2.55	2.5	11	事故傷害	3	21.44	5.40	1.02	2.0
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	23.90	6.28*-	0.65	2.0	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	13.08	4.12	1.46	1.0	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	14.29	2.26	4.18	1.3
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	17.07	5.70	1.49	1.4	13	衰老/老邁	2	13.08	4.12	1.02	1.0	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	7.15	10.27	0.70	0.7
14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	10.24	2.19	2.61	0.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.54	3.44	0.99	0.5	14	帕金森病	1	7.15	4.10	1.08	0.7
15	衰老/老邁	3	10.24	2.19	0.63	0.8	15	病毒性肝炎	1	6.54	3.17	2.07	0.5	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	7.15	4.10	1.02	0.7

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,284.5人 男性15,290.0人 女性13,994.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計